| Study | Non-responder | Responder | Standardised Mean Difference | SMD | 95%-CI | Weight (fixed) | Weight (random) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaput 2017 | 17 | 9 | | 0.17 | [−0.64; 0.98] | 8.4% | 8.4% |
| Frankel 2017 | 15 | 24 | | −0.12 | [−0.77; 0.53] | 13.2% | 13.2% |
| Gopalakrishnan 2017 | 13 | 30 | | −0.18 | [−0.83; 0.47] | 13.0% | 13.0% |
| Matson 2018 | 26 | 16 | | −0.41 | [−1.04; 0.22] | 13.9% | 13.9% |
| Routy NSCLC 2017 | 46 | 41 | | 0.17 | [−0.25; 0.60] | 31.0% | 31.0% |
| Routy RCC 2017 | 21 | 45 | | 0.15 | [−0.37; 0.67] | 20.5% | 20.5% |
| | | | | | | | |
| **Fixed effect model** | **138** | **165** | | **0.00** | **[−0.23; 0.24]** | **100.0%** | **−−** |
| **Random effects model** | | | | **0.00** | **[−0.23; 0.24]** | **−−** | **100.0%** |

Heterogeneity: $I^2 = 0\%$, $\tau^2 = 0$, $p = 0.67$