| Study | Non−responder | Responder | Standardised Mean Difference | SMD | 95%−CI | Weight (fixed) | Weight (random) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaput 2017 | 17 | 9 | | 0.07 | [−0.73; 0.88] | 8.5% | 8.5% |
| Frankel 2017 | 15 | 24 | | −0.22 | [−0.87; 0.43] | 13.2% | 13.2% |
| Gopalakrishnan 2017 | 13 | 30 | | 0.11 | [−0.54; 0.76] | 13.0% | 13.0% |
| Matson 2018 | 26 | 16 | | 0.34 | [−0.28; 0.97] | 14.0% | 14.0% |
| Routy NSCLC 2017 | 46 | 41 | | −0.16 | [−0.58; 0.26] | 31.1% | 31.1% |
| Routy RCC 2017 | 21 | 45 | | −0.40 | [−0.92; 0.12] | 20.2% | 20.2% |
| | | | | | | | |
| **Fixed effect model** | **138** | **165** | | **−0.09** | **[−0.33; 0.14]** | **100.0%** | −− |
| **Random effects model** | | | | **−0.09** | **[−0.33; 0.14]** | −− | **100.0%** |

Heterogeneity: $I^2 = 0\%$, $\tau^2 = 0$, $p = 0.55$