| Study | Non−responder | Responder | Standardised Mean Difference | SMD | 95%−CI | Weight (fixed) | Weight (random) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaput 2017 | 17 | 9 | | −0.37 | [−1.19; 0.44] | 8.3% | 8.3% |
| Frankel 2017 | 15 | 24 | | 0.27 | [−0.37; 0.92] | 13.1% | 13.1% |
| Gopalakrishnan 2017 | 13 | 30 | | −0.25 | [−0.90; 0.41] | 12.9% | 12.9% |
| Matson 2018 | 26 | 16 | | −0.17 | [−0.79; 0.45] | 14.2% | 14.2% |
| Routy NSCLC 2017 | 46 | 41 | | −0.22 | [−0.65; 0.20] | 30.9% | 30.9% |
| Routy RCC 2017 | 21 | 45 | | −0.05 | [−0.57; 0.47] | 20.6% | 20.6% |
| | | | | | | | |
| **Fixed effect model** | **138** | **165** | | **−0.13** | **[−0.37; 0.10]** | **100.0%** | **−−** |
| **Random effects model** | | | | **−0.13** | **[−0.37; 0.10]** | **−−** | **100.0%** |

Heterogeneity: $I^2 = 0\%$, $\tau^2 = 0$, $p = 0.81$