| Study | Non-responder | Responder | Standardised Mean Difference | SMD | 95%-CI | Weight (fixed) | Weight (random) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaput 2017 | 17 | 9 | | 0.56 | [−0.27; 1.38] | 8.1% | 8.1% |
| Frankel 2017 | 15 | 24 | | −0.24 | [−0.89; 0.41] | 13.2% | 13.2% |
| Gopalakrishnan 2017 | 13 | 30 | | 0.04 | [−0.61; 0.69] | 13.0% | 13.0% |
| Matson 2018 | 26 | 16 | | −0.27 | [−0.90; 0.35] | 14.1% | 14.1% |
| Routy NSCLC 2017 | 46 | 41 | | 0.21 | [−0.21; 0.63] | 31.0% | 31.0% |
| Routy RCC 2017 | 21 | 45 | | −0.13 | [−0.65; 0.39] | 20.6% | 20.6% |
| **Fixed effect model** | **138** | **165** | | **0.02** | **[−0.22; 0.25]** | **100.0%** | **−−** |
| **Random effects model** | | | | **0.02** | **[−0.22; 0.25]** | **−−** | **100.0%** |

Heterogeneity: $I^2 = 0\%$, $\tau^2 = 0$, $p = 0.52$

−2 −1 0 1 2