| Study | Non-responder | Responder | Standardised Mean Difference | SMD | 95%-CI | Weight (fixed) | Weight (random) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaput 2017 | 17 | 9 | | −0.53 | [−1.36; 0.29] | 8.3% | 9.9% |
| Frankel 2017 | 15 | 24 | | −0.66 | [−1.33; 0.00] | 12.7% | 14.1% |
| Gopalakrishnan 2017 | 13 | 30 | | 0.31 | [−0.34; 0.96] | 13.1% | 14.4% |
| Matson 2018 | 26 | 16 | | −0.12 | [−0.74; 0.50] | 14.4% | 15.5% |
| Routy NSCLC 2017 | 46 | 41 | | −0.14 | [−0.56; 0.28] | 31.5% | 26.3% |
| Routy RCC 2017 | 21 | 45 | | −0.59 | [−1.12; −0.07] | 20.0% | 19.7% |
| | | | | | | | |
| Fixed effect model | 138 | 165 | | −0.27 | [−0.51; −0.03] | 100.0% | −− |
| Random effects model | | | | −0.27 | [−0.56; 0.01] | −− | 100.0% |

Heterogeneity: $I^2 = 26\%$, $\tau^2 = 0.0328$, $p = 0.24$