| Study | Non-responder | Responder | Standardised Mean Difference | SMD | 95%-CI | Weight (fixed) | Weight (random) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaput 2017 | 17 | 9 | | 0.56 | [−0.27; 1.38] | 8.2% | 10.6% |
| Frankel 2017 | 15 | 24 | | −0.03 | [−0.68; 0.61] | 13.4% | 15.1% |
| Gopalakrishnan 2017 | 13 | 30 | | 0.11 | [−0.54; 0.76] | 13.1% | 14.9% |
| Matson 2018 | 26 | 16 | | 0.30 | [−0.32; 0.93] | 14.2% | 15.7% |
| Routy NSCLC 2017 | 46 | 41 | | 0.00 | [−0.42; 0.42] | 31.4% | 24.4% |
| Routy RCC 2017 | 21 | 45 | | −0.62 | [−1.15; −0.10] | 19.8% | 19.3% |
| | | | | | | | |
| **Fixed effect model** | **138** | **165** | | **−0.03** | **[−0.26; 0.21]** | **100.0%** | **−−** |
| **Random effects model** | | | | **−0.00** | **[−0.31; 0.31]** | **−−** | **100.0%** |

Heterogeneity: $I^2 = 38\%$, $\tau^2 = 0.0554$, $p = 0.15$