| Study | Non-responder | Responder | Standardised Mean Difference | SMD | 95%-CI | Weight (fixed) | Weight (random) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaput 2017 | 17 | 9 | | 0.00 | [−0.80; 0.81] | 8.5% | 8.5% |
| Frankel 2017 | 15 | 24 | | 0.04 | [−0.60; 0.69] | 13.3% | 13.3% |
| Gopalakrishnan 2017 | 13 | 30 | | −0.46 | [−1.12; 0.19] | 12.7% | 12.7% |
| Matson 2018 | 26 | 16 | | 0.18 | [−0.44; 0.81] | 14.2% | 14.2% |
| Routy NSCLC 2017 | 46 | 41 | | 0.23 | [−0.20; 0.65] | 30.9% | 30.9% |
| Routy RCC 2017 | 21 | 45 | | 0.23 | [−0.29; 0.75] | 20.4% | 20.4% |
| **Fixed effect model** | **138** | **165** | | **0.09** | **[−0.14; 0.33]** | **100.0%** | **––** |
| **Random effects model** | | | | **0.09** | **[−0.14; 0.33]** | **––** | **100.0%** |

Heterogeneity: $I^2 = 0\%$, $\tau^2 = 0$, $p = 0.62$