| Study | Non-responder | Responder | Standardised Mean Difference | SMD | 95%-CI | Weight (fixed) | Weight (random) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaput 2017 | 17 | 9 | | 0.22 | [−0.59; 1.03] | 8.4% | 8.4% |
| Frankel 2017 | 15 | 24 | | −0.03 | [−0.68; 0.61] | 13.2% | 13.2% |
| Gopalakrishnan 2017 | 13 | 30 | | −0.24 | [−0.89; 0.42] | 12.9% | 12.9% |
| Matson 2018 | 26 | 16 | | −0.21 | [−0.83; 0.42] | 14.1% | 14.1% |
| Routy NSCLC 2017 | 46 | 41 | | −0.10 | [−0.52; 0.32] | 31.0% | 31.0% |
| Routy RCC 2017 | 21 | 45 | | −0.23 | [−0.74; 0.29] | 20.4% | 20.4% |
| | | | | | | | |
| **Fixed effect model** | **138** | **165** | | **−0.12** | **[−0.36; 0.11]** | **100.0%** | **−−** |
| **Random effects model** | | | | **−0.12** | **[−0.36; 0.11]** | **−−** | **100.0%** |

Heterogeneity: $I^2 = 0\%$, $\tau^2 = 0$, $p = 0.95$