




مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة
King Fahd Armed Forces Hospital, Jeddah



دليل الرضاعة الطبيعية

Breast Feeding Manual

قسم التثقيف الصحي




مقدمة:

تعتبر التغذية الدعامية الأولى لصحة الإنسان في السنوات الأولى من عمره فالغذاء الصحي المتوازن يوفر للجسم كل ما يحتاجه لبناء أنسجته ونموها ووقايته من الأمراض، وقد أثبتت الدراسات أن التغذية في السنتين الأولى من العمر لها دور كبير على النمو العقلي والجسدي للأطفال، ومن المعروف منذ القدم أن الغذاء المثالي للوليد يتمثل في حليب الأم فهو غذاء كامل لا يمكن محاكاته إذ يوفر للطفل جميع احتياجاته من أجل نمو جسدي وعقلي سليم كما توفر الرضاعة الطبيعية للطفل احتياجاته العاطفية والنفسية، ومن هذا المنطلق تنبع ضرورة التوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية وآثارها على المدى القريب والبعيد، ووسائلها وما يعين عليها.

في هذا الكتيب نضع بين أيديكم دليلا إرشاديا صغيرا لكل ما يتعلق بالرضاعة الطبيعية وحليب الأم ونأمل أن يقدم إجابات وافية لجميع تساؤلات الأم المرضعة.





● تعريف ومراحل تحول الحليب :

تعريف حليب الأم:

هو أول غذاء طبيعي يتناوله الرضيع وهو الغذاء المثالي له، فهو يوفر جميع العناصر الغذائية من أجل نمو صحي، ويتكيف مع نمو الطفل لتلبية احتياجاته المتغيرة .

مراحل تطور الحليب:

يتحول حليب الأم من شكل إلى آخر أثناء مراحل نمو الطفل من أجل تلبية احتياجاته الغذائية فيمر بالمراحل التالية:

• اللبأ:



○ هو أول الحليب الذي يخرج من الثدي عند الرضاعة.

○ يستمر تقريبًا لمدة ٣ أيام بعد الولادة.

○ يتميز باللون الأصفر القاتم أو اللون الكريمي،


ويكون اللبأ عادة كثيف.

○ يحتوي على كمية عالية من البروتين والفيتامينات والمعادن والأجسام

المضادة المهمة جدًا لتقوية مناعة المولود وحمايته من الإصابة بالأمراض

المعدية.





• الحليب الانتقالي:

- يظهر هذا الحليب بعد فترة تتراوح بين يومين إلى ٤ أيام بعد مرحلة اللبأ ويستمر لمدة أسبوعين تقريباً.



- يحتوي على نسبة عالية من الدهون وسكر اللاكتوز والفيتامينات كما أنه يحتوي على سعرات حرارية أكثر من اللبأ.
- في هذه المرحلة تزداد كمية الحليب ويصبح حليب الأم أكثر بياضاً وقد يتأثر لون الحليب بنوع الطعام والدواء الذي تتناوله الأم المرضعة.

• الحليب الناضج :


تعتبر المرحلة الأخيرة من مراحل تطور حليب الأم وهو نوعان:

- **حليب بداية الرضعة:** يتشكل في بداية الرضعة

ويكون خفيف الكثافة حيث يكون معظم

محتواه ماء وسكر وفيتامينات وبروتين.






- **حليب نهاية الرضعة:** يتشكل في نهاية الرضعة ويحتوي على نسبة أعلى من الدهون المهمة لزيادة وزن الطفل والحبول على المزيد من الطاقة لذلك يكون أكثر كثافة ولونه أكثر اصفرارا.

❖ في حال مرض الطفل تتغير تركيبة الحليب الطبيعي حيث تعود إلى مرحلة اللبأ التي يكون فيها الحليب مليئا بالأجسام المضادة لتقوية مناعة الجسم ضد المرض.






● فوائد الرضاعة:

للطفل:

- سهل الهضم.
- يحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الرضيع خلال الأشهر الستة الأولى.
- سهل الحصول عليه ومتاح كلما احتاج إليه الطفل.
- يقوي المناعة ويساعد الطفل على مقاومة العدوى والمرض، حتى في وقت لاحق من الحياة.
- رفع معدل الذكاء.
- يقلل من خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكري.
- يساعد على نمو العينين والدماغ وأنظمة الجسم الأخرى.
- تساعد الرضاعة الطبيعية على تقوية الفك.






للأم:

- تقوية العلاقة بين الأم والطفل وإشعاره بالحنان والدفع.
- إعادة الرحم لوضعه الطبيعي.
- مانع حمل طبيعي في حال الانتظام في الرضاعة الطبيعية.
- تعزيز صحة الأمهات، حيث تقلل من:
 - النزف مباشرة بعد الولادة.
 - الإصابة بسرطان الثدي وسرطان المبايض.
 - الإصابة بهشاشة العظام.
 - أمراض القلب والأوعية الدموية.
 - البدانة وزيادة الوزن.

للأسرة:

- توفير المال.
- توفير الوقت لأفراد الأسرة.
- لا يحتاج إلى تدفئة ولا تعقيم.






● الاستعداد للرضاعة الطبيعية:

للبدء في إرضاع الطفل رضاعة طبيعية، البدء من اتخاذ القرار والاستعداد خلال الحمل باتباع الخطوات التالية:

- فحص الحلمات أثناء فترة الحمل وعلاج الحلمات غير الطبيعية حتى لا تعيق عملية الرضاعة.
- استشارة الطبيب وأخصائية تثقيف الرضاعة الطبيعية لتجاوز المخاوف والعقبات التي قد تواجه الألم.
- الحرص على تناول غذاء صحي متوازن أثناء الحمل واستشارة أخصائية التغذية عند الحاجة.






● نصائح لنجاح عملية الرضاعة الطبيعية:

- إبقاء الطفل بجوار الأم على مدار الساعة وتجنب وضعه في الحاضنة مع الممرضة خاصة في الساعات الأولى وبذلك سوف تتعرف الأم على الطفل جيدا وتتعلم بسرعة متى يحتاج إلى الرضاعة.
- الالتقاء الجسدي والبصري بين الأم والطفل يساعد على إدرار الحليب.
- اختيار الوضع المريح للرضاعة والتأكد من أن الطفل في الوضع الصحيح أثناء الرضاعة.
- يجب الاعتماد على الرضاعة الطبيعية وحدها وعدم إدخال أي حليب صناعي أو سوائل أخرى، ومن الخطأ الاعتقاد أن ذلك يؤدي إلى صعوبة فطام الطفل من الحليب في المستقبل.
- الرضاعة الطبيعية المتكررة عند الطلب والرضاعة أثناء الليل تساعد على زيادة إدرار الحليب.






● علامات جوع الطفل:

من المهم للغاية إرضاع الطفل حديث الولادة على الأقل من ٨-١٢ مرة يوميا خلال الأسبوع الأول من حياته، وكلما ظهرت عليه علامات الجوع التي تشمل :

- مص قبضة اليد أو الإصبع.
- وضع اليدين في الفم.
- تحريك الذراعين والساقين.
- إحكام إطباق القبضتين.
- تحريك الرأس عند لمس خده أو فمه.

❖ إذا بدأ الطفل بالبكاء أو الصراخ، فعلى الأم تهدئة الطفل أولا قبل إرضاعه وذلك عن طريق الاحتضان، التمسيد والطبوبة.






● العوامل المساعدة على الرضاعة الطبيعية:

- النوم الكافي والحالة النفسية الهادئة.
- إرضاع الطفل بشكل متكرر وخصوصا في الليل.
- الغذاء السليم والمتوازن والإكثار من شرب الماء والحد من المنبهات كالقهوة والشاي.
- اختيار المكان المناسب ووضع الجلوس المناسبة للشعور بالاسترخاء.
- حمل الرضيع بصورة تحقق التلامس الجلدي إن أمكن.
- النظر إلى الرضيع أو إلى صورته أو الاستماع لصوته في حال البعد عنه.
- الحصول على شراب دافئ ومهدئ.






● طريقة الرضاعة الصحيحة:

١. وقت البدء بالرضاعة ومدتها:

- يمكن للأم عادة البدء في الرضاعة الطبيعية في غضون ساعة أو نحو ذلك من ولادة الطفل، لتحفيز هرمون الحليب.
- تستغرق عملية الرضاعة بعض الوقت وخصوصا إذا كان هذا الحمل الأول وتستمر حتى يظهر الطفل مؤشرات الشبع (مثل: البطء في مص الثدي، أو الانفصال عن الثدي وإرخاء اليدين والذراعين والساقين).

❖ لا ينصح بإعطاء أي شيء سوى حليب الأم خلال الستة أشهر الأولى (٢٦ أسبوعا) من حياة الطفل بما في ذلك الماء أو الأعشاب أو الحليب الصناعي.





٢. وضعيات أساسية للرضاعة الطبيعية:

أ) وضعيات المبتدئات (الأيام أو الأسابيع القليلة الأولى):



وضعية المهد المتقاطع:


- هي من أفضل الوضعيات في الأيام الأولى.
- تستطيع الأم التحكم جيدا برأس الطفل من خلال وضع يدها خلف أذني الطفل وتكون معدته على معدة الأم.



وضعية الكرة:

- ملائمة بعد الولادة القيصرية لأن وزن الطفل لا يكون على بطن الأم.
- تضع الأم ذراعها أسفل الطفل مع استخدام وسادة لجعل الطفل على مستوى الثدي.
- وضع رأس الطفل في راحة يد الأم مع إسناد جسمه بذراعها.





وضعية الاستلقاء على الظهر:



تعتبر من أفضل الوضعيات للبدء بالرضاعة الطبيعية في المستشفى.

(ب) وضعيات متقدمة بعد أن تصبح عملية التقاط الثدي سهلة وسريعة:

وضعية الاستلقاء الجانبي:

هي طريقة جيدة للحصول على بعض الراحة بينما يقوم الطفل بالرضاعة أو إذا أرادت الأم تجنب الجلوس بسبب الألم.




وضعية المهد:



من أكثر الوضعيات شيوعا وهي طريقة ممتازة حيث يتمكن الطفل من التقام الثدي والرضاعة بسهولة.





وضعية تحت الذراع:

- مناسبة لرضاعة التوائم.
- إذا كان حجم الثدي كبير.
- بعد الولادة القيصرية.

٣. علامات الاسترضاع الصحيح:

لإنجاح عملية الرضاعة الطبيعية يجب التأكد من أن جسم الأم والطفل في

الوضعية الصحيحة، ومن العلامات الدالة على ذلك:


- أن تكون الأم في وضعية مريحة فتسند ظهرها وذراعيها وترفع قدميها عن مستوى الأرض.

- أن يكون جسد الطفل قريبا من جسم الأم ومواجهها لها بحيث تكون

معدته على معدة الأم ولا يحتاج للالتفات برأسه ليتمكن من

الرضاعة.






- أن يكون الطفل قريباً من الثدي (تقريب الطفل من الثدي وليس الثدي للطفل) ويكون أنفه مقابلاً للحلمة.
- أن يكون رأس الطفل وجسده على استقامة واحدة ويتم ذلك بإسناده عند حمله.
- أن يتنفس الطفل من زوايا أنفه بسهولة علماً بأنه سيترك الثدي عند عدم قدرته على التنفس.

❖ إذا لاحظت الأم أن الطفل لا يتنفس بسهولة يمكنها تقريبه منها (خاصة من منطقة الورك) ، فهذا من شأنه تحرير أنفه.






٤. الطريقة الصحيحة لالتقام الثدي:

- يجب ملاصقة الشفة العلوية لفم الطفل بالحلمة لأن ذلك يساعد على تحفيز حواس الطفل فيفتح فمه بحثا عنها.
- تقريب الطفل ليتم التقام الحلمة من الأسفل إلى الأعلى باتجاه سقف الحلق.
- يجب أن يلتقط الطفل الحلمة وجزء كبير من منطقة الهالة بغمه بحيث يكون جزء الهالة العلوي ظاهرا أكثر من الجزء السفلي وأن تكون الشفتان العليا والسفلى بارزتان للخارج (ملتفتان للخارج).
- يفضل أن تبقي الأم إبهامها عند أنف الطفل وأصابعها عند ذقنه حتى تتمكن من تحريك يدها بشكل تلقائي يناسب وضعية الطفل.
- ستشعر الأم بإحساس الشد والسحب أثناء الرضاعة لكن لا ينبغي الشعور بالألم حاد.
- فور قدوم الحليب ستلاحظ الأم عملية البلع مع كل مصة للثدي.
- إذا أرادت الأم إبعاد الطفل عن الثدي، عليها وضع إصبعها بين شفثيه واللثة لوقف اللعق والانتظار قليلا ومن ثم إبعاد الطفل عن الثدي.






- من الأفضل الإرضاع من صدر واحد في كل رضعة، أي إذا أرضعت الأم طفلها من أحد الصدرين تستخدم الآخر في الرضعة التالية وهكذا.

❖ يجب على الأم ألا تضغط على الثدي لتفصح مجالا للطفل كي يتنفس، فهذا من شأنه تشويه شكل الحلمة في فم الطفل مما قد يسبب ألم، بالإضافة إلى تقليل تدفق الحليب من الثدي.






● علامات الرضاعة الطبيعية الجيدة:

- النمو الصحي للطفل، وذلك عندما يتناسب وزنه وطوله مع عمره.
- وضوح صوت البلع لدى الطفل.
- إخراج براز أخضر اللون في الأيام الأولى ويميل إلى الاصفرار مع نهاية الأسبوع الأول ويتكرر ٣-٥ مرات خلال الأسابيع الأولى.
- تبليل الحفاض ٨-١٢ مرة في اليوم بيزل فاتح اللون.





● قلة إدرار الحليب:

الأسباب:

- التعلق الخاطئ على الثدي.
- إدخال الرضعات الصناعية منذ الساعات الأولى.


الأعراض:

- عدم حصول الطفل على قسط كاف من النوم، وخاصة بعد الرضاعة الطبيعية.
- كثرة بكاء الطفل دون سبب واضح.
- قلة وزن الطفل وعدم زيادته بالمعدل الطبيعي لعمره.
- تبلييل الطفل لحفاضته أقل من 2 مرات باليوم.
- تظهر رائحة لبول الطفل ويتغير لونه إلى اللون الداكن.

العلاج:

- التأكد من التعلق الجيد للرضيع على الثدي والسماح له بالرضاعة عند الطلب مع تكرار ملازمة الجلد للجلد كلما أمكن ذلك.
- استشارة الطبيب أو مثقفات الرضاعة الطبيعية.





● حجم معدة الطفل:



اليوم الأول:

تكون بحجم حبة كرز



اليوم الثالث:

تكون بحجم حبة الجوز



الأسبوع الأول:

تكون بحجم حبة المشمش



الأسبوع الثاني:

تكون بحجم البيضة






● جدول متابعة الطفل:

عمر الطفل		عدد الرضعات / اليوم	كمية الحليب التي يحتاجها الطفل	عدد الحفاضات المبللة	عدد الحفاضات المتسخة	وزن الطفل	
الأسبوع الأول	١	في الشهر الأول ٨-١٢ رضعة في اليوم تقريبا (كل ساعة ونصف إلى ٣ ساعات).	١٠٠-١٠٠ ملل	١ أو أكثر	على الأقل ١-٢ يوميا بلون أسود أو أخضر غامق	المعدل الطبيعي لزيادة وزن الطفل في أول ٣ شهور هو ١١٢ جرام- ٢٢٤ جرام في الأسبوع	
	٢			٢ أو أكثر			
	٣		٢٠٠ ملل	٣ أو أكثر	على الأقل ٣ يوميا بلون بني، أخضر أو أصفر		
	٤			٤ أو أكثر			
	٥		٤٠٠-٦٠٠ ملل	٦ أو أكثر	يتم إخراج براز لين، أصفر اللون وكثير البذور ٣ مرات في اليوم على الأقل		
	٦						
	٧						
	الأسبوع الثاني		٧٠٠-٨٠٠ ملل في اليوم				
	الأسبوع الثالث						
	الأسبوع الرابع						
الأسبوع الخامس		٦-٨ مرات في اليوم.					
الأسبوع السادس إلى ٦ أشهر							






● مشاكل الرضاعة الطبيعية:


المشكلة	الوصف	الحل
احتقان الثدي	هو الشعور بامتلاء الثدي وهي مشكلة يعاني منها معظم النساء: • ازدياد حجم و ثقل وحساسية الثدي. • ألم عند لمس الثدي. • تورم وتصلب الثديين.	• لابد من تفريغ الثدي عن طريق إرضاع الطفل أو الشفط أو اعتصار الحليب باستمرار. • وضع كمادات دافئة على الثدي المحتقن وتدليكه. • وضع كمادات باردة على الثديين لمدة ٢٠ دقيقة بعد الإرضاع.






الحلمة المتشق	تحدث بسبب الوضع الغير صحيح لإرضاع الطفل أو خطأ في طريقه إمساكه للحلمة.	• لابد من تفريغ الثدي عن طريق إرضاع الطفل أو شفط او اعتصار الحليب باستمرار. • وضع كمادات دافئة على الثدي المحتقن وتدليكه. • وضع كمادات باردة على الثديين لمدة ٢٠ دقيقة بعد الإرضاع.
---------------------------------	---	---






ألم الحلمة	يحدث ألم الحلمة غالبا عندما الطفل بالثدي جيدا أو عند عدم وضعه بشكل صحيح.	• ارضاع الطفل مرات أكثر لفترات أقصر ابتداء بالحلمة الأقل ألما. • التأكد من التقام الطفل للثدي بشكل صحيح خصوصا عند الشعور بحكة أو ألم شديد أثناء الإرضاع وينبغي أن تكون الحلمة دائرية ومنتصبة بعد ترك الطفل لها. • الحرص على اعتصار مقدار صغير من اللبأ أو الحليب مع القيام بتوزيعه حول الحلمة والتهالة بعد التجفيف في الهواء. • الحرص على الاستحمام والسماح للمياه بالتدفق فوق الثدي مع تجنب استخدام الصابون والماء الزائد على الثدي.
------------	--	---






التهاب الثدي	• يحدث التهاب الثدي نتيجة انسداد إحدى القنوات أو نتيجة دخول البكتيريا إلى الثدي، وغالبا ما يحدث ذلك نتيجة تشقق الحلمة. • مؤشرات التهاب الثدي: ○ صداع. ○ الحمى وألم المفاصل. ○ رعشة. ○ احمرار أو تصلب أو ألم بالثدي. ○ استمرار الألم أو عدم الرغبة في إرضاع الطفل من الثدي المتأثر دون إصابة الطفل بالعدوى.	• زيارة الطبيب واستخدام العلاج المناسب. • الحرص على تناول الدواء طوال الفترة الموصى بها. • عدم التوقف عن تناول الدواء حتى عند الشعور بالتحسن إلا بعد استشارة الطبيب المعالج. • الحرص على شفط أو اعتصار الحليب وإعطائه للطفل.
-----------------	---	--





القناة المسدودة	• القناة المسدودة عبارة عن تورم مؤلم في الثدي, يؤدي إلى الإلتهاب عند إهمال العلاج. • تحدث الانسدادات غالباً نتيجة التغير في نمط إرضاع الطفل أو الضغط على الثدي.	• وضع فوطة دافئة فوق الثدي لمدة تتراوح من ١٥-٢٠ دقيقة يوميا قبل كل مرة إرضاع. • تغيير وضعية الرضاعة مع جعل ذقن الطفل وفكه باتجاه القناة المسدودة. • إرضاع الطفل من الثدي المتأثر أولاً حيث تساعد الرضاعة على تخفيف الانسداد.
----------------------------	---	--






● نصائح للأم العاملة:

- إذا كانت الأم ستتغيب في العمل لفترة قصيرة، يفضل أن ترضع الطفل قبل مغادرة البيت مباشرة وعند الرجوع إلى المنزل.
- إذا كان هناك مرونة في ساعات العمل، يمكنها التأخر ساعة عن العمل، والخروج مبكراً.
- إذا كانت ستتغيب فترة طويلة خارج المنزل، عليها أن تحاول أخذ الرضيع معها بحيث تتركه في الحضانة القريبة من العمل لكي تتمكن من إرضاعه في أي وقت.
- إذا لم تتمكن الأم من اصطحاب طفلها، فلتحرص على عصر وتفريغ الثديين إما باليدين أو باستخدام مضخة شفط الحليب (عصرة الثدي) وهي متوفرة بأنواع حسب ما يناسب كل أم، لتجميع الحليب وإعطائه للطفل أثناء غيابها.

❖ من الأفضل تجنب استخدام الرضاعة واستبدالها بالملعقة أو كوب


صغير.





● اعتصار أو شفط الحليب من الثدي:

- هو عملية إخراج الحليب من الثدي ويتم بعدة طرق سواء كان باليد أو الشفاط اليدوي أو الكهربائي أو الكهربائي المزدوج، وبعد إخراج الحليب من الثدي يمكن تخزينه في زجاجات أو أوعية مناسبة أو أكياس حفظ الحليب لاستخدامها في إرضاع الطفل في وقت لاحق.





أ) اعتصار الحليب باليد:

هي مهارة تفيد في إفراغ الثدي لفترة مؤقتة، ويمكن أن تكون أكثر فعالية من المضخة في إخراج حليب اللبأ خلال الأيام القليلة الأولى بعد الولادة.

الطريقة:

١. وضع كمادات ساخنة وتدليك الثديين.
٢. تضع الأم أصابعها (الإبهام والسبابة) على الثدي خلف الحلمة بمسافة بضعة سنتيمترات.
٣. دفع الإبهام والسبابة والوسطى بشكل مستقيم للخلف عكس اتجاه الحلمة.



٤. حركي الإبهام والسبابة والوسطى معاً لتسهيل خروج الحليب.





ب. الشفط باستخدام مضخات الحليب اليدوية أو الإلكترونية:


- عندما يتعذر إعطاء الطفل حليب الأم بشكل مباشر، يمكن شفط الحليب من الثدي يدويا أو بمساعدة شفافة.
- يعتمد اختيار نوع الشفافة المناسبة على عدد المرات التي تحتاج الأم فيها إلى شفط الحليب وعلى طريقة الشفط الملائمة لها.
- يجب قراءة التعليمات المرفقة بالشفافة قبل استخدامها لمعرفة طريقة الاستعمال وكيفية الحفاظ على نظافة الشفافة.



➤ مضخات الثدي اليدوية:

- سهولة الاستخدام.
- يمكن استخدامها بيد واحدة.
- لها قمع يناسب شكل الثدي يغطي الحلمة والهالة).
- تخرج اللبن عن طريق الشفط ليتم تجميعه في وعاء زجاجي.






مضخات الثدي الكهربائية:

- تعمل بالكهرباء أو البطاريات وأحياناً كلاهما.
- مفيدة عند الحاجة إلى استخراج الحليب باستمرار.
- أغلى من المضخات اليدوية.
- أقل تعباً من المضخات اليدوية.
- أسرع من الشفطات اليدوية.
- بعض أنواعها تسمح بضخ كلا الثديين مرة واحدة مما يوفر الوقت ويحفز الثديين بشكل أكثر فعالية.





● حفظ حليب الأم:

- الحرص على نظافة اليدين ونظافة الأواني المستخدمة.
- يتم شفط الحليب بواسطة أداة الشفط (المضخة أو الجبادة).
- يحفظ الحليب في أواني بلاستيكية أو زجاجية أو أكياس معقمة تتوفر

في الصيدليات.

- عدم تعبئة الحليب إلى قمة العبوة لزيادة حجم

الحليب بعد التجميد.


- وضع تاريخ ووقت الشفط على العلبة قبل

التخزين.

- يفضل حفظ الحليب في الفريزر (للتجميد) ويمكن الاحتفاظ بالحليب

المجمد حتى ٦ أشهر.






إرشادات عند حفظ الحليب:

- يمكن حفظ الحليب في زجاجات نظيفة وصغيرة تكفي كل منها لرضعة واحدة.
- الحليب المتبقي بعد انتهاء الطفل من الرضاعة يمكن استخدامه خلال 4 ساعات والتخلص منه بعد ذلك.
- لا يعاد الحليب الذي تمت إذابته إلى الفريزر للتجميد.
- تجنب رج علبة حليب الأم أو إذابته في المايكرويف.
- لا يشترط أن يكون الحليب ساخنا جدا، ويمكن الاكتفاء بدرجة حرارة الغرفة.





● مدة حفظ حليب الأم:

٤ ساعات

خارج الثلاجة في درجة حرارة الغرفة لا يحتاج إعادة التسخين.


٧-٥ أيام

داخل الثلاجة

٣ - ٦ أشهر

مجمدا داخل الفريزر






● مخاطر الرضاعة الصناعية:

- تشويش الارتباط العاطفي بين الأم والطفل.
- تقليل مرات الرضاعة الطبيعية وإضعافها.
- تقليل إدرار حليب الأم.
- زيادة خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة مثل داء السكري وفرط زيادة الوزن والحساسية للطفل.
- زيادة خطر الإصابة بالإسهال والأمراض التنفسية وسوء التغذية.
- تدني نتائج اختبارات الذكاء عند الطفل.






● إيجاد الدعم:

دور الأم:

- البحث والقراءة عن فوائد الرضاعة الطبيعية وأهميتها قبل الولادة.
- الحرص على البدء بإرضاع الطفل رضاعة طبيعية خلال الساعة الأولى من عمره.
- طلب المساعدة عند الحاجة إلى تعلم الطريقة الصحيحة للرضاعة الطبيعية دون حرج.
- الحرص على التغذية المتوازنة والإكثار من شرب الماء.
- الحصول على كمية كافية من الراحة.






دور الأب:

- التحضير لفترة الرضاعة الطبيعية عن طريق قضاء بعض الوقت في فهم فوائدها.
- تقديم التشجيع للأم وتوفير الراحة لها وخصوصا في الأيام الأولى.
- المشاركة في عملية تغذية الرضيع بحمله قبل وبعد الرضاعة والمساعدة في تهدئته حتى يعود للنوم.
- المساعدة في تقديم الرعاية اللازمة للرضيع وإخوته حتى تتمكن الأم من أخذ قيلولة بين الرضعات وحتى تتفرغ الأم للرضاعة.
- مناقشة مخاوف الأم تجاه الرضاعة الطبيعية ومساعدتها على تجاوزها.
- طلب المساعدة من مقدم الرعاية الصحية أو استشاري الرضاعة عند الحاجة.






دور الأسرة والأصدقاء:

- توفير الدعم العاطفي والمساعدة العملية في المسؤوليات المنزلية الأخرى.
- الاعتناء بإخوة الرضيع.
- تعزيز ثقة الأم في الرضاعة الطبيعية عبر الإصغاء إليها وتقديم الدعم اللازم لها.

دور أصحاب العمل:

- الموافقة على منح الأم إجازة وضع لمساعدتها على الرضاعة الطبيعية.
- تسهيل عودة الأم إلى العمل من خلال توفير ما يلزم من وقت ومكان للقيام بعملية الرضاعة الطبيعية أو اعتصار الحليب وتخزينه وذلك توفير الوقت والمكان اللازمين للقيام بعملية الرضاعة الطبيعية واعتبار وتخزين الحليب.
- تطبيق قوانين الرضاعة الطبيعية في العمل.
- تعريف الموظفة بحقوقها في إجازة رعاية المولود وتسهيل ذلك.






● موانع الرضاعة الطبيعية للرضع:

حليب الأم يوفر التغذية الأكثر اكتمالا للرضع، إلا أن هناك توقعات نادرة تمنع الرضاعة الطبيعية، لذلك يجب على الأطباء إجراء تقييم لكل أم على حدة لتحديد ما إذا كان تعرض المرأة للبيئة المحيطة، أو حالتها الطبية، أو الحالة الطبية التي يعاني منها الأطفال الرضع تجعلها تبدأ بالرضاعة الطبيعية، أو توقفها، أو لا تبدأها أبدا.

يجب على الأمهات عدم إرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية في الحالات التالية:

- تم تشخيص إصابة الرضيع بالجالاكتوزيميا الكلاسيكية، أو اضطراب التمثيل الغذائي الوراثي النادر.
- إصابة الأم بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) (ملاحظة: قد تختلف التوصيات المتعلقة بالرضاعة الطبيعية وفيروس نقص المناعة البشرية في بلدان أخرى).
- إصابة الأم بفيروس الخلايا التائية الليمفاوية البشرية من النوع الأول أو النوع الثاني.
- إصابة الأم بمرض فيروس الإيبولا.






الحالات التي يجب على الأمهات عدم إرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية

بشكل مؤقت:

- إصابة الأم بمرض الحمى المالطية غير المعالج.
 - تناول الأم لأدوية معينة.
 - تناول الأم للمستحضرات الصيدلانية المشعة.
 - إصابة الأم بفيروس الهربس البسيط النشط مع ظهور جروح على الثدي
- (ملاحظة: يمكن للأمهات الإرضاع مباشرة من الجروح غير المصابة على الثدي المصاب والتي يتم تغطيتها بالكامل لتجنب انتقال العدوى).






الحالات التي يجب على الأمهات عدم إرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية

مباشرة من الثدي وإرضاع الطفل من حليب الأم المخزن في الزجاج:

- إصابة الأم بمرض السل النشط وغير المعالج (ملاحظة: يمكن للأم أن تستأنف الرضاعة الطبيعية بعد أن يتم علاجها بشكل مناسب لمدة أسبوعين ويتم التأكد أنها لم تعد معدية).
- إصابة الأم بعدوى نشطة (الجدري المائي) إذا تطورت خلال الأيام الخمسة السابقة للولادة إلى اليومين التاليين للولادة.
- إصابة الأم أو الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا (يجب عصر الحليب باستخدام تقنية معقمة أو ضرورة ارتداء الكمامة أثناء إرضاع الطفل).





الرضاعة الطبيعية للخدج أو منخفضي الوزن عند الولادة أو الأطفال


المصابين بعيوب خلقية:

تعتمد طريقة التغذية على الطفل المريض وحالته بشكل عام، يمكن تقسيم

الرضاعة إلى فئات بناء على حالة الطفل:

- عدم قدرة الطفل على تناول الرضاعة عن طريق الفم.
- الطفل قادر على تناول الطعام عن طريق الفم ولكنه غير قادر على الرضاعة.
- الطفل قادر على الرضاعة ولكن ليس للرضعة الكاملة.
- يمكن للطفل أن يرضع جيدا.
- لا يستطيع الطفل الحصول على أي حليب الأم.






يفضل تناول حليب الأم لهذه الحالات بشكل خاص لاحتوائه على الآتي:

- عوامل المناعة الوقائية التي تساعد على الوقاية من العدوى.
- يحتوي على عوامل النمو التي تساعد أمعاء الطفل وأجهزته الأخرى على التطور والشفاء بعد الإسهال.
- يحتوي على إنزيمات تسهل هضم وامتصاص الحليب وأحماض دهنية أساسية خاصة تساعد على نمو الدماغ.

◀ الأطفال المرضى كالمصابين بأمراض القلب أو بمشاكل في الشفة/الحنك يحتاجون إلى حليب الأم بقدر أكبر مما يحتاجه الطفل السليم، بالإضافة إلى أن الرضاعة الطبيعية تهدئ الطفل وتقلل من الألم الناتج عن سحب الدم أو الألم المتعلق بحالته.






● الرضاعة الطبيعية لأكثر من طفل:

- يمكن للأمهات إنتاج ما يكفي من الحليب لطفلين، وحتى ثلاثة، فالعوامل الرئيسية ليست إنتاج الحليب، بل الوقت والدعم والتشجيع من مقدمي الرعاية الصحية والعائلة والأصدقاء.
- تشجيع الأم على الحصول على المساعدة في رعاية الأطفال الآخرين والقيام بالواجبات المنزلية.
- القيام بالرضاعة الطبيعية أثناء الاستلقاء للحفاظ على الطاقة، عندما يكون ذلك ممكناً.
- تناول نظاماً غذائياً متنوعاً.
- قضاء بعض الوقت مع كل طفل بشكل فردي.
- عندما يكون الأطفال التوأم والأم قادرين على الالتصاق بشكل جيد، يمكن للأم إطعامهم معاً إذا كانت ترغب في تقليل وقت الرضاعة.






- إذا كان أحد الأطفال يرضع جيدا والآخر أقل نشاطا، يجب التأكد من تبديل الثديين حتى يظل إنتاج الحليب مرتفعاً في كلا الثديين. الطفل الذي يتغذى بشكل أقل قد يستفيد من الرضاعة الطبيعية في نفس الوقت الذي يستفيد فيه الطفل الذي يتغذى بشكل أكثر فعالية، وبالتالي تحفيز منعكس الأوكسيتوسين.

إرضاع الطفل الرضيع والطفل الأكبر سناً:

ليست هناك حاجة عموماً إلى التوقف عن إرضاع طفل أكبر سناً عند ولادة طفل جديد. سوف تنتج الأم كمية كافية من الحليب لكليهما إذا تم الاعتناء الأم بنفسها، وهذا يشمل تناول الطعام بشكل جيد والراحة.





● أسئلة شائعة:

هل يرضع الطفل ليلاً؟

نعم وهي الأفضل لإدراج الحليب وخاصة خلال الأيام الأولى بعد الولادة.

هل تستطيع الأم إرضاع الطفل إذا كانت مصابة بالعدوى (الأنفلونزا


وغیره) ؟

نعم، يمكن الاستمرار بالرضاعة الطبيعية في حال الإعياء الشديد ينصح بشفط الحليب وأن يقوم شخص آخر بإرضاعه.

هل تستطيع الأم إرضاع الطفل إذا كانت تستخدم أدوية وعلاجات معينة؟

عليها التأكد أولاً من الطبيب إذا كانت هذه الأدوية آمنة خلال فترة الإرضاع، لأن هناك العديد من الأدوية يكون استخدامها آمناً خلال فترة الإرضاع ولا تؤثر في الطفل على خلاف بعض الأدوية الأخرى.





هل يمكن إرضاع الطفل بعد العملية القيصرية؟

لا يوجد أي سبب يمنع الأمهات من إرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية ولكن قد يحتجن فقط للمساعدة في الأيام الأولى، واختيار الطريقة المناسبة.


هل الرضاعة الطبيعية تسبب ترهلا في الثدي؟

الرضاعة الطبيعية لا تسبب ترهل الثدي، ولكن هرمونات الحمل يمكن أن تمدد الأربطة التي تدعم الثدي، فارتداء حمالة الصدر المناسبة أثناء الحمل وبعد الولادة كفيلة بحماية الثدي من الترهل.

هل تستطيع الأم المرضعة الصيام؟

نعم، بإمكان الأم المرضعة التي لا تعاني من مشاكل صحية (مثل داء السكري أو ارتفاع ضغط الدم) والتي وضعت طفل سليم أن تصوم دون أي قلق.





هل جميع الأمهات المرضعات ينتجن ما يكفي من الحليب؟

جميع النساء تقريبا قادرات جسديا على الرضاعة الطبيعية، فالبدء في الرضاعة مبكراً بعد الولادة والاستمرار فيها يساعد على إدرار الحليب وكلما زاد مقدار الحليب الذي يرضعه الطفل زاد مقدار الحليب الذي يقوم الثدي بتكوينه.


لماذا تشعر بعض الأمهات بألم عند الرضاعة الطبيعية؟

الرضاعة هي الطريقة الطبيعية لإطعام الطفل ولا ينبغي أن تؤلم لكن إذا أخطأت الأم في وضعيات الرضاعة فقد يسبب ذلك ألماً في الثديين أو الحلمات، وعليها طلب المساعدة من الطبيبة أو أخصائية الرضاعة الطبيعية لاكتشاف المشكلة .

هل الحمل الثاني يؤثر على رضاعة الطفل الأول؟

هذا معتقد خاطئ حيث يمكن للأم الحامل إرضاع طفلها الأول إذا لم يكن لديها سبب صحي يمنعها من الرضاعة.





هل تستطيع الأم إرضاع طفلها إذا كانت تعاني من مشاكل في شكل

الحلمات (حلمات مسطحة أو مقلوبة) ؟

يمكن للأم إرضاع الطفل و إن اختلف شكل وحجم الحلمات لأن ذلك لا يؤثر في إنتاج الحليب، وقد تحتاج بعض الأمهات طلب المساعدة من الطبيبة أو أخصائية الرضاعة الطبيعية لتعلم طريقة الرضاعة الصحيحة.

هل يجب على الأم التوقف عن الرضاعة الطبيعية بمجرد بدء الأطفعة

الصلبة في نحو سرتة أشهر؟

لا تتوقف فوائد الرضاعة الطبيعية عند بلوغ الطفل ٦ أشهر من العمر فهي تمده بالمواد المناعية والعناصر الغذائية اللازمة لنموه، وهناك بعض الأدلة على أنها تساعد في هضم الأطفعة الصلبة، كما أنها تواصل توفير توازن المواد الغذائية التي يحتاجها، وتوصي منظمة الصحة العالمية بأن يرضع جميع الأطفال رضاعة طبيعية لمدة تصل إلى سنتين أو أكثر إضافة إلى أن الحليب الصناعي لا يوفر نفس الحماية من المرض ولا يمنح الأم أي فوائد صحية.



