

CENÁRIO 1 : Sorvete Artesanal

INSTRUÇÕES:

1. Calcule as previsões usando MMS (n=3), MMP (pesos: 0.5, 0.3, 0.2) e SE (a=0.3)
2. Preencha as colunas de previsão para cada método
3. Calcule o erro percentual para cada período: $|(Real - Previsão)/Real| \times 100\%$
4. Calcule o MAPE final para cada método: Média dos erros percentuais

FÓRMULAS: $MMS = (D. + D..1 + D..2)/3$ | $MMP = (0.5 \times D. + 0.3 \times D..1 + 0.2 \times D..2)$ | $SE = a \times D. + (1-a) \times F.$

Mês	Demanda_Real	MMS_Aluno	MMP_Aluno	SE_Aluno	Erro_MMS	Erro_MMP	Erro_SE
Jan	120	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Fev	130	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Mar	180	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Abr	250	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Mai	400	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Jun	650	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Jul	800	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Ago	720	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Set	480	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Out	300	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Nov	200	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Dez	280	_____	_____	_____	_____	_____	_____
13o mês/MAPE FINAL	_____	_____	_____	_____	_____%	_____%	_____%

CENÁRIO 1 : Sorvete Artesanal – REGISTRO DAS PREVISÕES

Demanda Real (linha preta) – Desenhe as previsões incluindo o Mês 13 (previsão futura)

LEGENDA DE CORES:

. MMS (Média Móvel Simples) -> Use VERMELHO

. MMP (Média Móvel Ponderada) -> Use AZUL

. SE (Suavização Exponencial) -> Use VERDE

--- Linha pontilhada: Separa histórico de previsão

OBSERVAÇÕES:

• Qual método acompanhou melhor a demanda?

• Qual previsão para o Mês 13?

• Justifique sua resposta:

Demanda

PREVISÃO
MÊS 13

900

600

300

0

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

M13

Meses