
Four previously observed schools; best-tested D-only H = 1T
(a) D: mixed − same-H alone
H (T)
3
2
1
-0.10 [-.38,.15]
-0.02 [-.31,.33]
+0.10 [-.12,.33]
+0.08 [-.04,.21]
+0.19 [.02,.46]
+0.35 [.13,.58]
+0.15 [-.21,.54]
+0.33 [.17,.67]
+0.46 [.33,.65]
1
3
6
Gannets in mixed group
−0.4
0.0
0.4
(b) G: mixed − same-count alone
H (T)
3
2
1
+0.00 [.00,.00]
+0.50 [.33,.67]
+1.12 [.75,1.58]
+0.00 [-.75,.75]
+0.42 [-.33,1.42]
+1.21 [.58,1.87]
-0.25 [-.75,.00]
-0.17 [-.75,.42]
+0.54 [-.38,1.33]
1
3
6
Gannets in mixed group
−1
0
1
(c) D: mixed − best tested alone
H (T)
3
2
1
-0.48 [-.79,-.17]
-0.40 [-.75,-.04]
-0.27 [-.62,.02]
-0.02 [-.29,.21]
+0.08 [-.17,.35]
+0.25 [-.08,.58]
+0.15 [-.21,.54]
+0.33 [.17,.67]
+0.46 [.33,.65]
1
3
6
Gannets in mixed group
−0.4
0.0
0.4