

Guía 5, 2021, Julia

Lunes 17 de Mayo

Problema 1

Sea $f(x) = xe^x$. Aproxime $f'(2)$ mediante la *fórmula centrada de tres puntos*

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} + \mathcal{O}(h^2)$$

para distintos valores de h y calcule el incremento óptimo h_o teniendo en cuenta los errores de truncamiento y redondeo. Usando la diferencia entre $f'(2)$ (calculado en Julia usando las funciones matemáticas incorporadas) y el valor de la aproximación mencionada, grafique en escala *log-log* el error versus h para $h = 10^{-k}$ con k entero.

Problema 2

Para funciones $f(x)$ que son suficientemente diferenciables en $x = c$

1. Muestre que se puede aproximar $f'(c)$ con la *fórmula centrada de 5 puntos*

$$f'(c) = \frac{1}{12h} (f(c-2h) - 8f(c-h) + 8f(c+h) - f(c+2h)) + \mathcal{O}(h^4)$$

2. Muestre que la aproximación es exacta para polinomios de grado ≤ 4 .

Problema 3

1. Implemente el cálculo aproximado de las derivadas de $f(x) = \cos x$ y $g(x) = e^x$ utilizando las fórmulas i) *hacia adelante de 2 puntos*, ii) *centrada de 3 puntos* y iii) *centrada de 5 puntos*.
2. Haga un gráfico *log-log* del error relativo E vs h para $h \in [\epsilon_m(x), 0.1]$ y $x = 0.1, 1, 100$. Aquí $\epsilon_m(x)$ es la precisión de la máquina al valor x .
3. Verifique si el número de cifras decimales que obtiene coincide con las estimaciones presentadas en el teórico.
4. Identifique las regiones donde domina el error del algoritmo y el error de redondeo, respectivamente. Las pendientes que se observan, corresponden a las predichas en el teórico?

Problema 4

En el archivo `pos.dat` que se encuentra en el repositorio se dispone de un conjunto de datos experimentales de la posición de un móvil que se desplaza en línea recta. El mismo tiene dos columnas, siendo la primera el tiempo de la medición, t_i y la segunda la posición, $x(t_i)$.

1. Escriba un programa que lea los datos del archivo y calcule la velocidad del móvil para los mismos tiempos, t_i . Utilice la fórmula de 3 puntos. Preste especial atención a los puntos de los bordes del intervalo.
2. Repita el punto 1. utilizando las fórmulas de 5 puntos.

Ejercicios Complementarios

Problema C.1

Derivada segunda: Deduzca la fórmula centrada equiespaciada de tres puntos para la derivada segunda $f''(x_0)$. Incluya una cota para el error absoluto.

Problema C.2

Interpolación y diferenciación: Se conoce el valor de $f(x)$ en tres puntos x_0, x_1, x_2 . Escriba el polinomio interpolante $P_2(x)$ en la forma de Lagrange. Asuma que aproximamos $f'(x_i)$ por $P_2'(x_i)$,

1. Muestre que si tomamos $x_0 = c - h$, $x_1 = c$, $x_2 = c + h$ obtenemos la expresión del algoritmo centrado de tres puntos para $f'(c)$.
2. Muestre que, en general, esta aproximación arroja el algoritmo de tres puntos. Reobtenga la fórmula dada en el teórico para $x_0 = c - h_1$, $x_1 = c$, $x_2 = c + h_2$. Obtenga una expresión para las derivadas en extremos del intervalo $[a, b]$, $f'(a)$ con $x_0 = a$, $x_1 = a + h$, $x_2 = a + 2h$ y $f'(b)$ con $x_0 = b$, $x_1 = b - h$, $x_2 = b - 2h$.
3. Generalice a 5 puntos y re-obtenga el algoritmo centrado y equiespaciado en este caso.