

آزمون افکار خودکشی (SSI) در سال ۱۹۷۹ توسط آرون تمکین بک، ماریا کوکس و آریلین وایزمن و به جهت تعیین شدت افکار خودکشی تهیه شد. این آزمون برای متخصصین بالینی تهیه شد تا در مصاحبه‌های نیمه‌ساختارمند مورد بهره‌برداری قرار گیرد. این آزمون شامل ۱۹ مورد می‌شود که هر کدام از ۰ تا ۲ امتیاز دارند و مجموع امتیازات آن از ۰ تا ۳۸ است. این ۱۹ مورد نیز خود به ۳ دسته طبقه‌بندی شده‌اند که عبارتند از: «تمایل بالفعل برای خودکشی، آمادگی و تمایل بالقوه برای خودکشی». پژوهش‌های اولیه بر روی این آزمون نشانگر یک پایایی و روایی بالا بودند

۱-Beck, A.T. , Kovacs, M. , & Weissman, A. (1979) Assessment of suicidal ideation: The scale for suicide ideation. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 47, 343-352

۲-Beck; A. T., & Steer, R. A.. *Manual for the Beck Scale for Suicide Ideation*. San Antonio, TX: Psychological Corporation; 1991.

۳-خدابنده، فریده؛ نوبالا، احمدعلی؛ کاهانی، صبا؛ باقری، عباس (۱۳۹۱). بررسی عوامل مرتبط با اقدام به خودکشی در افراد میان سال و سالمند. روانشناسی سلامت، ۱(۱)، ۸۱-۹۲

۴-انیسی، جعفر؛ فتحی آشتیانی، علی؛ سلیمی، سید حسین؛ احمدی نوه ده، خدابخش (۱۳۸۴). ارزیابی اعتبار و روایی مقیاس خودکشی بک (BSSI) در سربازان . مجله طب نظامی؛ ۷(۱)، ۳۳-۳۹.