

$$\begin{aligned}
l &= \dots \pm \dots \\
m_c &= \dots \pm \dots, m_p = \dots \pm \dots \\
D_c &= \dots \pm \dots, D_p = \dots \pm \dots, D = \dots \pm \dots
\end{aligned}$$

Table 1: $m_{k1} = \dots \pm \dots, D_{k1} = \dots \pm \dots$

	t_i, c	$t_i - \langle t \rangle, c$	$(t_i - \langle t \rangle)^2, c^2$
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	$\langle t \rangle = \dots, c$	$\sum_{i=1}^n (t_i - \langle t \rangle) = \dots, c$	$\sum_{i=1}^n (t_i - \langle t \rangle)^2 = \dots, c^2$

Table 2: $m_{k2} = \dots \pm \dots, D_{k2} = \dots \pm \dots$

	t_i, c	$t_i - \langle t \rangle, c$	$(t_i - \langle t \rangle)^2, c^2$
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	$\langle t \rangle = \dots, c$	$\sum_{i=1}^n (t_i - \langle t \rangle) = \dots, c$	$\sum_{i=1}^n (t_i - \langle t \rangle)^2 = \dots, c^2$

Table 3: $m_{k3} = \dots \pm \dots, D_{k3} = \dots \pm \dots$

	t_i, c	$t_i - \langle t \rangle, c$	$(t_i - \langle t \rangle)^2, c^2$
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	$\langle t \rangle = \dots, c$	$\sum_{i=1}^n (t_i - \langle t \rangle) = \dots, c$	$\sum_{i=1}^n (t_i - \langle t \rangle)^2 = \dots, c^2$