

GUIA VISUAL + CARTÕES DE EMERGÊNCIA

Reconheça sinais de perigo, proteja seu pet e organize as primeiras ações enquanto busca atendimento veterinário.

Clube do Focinho | Edição novembro de 2026

Conteúdo educativo. Emergência real requer contato veterinário imediato.

LEIA PRIMEIRO

O guia que você espera nunca precisar

Prepare hoje; consulte rapidamente se algo acontecer.

Primeiros socorros são **medidas temporárias para reduzir riscos** e facilitar o atendimento. Não substituem exame clínico, cirurgia, antídotos, oxigênio ou medicação veterinária. [01–04]

OBSERVE

Verifique segurança do local, resposta, respiração e sangramento, sem atrasar socorro.

ACIONE

Ligue para o pronto atendimento veterinário e siga orientações durante o transporte.

TRANSPORTE

Manipule o mínimo necessário e leve fotos, embalagens e histórico do ocorrido.

Como consultar

- Os primeiros capítulos reúnem decisões rápidas e ações que servem para quase toda emergência.
- Os capítulos centrais detalham situações mais comuns em cães e gatos.
- As fichas finais foram feitas para preencher e deixar visíveis em casa.

Atenção à espécie

Cães e gatos não compartilham automaticamente técnicas, medicamentos nem limites fisiológicos com coelhos, aves, peixes e répteis. Para essas espécies, priorize estabilização ambiental e transporte por orientação especializada.

NAVEGAÇÃO

Seu mapa de emergência

Procure pela situação e não espere ler o manual inteiro.

VOCÊ ESTÁ DIANTE DE...	VÁ DIRETO A...
Dificuldade para respirar, engasgo, inconsciência	Respiração, engasgo e RCP
Sangue, ferimento, queda, atropelamento	Hemorragias, feridas e trauma
Convulsão, desmaio, fraqueza extrema	Convulsões e colapso
Veneno, remédio, planta, produto químico	Intoxicações e substâncias
Calor, queimaduras, frio, choque elétrico	Temperatura e acidentes
Barriga inchada, dificuldade para urinar	Emergências internas
Coelho, ave, réptil, peixe e outras espécies	Atenção especial por espécie
Preparação do tutor e dados do pet	Cartões e checklists imprimíveis

Fórmula para lembrar

Proteja o ambiente → Observe o pet → Peça ajuda → Aja apenas com medidas seguras → Transporte.

O semáforo do tutor

Dois segundos para reconhecer uma urgência podem mudar a ação.

SEMÁFORO DE DECISÃO

VERMELHO | ATENDIMENTO AGORA

Colapso, convulsão ativa, ar insuficiente, engasgo real, sangramento intenso, intoxicação suspeita ou trauma importante.

AMARELO | LIGUE E AVALIE RÁPIDO

Ferida, vômitos repetidos, mudança de comportamento, dor, coceira intensa, perda de apetite em espécies sensíveis.

VERDE | PREVENÇÃO E REGISTRO

Rotina segura, dados de emergência atualizados, kit revisado, observação de sinais antes que piorem.

Não espere sinais “clássicos”

Em intoxicações, traumas e emergências respiratórias, o pet pode piorar antes que existam sintomas evidentes. [02,03,05]

PRIMEIRA RESPOSTA

Os primeiros 60 segundos

Uma sequência curta para agir sem improviso.

A SEQUÊNCIA PRINCIPAL

01 | PROTEJA-SE

Afaste trânsito, fogo, fios, fumaça, substâncias químicas e animais agressivos. Não se torne uma segunda vítima.

02 | VEJA SE RESPONDE

Chame o pet e observe movimentos; evite sacudir ou movimentar coluna e pescoço.

03 | OBSERVE O AR

Procure movimento do tórax e esforço para respirar. Arfagem extrema e boca aberta em gato são alertas.

04 | CONTROLE SANGUE VISÍVEL

Se houver sangramento importante, aplique pressão direta com pano ou gaze limpa.

05 | LIGUE E SAIA

Informe o que ocorreu e vá à clínica 24h; mantenha monitoramento no caminho.

PRIMEIRA RESPOSTA

Quando sair de casa agora

Dificuldade de respirar, inconsciência e sangramento forte não podem esperar.

Sinais críticos

- Respiração difícil, ruído intenso, mucosas azuladas ou desmaio.
- Convulsão prolongada ou várias convulsões próximas; grande trauma, fratura exposta, paralisia.
- Vômitos sem produzir conteúdo associados a inquietação e abdômen inchado em cães.
- Gato que tenta urinar sem conseguir; coelho que para de comer e evacuar.
- Suspeita de veneno, medicamentos humanos, pesticidas ou produto químico.

BASE: [02,03,10,12,13]

Se não há clínica no seu município

Tenha previamente o contato de uma clínica 24h em cidade vizinha, telefone com chamada ativa e uma rota salva.

PREPARAÇÃO

Ligue antes e dê a informação certa

Uma descrição objetiva ajuda a equipe a se preparar.

O que dizer por telefone

- “Estou com um(a) [espécie], [idade aproximada], [peso se souber].”
- “Há [tempo] aconteceu [queda, ingestão, convulsão...].”
- “Neste momento ele [respira? responde? sangra?].”
- “Estamos em [bairro/cidade], chegamos em aproximadamente [tempo].”

O que levar

- Medicamentos em uso, alergias conhecidas, doenças, contato do veterinário habitual.
- Em intoxicação: foto da planta, rótulo, embalagem e quantidade estimada, sem atrasar a saída.
- Se possível, registre duração da crise e faça vídeo breve sem impedir o cuidado.

PREPARAÇÃO

Transporte sem agravar a lesão

Conforto, estabilidade e segurança importam mais do que “acomodar bonito”.

CAIXA

Para gatos e pequenos animais, caixa firme, ventilada e com toalha limpa.

MANTA

Em trauma, manta ou superfície rígida pode ajudar a mover mantendo o corpo alinhado.

ACOMPANHANTE

Uma pessoa dirige; outra observa o pet, se possível. Não dirija e faça manobras ao mesmo tempo.

Durante o deslocamento

- Evite pressionar o tórax, especialmente se estiver respirando com dificuldade.
- Não ofereça alimento, água ou medicação a um animal inconsciente, convulsionando ou com dificuldade de engolir.
- Avise a clínica se surgirem pioras, colapso ou nova crise.

BASE: [02,03,04]

PREPARAÇÃO

Seu kit de primeiros socorros

Itens simples, organizados e revisados.

ITEM	PARA QUE SERVE
Gazes e compressas estéreis	Pressão sobre sangramento e proteção temporária.
Atadura, fita e tesoura sem ponta	Fixação cuidadosa de curativo; sem apertar.
Soro fisiológico estéril	Irrigação superficial ou ocular quando indicada.
Luvas, toalha e manta	Proteção, contenção suave e transporte.
Lanterna e termômetro	Observação; usar termômetro apenas se souber.
Telefone carregado e contatos	Acionar a clínica e localizar rota.
Caixa / transporte e focinheira adequada	Transporte; não usar focinheira em dificuldade respiratória.

O que fica fora

Medicamentos humanos, pomadas de uso incerto, sedativos, seringas para forçar líquidos e “antídotos caseiros” não fazem parte de um protocolo doméstico seguro.

AVALIAÇÃO

Olhe a respiração primeiro

Sem movimentar desnecessariamente, observe o tórax e o esforço.

Respiração rápida pode ocorrer após exercício ou calor, mas **respiração difícil, boca aberta no gato, desmaio, ruído forte, pescoço estendido ou gengivas azuladas** são emergência. [02,03]

RESPIRA?

Observe se o tórax sobe e desce e se há entrada de ar.

FAZ FORÇA?

Note postura rígida, movimentos abdominais e esforço exagerado.

REAGE?

Observe atenção, resposta à voz e capacidade de permanecer em pé.

O que pode ajudar no caminho

- Ambiente ventilado, mínimo esforço e transporte na posição que o pet tolera melhor.
- Evite forçar abertura da boca, dar líquidos ou posicionar o animal de barriga para cima.

AVALIAÇÃO

Gengivas, consciência e choque

Sinais de má circulação precisam de atendimento imediato.

O que observar sem machucar

- Gengivas muito pálidas, acinzentadas ou azuladas (se forem visíveis naturalmente).
- Patas frias com fraqueza extrema, colapso ou confusão mental.
- Ferida importante, abdômen aumentado, respiração anormal e histórico de trauma.

BASE: [02,03]

O que não tentar

Não trate choque com bebidas, sal, analgésicos, massagens fortes ou “soro caseiro”. Na clínica, o tratamento pode exigir oxigênio e fluidos intravenosos.

Quando o pet parece engasgado

Engasgo verdadeiro compromete a passagem de ar: cada segundo conta.

RECONHEÇA E AJA

RECONHEÇA

Tentativas de respirar sem conseguir, tosse ineficaz, pânico, mucosas azuladas ou colapso.

ATIVE A AJUDA

Ligue em viva-voz para o serviço 24h e siga orientações profissionais.

SE FOR SEGURO

Somente objeto claramente visível e facilmente alcançável pode ser retirado com cuidado, sem empurrá-lo.

SE DESMAIAR

Se não responde e não respira normalmente, passe à página de reanimação para cães e gatos.

Nunca faça às cegas

Não introduza dedos profundamente para procurar objeto; risco de mordida e de empurrar o corpo estranho. Compressões abdominais/manobras dependem de porte e técnica: ideal aprender presencialmente com equipe veterinária. [01,08]

O que não é engasgo?

Tosse, espirro reverso, vômito e dificuldade cardíaca podem parecer semelhantes.

COMPARE OS SINAIS

SINAL / CENÁRIO	FAÇA AGORA	NÃO FAÇA
Tosse com ar entrando	Observar, manter calmo e ligar para triagem.	Não presumir que é corpo estranho.
Vômito / ânsia	Conferir se há distensão abdominal e fraqueza.	Não alimentar ou provocar vômito.
Inspiração ruidosa	Urgência se há esforço, alteração de cor, colapso.	Não colocar água na boca.
Gato ofegando com boca aberta	Tratar como emergência respiratória.	Não esperar “passar sozinho”.

Regra simples

Se você tem dúvida e o animal não consegue respirar normalmente, trate como urgência.

Quando considerar RCP

A reanimação é reservada à parada cardiorrespiratória.

Cães e gatos sem resposta e sem respiração normal podem precisar de RCP imediatamente. Não inicie compressões em um animal consciente ou que respira normalmente. Ligue para a emergência e peça orientação. [06,07,08]

CONFIRME

Observe resposta e respiração em poucos segundos; não perca tempo prolongado procurando pulso.

PEÇA APOIO

Uma pessoa aciona o atendimento e prepara o transporte.

COMECE

Se estiver em parada, inicie compressões e ventilação conforme treinamento.

Pontos de segurança

- Técnicas variam com tamanho e formato do tórax; treinamento prático é fortemente recomendado.
- A RCP não substitui desfibrilação, oxigênio e medidas hospitalares quando necessárias.

RCP em cães e gatos: o essencial

Resumo educativo das diretrizes RECOVER 2024; técnica requer capacitação.

CICLO BÁSICO QUANDO NÃO HÁ VIA AÉREA AVANÇADA

100–120	30 : 2	2 min
compressões/min	compressões : ventilações	ciclos com reavaliação

Fundamentos do atendimento

- Em parada confirmada, faça compressões torácicas firmes e rápidas, permitindo retorno completo do tórax; a profundidade e o local variam conforme porte e anatomia.
- Quando treinado, use a proporção 30 compressões para 2 ventilações em animal não intubado.
- Não faça RCP durante transporte se isso colocar o condutor em risco: combine socorro, revezamento e deslocamento seguro.

BASE: [06,07,08]

Importante

Este quadro é um lembrete, não substitui treinamento. Uma ventilação mal executada pode atrasar compressões; peça orientação por telefone e pratique com instrutor antes de qualquer emergência.

Sangramento: pressione e proteja

Sangramento contínuo ou intenso exige deslocamento imediato.

CONDUTA DE BAIXO RISCO

PROTEJA

Se houver risco de mordida, peça ajuda; não coloque as mãos em situação perigosa.

PRESSIONE

Use gaze ou pano limpo e aplique pressão firme contínua no local, sem ficar levantando para verificar.

NÃO RETIRE

Se o material ficar encharcado, acrescente novas camadas por cima.

TRANSPORTE

Mantenha a pressão durante o deslocamento e informe a clínica.

Evite torniquete improvisado

Torniquetes e amarrações apertadas podem causar dano. Em sangramento difícil de controlar, peça instrução veterinária direta. [01,04]

Cortes, arranhões e mordidas

A ferida que parece pequena pode esconder lesão profunda.

Ferida superficial

- Em ferida pequena e sem sangramento forte, lave delicadamente com água limpa ou soro fisiológico.
- Evite lambedura e mantenha em observação até avaliação quando indicada.

BASE: [04,14]

Mordida ou perfuração

- Mordidas podem infeccionar e causar danos internos mesmo com perfurações pequenas.
- Se houver sangramento, faça pressão direta e procure atendimento; especialmente urgente em gato mordido por cão.

BASE: [03,14]

Não use em feridas

Álcool, água oxigenada, cola doméstica, produtos de limpeza ou pomadas humanas sem orientação. Não retire corpos estranhos profundamente encravados.

Queda, atropelamento, fratura

Ferimentos internos podem não ser visíveis na hora.

Depois de atropelamento, queda importante ou esmagamento, considere possibilidade de fratura, hemorragia interna ou trauma de coluna **mesmo que o pet ainda esteja andando**. [02,03]

Como ajudar sem piorar

- Mantenha o animal parado e aquecido de modo confortável, sem aquecer excessivamente.
- Use uma manta como apoio ou superfície rígida se precisar movimentar, preservando alinhamento do corpo.
- Não tente reposicionar ossos, “testar” articulações ou montar uma tala improvisada sem orientação.

Gatilhos para sair imediatamente

Dificuldade respiratória, sangramento, dor intensa, fraqueza, pupilas desiguais, confusão, incapacidade de levantar.

Acidentes em casa e na rua

Uma rota de ação mais rápida para os acidentes comuns.

SITUAÇÃO E AÇÃO INICIAL

SINAL / CENÁRIO	FAÇA AGORA	NÃO FAÇA
Portão/porta prensou pata	Pare a fonte da pressão; proteja e leve para avaliação.	Não massageie ou “encaixe” a pata.
Pet caiu de altura	Evite movimentar, monitore respiração e vá à clínica.	Não presuma segurança por não haver sangue.
Briga entre animais	Separe com barreira segura; ferida exige avaliação.	Não puxe pelas pernas nem ponha mãos entre bocas.
Atropelamento	Acione socorro e transporte com suporte firme.	Não faça o animal caminhar até o carro.

SISTEMA NERVOSO

Convulsão: proteja sem conter

Durante a crise, o principal é evitar quedas, choques e traumas.

DURANTE A CONVULSÃO

MARQUE O TEMPO

Observe e registre o início; se seguro, faça um vídeo curto para o veterinário.

LIBERE O ESPAÇO

Afaste móveis e escadas; diminua estímulos sem imobilizar o corpo.

NÃO COLOQUE NADA NA BOCA

O pet não “engole a língua”; tentar abrir a boca pode causar mordidas e lesões.

LIGUE PARA A CLÍNICA

Primeira crise, repetição, crise prolongada ou dificuldade para recuperar exigem triagem urgente.

Crise prolongada é emergência

Se a crise durar cerca de 5 minutos ou se houver crises repetidas sem recuperação plena, procure atendimento emergencial. Não espere “terminar para ver”. [04,15]

Depois da convulsão

O pet pode ficar desorientado, tropeçar ou reagir por medo.

No período de recuperação

- Mantenha o local calmo, sem escadas ou obstáculos, e evite aproximar o rosto da boca.
- Observe se a respiração volta ao normal, se consegue se levantar e se há novas crises.
- Anote duração, movimentos, exposições a toxinas e uso de medicamentos.

Leve essas informações

Vídeo (se foi seguro gravar), duração, sinais anteriores e posteriores, dieta, medicamentos e possíveis exposições.

Não medicar por conta própria

Não ofereça sedativos, anticonvulsivantes, água ou comida durante a crise. Se já existe plano de medicação de resgate prescrito, siga exclusivamente as instruções individuais do veterinário.

Comeu, lambeu ou cheirou algo tóxico?

A ausência de sintomas não garante segurança.

PRIMEIRAS AÇÕES

INTERROMPA A EXPOSIÇÃO

Retire o produto ou leve o pet para área segura; proteja-se de vapores ou contato.

IDENTIFIQUE

Separe embalagem, nome comercial, princípio ativo, dose/quantidade aproximada e horário.

LIGUE IMEDIATAMENTE

Contate veterinário ou hospital; siga orientações específicas para a substância e a espécie.

VÁ À CLÍNICA

Se houver colapso, convulsão, dificuldade para respirar ou suspeita importante, vá ao pronto atendimento.

Não provoque vômito

Não dê sal, óleo, leite, carvão ativado, água oxigenada ou outro “antídoto” sem avaliação veterinária. Algumas exposições podem piorar com vômito. [01,05,16]

O que costuma causar acidentes

Pequenas exposições podem ser sérias dependendo da espécie.

ORIGEM	EXEMPLOS PARA INVESTIGAR
Medicamentos humanos	Paracetamol, anti-inflamatórios, antidepressivos e vitaminas em excesso.
Alimentos / bebidas	Chocolate, uva/passa, xilitol, cebola/alho, álcool e cafeína.
Produtos da casa	Desinfetantes, detergentes, solventes, inseticidas e iscas.
Plantas e jardim	Lírios para gatos, plantas irritantes, fertilizantes e pesticidas.
Produtos pet	Antipulgas errado para espécie; doses ou combinações incorretas.

Não confie apenas em uma lista

A gravidade depende de ingrediente, concentração, quantidade, intervalo e animal. Fotografe o rótulo.

Produto na pele, olho ou pelo

Substâncias corrosivas e pesticidas exigem conduta individualizada.

Contato na pele ou pelo

- Evite que o animal lamba a região; use luvas para impedir exposição humana.
- Peça orientação veterinária imediata: a escolha da lavagem depende do produto e do estado do pet.

Contato ocular

- Se for produto químico, a irrigação cuidadosa com água limpa ou soro fisiológico pode ser medida imediata enquanto se busca atendimento.
- Não aplique colírios, neutralizantes ou remédios caseiros. Evite pressionar o olho.

Nunca misture produtos

Não tente neutralizar ácido com base nem usar outro produto de limpeza na pele. Se há vapores, saia do ambiente antes de tocar no pet.

Calor extremo e insolação

Resfriar de imediato pode ser decisivo; transporte depois, sem demora.

Ofegação intensa, fraqueza, baba excessiva, desorientação, vômitos ou colapso após calor são sinais de risco. **Comece a resfriar antes de transportar** para o atendimento. [01,09,17]

RESFRIAMENTO SEGURO

VÁ À SOMBRA

Leve o pet a local arejado e interrompa exercício; peça ajuda.

MOLHE O CORPO

Aplique água fresca no tronco, procurando atingir a pele (sem jogar no rosto).

MOVIMENTE O AR

Ventilador ou ar-condicionado ajudam na evaporação.

TRANSPORTE

Após iniciar resfriamento efetivo, siga para o veterinário; continue ventilação durante trajeto.

Mesmo que pareça melhor

Lesões internas podem evoluir após melhora aparente. Não use álcool na pele; não cubra o animal inteiro com toalhas molhadas que dificultem dissipar calor.

Queimaduras térmicas e químicas

A área dolorosa ou com bolhas precisa ser avaliada.

Queimadura por calor

- Afaste com segurança a fonte (água quente, chapa, fogo).
- Se for seguro, resfrie a área com água corrente fresca por aproximadamente 20 minutos; procure o veterinário.
- Evite gelo diretamente na pele; cuidado para não esfriar o corpo inteiro em animais muito pequenos.

BASE: [01,18]

Queimadura por substância química

- Afastar a fonte e impedir lambedura são prioridades.
- Leve rótulo e peça orientação de descontaminação à equipe; produtos diferentes exigem condutas diferentes.

Não faça curativo caseiro de cozinha

Não passe pasta de dente, manteiga, óleo, pó de café, pomada humana ou substâncias desconhecidas em queimadura.

Frio intenso e hipotermia

Filhotes, idosos e pequenos animais são mais vulneráveis.

Quando suspeitar

- Exposição prolongada ao frio, animal molhado, tremores importantes ou fraqueza.
- Temperatura corporal baixa pode causar sonolência, lentidão e colapso.

Primeiras medidas

- Leve para lugar seco, protegido de vento, e envolva em manta limpa e seca.
- Aqueça gradualmente o ambiente, sem contato direto com bolsa muito quente ou aquecedor.
- Se estiver muito fraco, não force alimentação ou líquidos; procure avaliação.

Submersão e possível afogamento

Mesmo após recuperar a respiração, pode haver complicações.

O QUE FAZER

SEGURANÇA
Retire da água apenas se for seguro para você.

OBSERVE
Verifique resposta e respiração; acione veterinário imediatamente.

SE NÃO RESPIRA
Para cães e gatos em parada, siga a orientação de RCP aprendida em treinamento.

TRANSPORTE
Mantenha aquecido de modo confortável e leve para avaliação, mesmo que melhore.

Não sacuda nem pendure
Não balance o animal nem tente “tirar água dos pulmões” deixando a cabeça para baixo. Não force água ou alimento.

ACIDENTES

Choque elétrico e fios mordidos

Antes de tocar, interrompa a energia.

A regra que protege os dois

- Desligue a fonte elétrica pelo disjuntor ou tomada com segurança antes de se aproximar.
- Não toque no animal se ele ainda estiver em contato com fonte energizada.
- Depois, observe respiração, queimaduras na boca e fraqueza; vá à emergência.

BASE: [04]

Pode haver dano invisível

Eletrocussão pode provocar arritmia e edema pulmonar com manifestações tardias. Mesmo se o pet parece recuperado, procure orientação imediata.

Picadas de insetos e alergia grave

Inchaço facial ou dificuldade respiratória são sinais de perigo.

COMO DIFERENCIAR

SINAL / CENÁRIO	FAÇA AGORA	NÃO FAÇA
Dor local sem piora	Monitorar e consultar veterinário para conduta apropriada.	Não medicar por conta própria.
Face inchando / vômitos / urticária	Urgência, principalmente se há prostração.	Não esperar apenas “tomar um antialérgico”.
Respiração difícil / colapso	Emergência imediata.	Não oferecer líquidos ou comprimidos.

Se a reação começou após uma picada

Leve o nome provável do inseto e o momento da exposição; nem toda reação é igual.

Serpentes, aranhas e escorpiões

Não tente identificar à custa de sua segurança.

Conduta inicial

- Afaste o animal de áreas perigosas e reduza movimentação do pet.
- Fotografe o animal peçonhento apenas de longe, se for seguro.
- Leve o pet ao veterinário com urgência; a conduta depende do tipo de acidente e do quadro clínico.

Proibições importantes

Não faça corte, sucção, gelo diretamente sobre a picada, torniquete, álcool ou aplicação de substâncias.
Não tente capturar o animal agressor.

Lesões no olho: não pressione

Olho fechado, vermelho, turvo ou com trauma merece avaliação rápida.

O que você pode fazer

- Impeça o pet de esfregar a região e mantenha-o tranquilo.
- Em contato com produto químico, irrigue com água/soro estéril e procure atendimento.
- No caso de objeto preso, não retire nem pressione. Transporte cuidadosamente.

Evite colírio emprestado

Corticoides e outros colírios podem piorar determinadas lesões oculares. Não tente “abrir o olho” à força.

Barriga inchada e ânsia sem vômito

Em cães, pode sinalizar dilatação e torção do estômago.

Cão inquieto, com abdômen distendido, salivação, tentativas de vomitar sem produzir conteúdo, fraqueza ou colapso precisa de **atendimento imediato**. A síndrome de dilatação-vólvulo gástrico (GDV) pode ser fatal. [10,19]

Faça

- Avise o hospital 24h sobre suspeita de GDV e vá sem demora.
- Mantenha o animal tranquilo e evite caminhada desnecessária.

Não faça

Não ofereça água, comida, remédios ou anti-gases; não faça massagem abdominal nem tente “desinchar” em casa.

Pet tenta fazer xixi e não consegue

Gatos machos têm risco aumentado de obstrução urinária.

Sinais de alerta

- Muitas idas à caixa com pouca ou nenhuma urina, esforço, vocalização, lambedura genital ou vômitos.
- Pode ser confundido com prisão de ventre. O bloqueio urinário é uma emergência grave.

BASE: [03,20]

O que fazer

- Ligue e vá imediatamente ao pronto atendimento; informe quando urinou pela última vez.
- Não aperte a bexiga nem ofereça remédios caseiros para “desobstruir”.

Vômito e diarreia: o que observar

Filhotes, idosos e animais pequenos podem desidratar rapidamente.

QUANDO NÃO ESPERAR

SINAL / CENÁRIO	FAÇA AGORA	NÃO FAÇA
Sangue, colapso ou fraqueza intensa	Pronto atendimento veterinário.	Não medicar com fármacos humanos.
Vômitos repetidos sem reter água	Contate hospital rapidamente.	Não forçar água/alimento.
Filhote apático, possível parvovirose	Separar de outros animais e buscar atendimento.	Não aguardar “o dia seguinte”.
Vômito com abdômen distendido	Urgência de GDV/obstrução em cães.	Não massagear ou provocar vômito.

Parto difícil e emergências reprodutivas

Não puxe filhotes nem administre medicamentos por conta própria.

Procure atendimento rápido quando

- A mãe está muito fraca, com colapso, sangramento importante ou secreção de odor forte.
- Há esforço intenso sem nascimento, interrupção preocupante do trabalho de parto ou filhote visivelmente preso.
- Fêmea não castrada apresenta apatia, aumento abdominal, vômitos ou secreção vaginal; pode haver piometra.

Antes de sair

Aqueça adequadamente recém-nascidos, evite manipulações e telefone para orientação. Não use ocitocina nem tente extrair filhotes em casa.

Emergências que enganam tutores

Alguns sinais são discretos no início.

Fique atento a

- Cão que tenta vomitar, baba, caminha inquieto e tem barriga inchada.
- Ofegação intensa e cambaleio após exercício ou passeio no calor.
- Animal com grande esforço respiratório após engasgo, trauma ou contato com fumaça.
- Dor aguda, fraqueza súbita, gengiva pálida, incapacidade de ficar em pé.



Lembre

Porte grande não é sinônimo de resistência ao calor e porte pequeno não protege de acidentes.

GATOS

Emergências felinas mais comuns

Gatos frequentemente escondem a dor e a fraqueza.

Sinais que merecem decisão rápida

- Respiração com boca aberta, prostração ou gengiva azulada.
- Tentativas de urinar sem produzir urina, especialmente em machos.
- Queda importante, mordida por cão ou pancada; mesmo sem ferida grande.
- Lírios verdadeiros em casa, exposição a produto antipulgas inadequado ou ingestão suspeita.



Não trate como “manha”

Esconder-se, parar de comer ou evitar toque pode ser sinal clínico. Observe o padrão normal do seu gato.

Coelhos: urgências diferentes

Mudança no apetite e nas fezes é um dos sinais mais importantes.

Coelho que recusa alimento, fica quieto, apresenta abdômen desconfortável ou produz menos fezes pode estar em risco. **Não espere 24 horas.** Entre em contato com veterinário experiente em lagomorfos. [12,21]

Primeiras medidas

- Mantenha em ambiente calmo, em caixa segura, observando temperatura e respiração.
- Anote quando comeu, urinou e defecou pela última vez.
- Evite oferecer comida ou água com seringa sem orientação: se houver obstrução, forçar alimentação pode piorar o problema.

Porquinhos-da-índia e roedores

Pequenos animais perdem estabilidade rapidamente quando adoecem.

Sinais preocupantes

- Mudança brusca na alimentação, diminuição de fezes, respiração difícil, desequilíbrio ou queda de atividade.
- Em porquinhos-da-índia e chinchilas, dor abdominal e perda de apetite exigem ação rápida.
- Hamsters, ratos, gerbilos e camundongos podem adoecer gravemente antes de sinais muito evidentes.

Como transportar

- Caixa ventilada, substrato seguro, pouca movimentação e temperatura ambiental estável.
- Não use calor direto nem tente medicar com doses de outros mamíferos.

Aves: respiração e contenção

Respirar de bico aberto, balançar a cauda ou ficar no fundo da gaiola são alertas.

Sinais urgentes

- Esforço respiratório, penas eriçadas com grande apatia, queda do poleiro, convulsões, sangramento importante.
- Exposição a fumaça, aerossóis, vapores de panela superaquecida ou produtos de limpeza.

BASE: [13,22]

Primeiras medidas

- Reduza o estresse; mantenha o transporte ventilado, tranquilo e protegido de correntes de ar.
- Converse com veterinário de aves sobre suporte térmico apropriado.
- Não comprima o tórax durante contenção, pois aves dependem de movimento do corpo para respirar.

Não force alimento

Dar água ou comida por seringa sem treinamento pode causar aspiração. Procure profissional com experiência em aves.

Répteis e anfíbios

A temperatura e a umidade adequadas dependem da espécie.

Sinais de emergência

- Dificuldade para respirar, queimadura por lâmpada/aquecedor, trauma, prolapso, incapacidade de se mover.
- Recusa alimentar prolongada precisa ser contextualizada por espécie, estação, idade e condição corporal.

Transporte seguro

- Caixa ventilada e firme, protegida contra fuga; controle ambiental conforme orientação veterinária.
- Não use bolsa de água quente em contato direto, nem resfrie ou aqueça rapidamente.
- Anote temperatura, umidade, iluminação, alimento e mudanças no terrário.

BASE: [23,24]

Peixes e aquários em crise

Em aquáticos, a qualidade do ambiente pode ser a primeira urgência.

O que observar

- Peixes boquejando na superfície, perda súbita de equilíbrio, mortes em sequência ou muitos animais afetados.
- Água turva, falha de filtro/aeração, temperatura fora do padrão ou alteração de pH/amônia.

Primeiras ações de baixo risco

- Verifique se filtro e aeração estão funcionando e se houve uso recente de produtos químicos.
- Meça os parâmetros disponíveis e contate veterinário de animais aquáticos ou profissional de aquarismo qualificado.
- Não despeje medicamentos aleatórios nem faça mudanças bruscas de temperatura, salinidade ou pH.

CASA SEGURA

Prevenir é uma forma de socorrer

A maior parte da preparação começa antes do acidente.

COZINHA

Guarde chocolates, passas, adoçantes, ossos e produtos quentes.

BANHEIRO

Remédios, cosméticos e limpeza fora do alcance.

ÁREA EXTERNA

Evite plantas tóxicas, telas abertas, fios e químicos expostos.

Hábitos de proteção

- Confira janelas/telas, varandas, portões e lugares onde o pet possa cair ou fugir.
- Separe um local para caixa de transporte, kit e telefones de emergência.
- Treine o uso da caixa de transporte fora de emergências, com reforço positivo.

Checklist por cômodo

Use esta página como inspeção mensal da casa.

AMBIENTE	RISCO A VERIFICAR
Cozinha	Lixeira com tampa, alimentos tóxicos, fogão e fios.
Lavanderia	Produtos de limpeza e baldes com água.
Quarto	Medicamentos, elásticos, fios e pilhas.
Sala	Plantas, cordões, fios, móveis instáveis.
Varanda/janela	Telas adequadas, objetos que podem cair.
Quintal	Piscina, portão, venenos e ferramentas.
Aquário/terrário	Temperatura, energia, tampa e filtros.

FAMÍLIA

Todos precisam saber o básico

Pessoas diferentes podem cuidar do pet durante o dia.

Uma regra para visitas e crianças

- Não oferecer comida, remédios ou plantas sem perguntar ao tutor.
- Nunca colocar mão na boca de animal dolorido ou em crise.
- Se houver emergência, avisar tutor e ligar para contato veterinário salvo.
- Mostrar onde ficam documentos, caixa de transporte e kit SOS.

Pratique sem pet doente

Ensaiar “quem liga, quem pega a caixa e qual rota usamos” poupa minutos e evita decisões confusas.

AO AR LIVRE

Passeio, calor e acidentes

O kit SOS também pode acompanhar o pet fora de casa.

Antes de sair

- Confira coleira/peitoral, sombra, previsão de calor e água disponível.
- Evite exposição a asfalto muito quente, iscas, plantas desconhecidas e lixo.
- Tenha contato da clínica mais próxima do trajeto e transporte seguro.

Se ocorrer um acidente

- Saia do local perigoso, reduza estímulos e mantenha o pet sob observação.
- Informe à clínica a localização, o que aconteceu e tempo estimado até chegada.

CENÁRIO GUIADO

Cachorro pegou chocolate da mesa

Uma simulação para você saber qual informação reunir.

ROTEIRO DE AÇÃO

INTERROMPA
Retire o acesso ao chocolate e proteja o restante da casa.

FOTOGRAFE
Embalagem, tipo, peso aproximado da barra e quantidade faltante.

INFORME
Peso do cão, horário aproximado, sinais observados e composição do produto.

LIGUE AGORA
Procure veterinário para avaliação do risco e orientação de transporte.

O que evitar
Não aguarde sintomas nem tente provocar vômito com sal ou água oxigenada. [05,16]

CENÁRIO GUIADO

Gato entra na caixa e não urina

Pode parecer apenas prisão de ventre ou desconforto leve.

ROTEIRO DE AÇÃO

OBSERVE
Tentativas repetidas, esforço, vocalização e pouca/nenhuma urina.

MARQUE
Última micção confirmada, possível sangue, vômitos e apatia.

ACIONE
Informe suspeita de obstrução urinária ao hospital 24h.

NÃO ESPERE
Leve imediatamente; não pressione a barriga nem dê remédios.

CENÁRIO GUIADO

Ave com dificuldade para respirar

A resposta segura é reduzir estresse e chegar à equipe especializada.

ROTEIRO DE AÇÃO

PARE A FONTE

Se houve fumaça ou vapor, retire a ave para ar limpo sem riscos humanos.

OBSERVE

Bico aberto, cauda balançando, incapacidade de empoleirar.

MINIMIZE

Ambiente silencioso, transporte ventilado e sem compressão do tórax.

PROCURE

Hospital com atendimento de aves/exóticos imediatamente.

CENÁRIO GUIADO

Coelho parou de comer e fazer fezes

Uma urgência frequente que não deve ser tratada com receitas caseiras.

ROTEIRO DE AÇÃO

CONFIRA

Último alimento, últimas fezes, postura e disposição.

MANTENHA CALMO

Caixa segura e manejo delicado; evite calor extremo.

NÃO FORCE

Não dê laxante, óleo ou alimento por seringa sem ordem veterinária.

VÁ À CLÍNICA

Peça atendimento de profissional experiente em coelhos.

CENÁRIO GUIADO

O pet caiu e não quer se levantar

Observe sem realizar um exame doloroso em casa.

ROTEIRO DE AÇÃO

PROTEJA

Afaste barulho e curiosos; verifique se respira.

NÃO MOVIMENTE À TOA

Se precisar retirar do risco, mova com corpo apoiado.

INFORME

Altura da queda, superfície, momento e sinais observados.

TRANSPORTE

Procure avaliação urgente para investigar lesão interna.

APRENDIZAGEM

Mitos que podem atrasar o socorro

Boas intenções às vezes pioram uma emergência.

“Se não há sangue, não é grave.”

- Traumas podem causar lesão interna sem feridas abertas.

“Todo veneno exige vômito.”

- Provocar vômito pode causar aspiração e agravar exposição.

“Deixe a convulsão passar, sem ligar.”

- Crise prolongada ou repetida é urgência.

“O gato está só preso de ventre.”

- Esforço sem urinar pode ser obstrução fatal.

“Coelho pode ficar um dia sem comer.”

- Alteração de apetite e fezes é aviso importante.

“Passou o calor; está salvo.”

- Golpe de calor pode causar lesão interna tardia.

PARA IMPRIMIR

Cartaz de emergência | 1 página

Coloque perto da porta, na geladeira ou na caixa de transporte.

1. PROTEJA

- Evite trânsito, eletricidade, fumaça, químico ou animal agressivo.

2. OBSERVE

- O pet responde? Respira normalmente? Há sangramento intenso?

3. LIGUE

- Acione a clínica 24h e siga orientações profissionais.

4. AJA COM SEGURANÇA

- Pressão direta sobre sangramento; resfriamento se calor extremo; não medique.

5. TRANSPORTE

- Leve com estabilidade e histórico do que ocorreu.

AVISO

Se há colapso, respiração difícil, engasgo, trauma grave ou toxina, procure atendimento imediatamente.

PARA IMPRIMIR

Cartão SOS | Dados do pet

Preencha agora e coloque uma cópia no carro ou bolsa.

NOME DO PET / ESPÉCIE / RAÇA / IDADE

PESO / COR / IDENTIFICAÇÃO (SE HOUVER)

TUTOR E TELEFONE / CONTATO ALTERNATIVO

CLÍNICA VETERINÁRIA 24H / TELEFONE

ENDEREÇO E ROTA PARA A CLÍNICA

DOENÇAS, ALERGIAS OU RESTRIÇÕES

MEDICAMENTOS REGULARES / ORIENTAÇÕES ESCRITAS

PARA IMPRIMIR

Ficha de passagem à equipe

Registre fatos observáveis, não diagnósticos.

O QUE ACONTECEU?

QUANDO ACONTECEU? / ONDE?

SINAIS OBSERVADOS / QUANTO TEMPO DURARAM?

EXPOSIÇÃO: PRODUTO / EMBALAGEM / QUANTIDADE?

O QUE FOI FEITO ATÉ AGORA?

VÍDEO, FOTO OU OBJETO QUE ACOMPANHA O PET

PARA IMPRIMIR

Checklist do kit SOS

Revisar pelo menos a cada seis meses e antes de viagens.

ITENS BÁSICOS

- [ ] Gazes / compressas estéreis
- [ ] Atadura / fita adequada
- [ ] Luvas descartáveis
- [ ] Tesoura sem ponta
- [ ] Soro fisiológico estéril
- [ ] Toalha / manta limpa
- [ ] Lanterna
- [ ] Caixa de transporte funcional
- [ ] Contatos de emergência
- [ ] Celular com bateria
- [ ] Medicamentos prescritos: plano escrito
- [ ] Documentos e ficha de saúde

VENCIMENTOS / ITENS PARA REPOR

Não adicione por conta própria

Medicamentos ou produtos para induzir vômito: a presença no kit pode incentivar uso inadequado.

PARA IMPRIMIR

Checklist de casa protegida

Marque os ambientes que já estão preparados.

REVISÃO PREVENTIVA

- [ ] Fios e tomadas protegidos
- [ ] Portões bem fechados
- [ ] Janelas e sacadas seguras
- [ ] Kit SOS com materiais atuais
- [ ] Remédios inacessíveis
- [ ] Clínica 24h salva no celular
- [ ] Produtos químicos trancados
- [ ] Caixa de transporte pronta
- [ ] Plantas avaliadas por espécie
- [ ] Família sabe a rota
- [ ] Alimentos perigosos fora de alcance
- [ ] Plano para ausência do tutor

RISCO IDENTIFICADO / QUEM VAI RESOLVER / DATA

PARA IMPRIMIR

Diário de sinais e intercorrências

Use para acompanhar sintomas enquanto busca orientação.

DATA/HORA	O QUE OBSERVOU	DURAÇÃO / AÇÃO

ORIENTAÇÕES DO VETERINÁRIO / PRÓXIMOS PASSOS

PARA IMPRIMIR

Plano de transporte seguro

O que já pode ficar definido antes de qualquer urgência.

CLÍNICA 24H DE REFERÊNCIA / TELEFONE

SEGUNDA OPÇÃO / CIDADE

ROTA PRINCIPAL / TEMPO ESTIMADO

QUEM DIRIGE / QUEM ACOMPANHA

ONDE ESTÃO CAIXA, MANTA E KIT SOS?

CUIDADOS ESPECÍFICOS DA ESPÉCIE

CONTATO DE UM CUIDADOR DE CONFIANÇA

PARA IMPRIMIR

Cartão de orientação a cuidadores

Para pet sitter, avós, hotel ou outro responsável.

SE HOUVER SINTOMAS GRAVES: não oferecer remédios ou alimentos; contatar tutor e hospital veterinário; ir imediatamente se houver dificuldade respiratória, colapso, intoxicação ou convulsão grave.

PET / ESPÉCIE / TUTOR / TELEFONE

CLÍNICA VETERINÁRIA 24H / ENDEREÇO

RESTRIÇÕES, ALERGIAS E MEDICAMENTOS PRESCRITOS

SE O TUTOR NÃO RESPONDER, CONTATAR

LOCAL DA CAIXA DE TRANSPORTE / KIT

PARA IMPRIMIR

Cartaz: o que NÃO fazer

Uma lista curta para evitar erros que pioram a urgência.

NÃO PROVOCAR VÔMITO

- Sem determinação veterinária, não dê sal, óleo, água oxigenada ou outras substâncias.

NÃO COLOCAR NADA NA BOCA

- Durante convulsão ou engasgo sem objeto visível, não faça varredura com os dedos.

NÃO DAR REMÉDIOS HUMANOS

- Analgésicos, antialérgicos e sedativos podem ser perigosos.

NÃO IMOBILIZAR À FORÇA

- Evite segurar animal em convulsão ou manipular fratura.

NÃO ESPERAR PASSAR

- Traumas internos, obstrução urinária e intoxicação podem piorar sem sinais óbvios.

PARA IMPRIMIR

Registro de medicamentos prescritos

Este campo guarda a prescrição existente: não serve para iniciar tratamento.

REMÉDIO PRESCRITO	ORIENTAÇÃO ESCRITA	VETERINÁRIO / CONTATO

Evite erros

Mantenha cópia da prescrição atualizada e nunca use dose anotada para outro animal ou espécie.

PARA IMPRIMIR

Rede de apoio e telefones

Escreva contatos e deixe a folha junto dos documentos.

VETERINÁRIO HABITUAL / TELEFONE

PRONTO ATENDIMENTO VETERINÁRIO 24H

ATENDIMENTO DE ANIMAIS SILVESTRES / EXÓTICOS

SERVIÇO DE RESGATE / BOMBEIROS LOCAL (SE APLICÁVEL)

PESSOA DE CONFIANÇA 1 / TELEFONE

PESSOA DE CONFIANÇA 2 / TELEFONE

ALGUÉM QUE POSSA DIRIGIR / TRANSPORTAR

CONSULTA RÁPIDA

Uma página para lembrar do essencial

Revise regularmente, inclusive quando o pet está saudável.

AR

Respiração difícil, boca aberta em gatos ou gengiva azulada: emergência.

SANGUE

Pressão direta e transporte sem atrasos.

VENENO

Guarde embalagem; não provoque vômito.

CONVULSÃO

Afaste perigos, cronometre e não ponha nada na boca.

CALOR

Comece a resfriar com água e ventilação; vá ao veterinário.

TRAUMA

Mova o mínimo e apoie o corpo ao transportar.

Em qualquer dúvida relevante

A clínica de emergência deve orientar a decisão. Use este manual para organizar a resposta, não para adiar atendimento.

FONTES

Referências e leitura 1

Bases técnicas públicas e diretrizes veterinárias consultadas (links clicáveis).

Referências numeradas ao longo das páginas. As recomendações podem ser atualizadas; verifique sempre a orientação de um médico-veterinário e as normas locais.

[01] RECOVER Initiative / JVECC: 2026 First Aid Guidelines for Dogs and Cats

[02] Merck Veterinary Manual: Evaluation and Initial Treatment of Dog and Cat Emergencies

[03] Merck Veterinary Manual: First Aid and Transport of Small Animals

[04] PDSA: First Aid for Pets: Guide and Common Emergencies

[05] ASPCA: What to Do if Your Pet Is Poisoned

[06] RECOVER Initiative: 2024 CPR Guidelines

[07] JVECC / RECOVER: 2024 Updated Treatment Recommendations for CPR in Dogs and Cats

[08] American Red Cross: How to Perform CPR on a Dog

[09] Royal Veterinary College: Heatstroke in Dogs and Cats: Prevention and First Aid

FONTES

Referências e leitura 2

Bases técnicas públicas e diretrizes veterinárias consultadas (links clicáveis).

[10] PDSA: GDV / Gastric Dilatation Volvulus in Dogs

[11] American Red Cross: How to Perform CPR on a Cat

[12] RSPCA: Rabbit Health: Signs of Illness and Care

[13] Merck Veterinary Manual: Injuries and Accidents of Pet Birds

[14] PDSA: First Aid for Cuts and Grazes

[15] American Red Cross: Seizures in Cats

[16] ASPCA: Is It Ever Safe to Induce Vomiting?

[17] RVC / Veterinary Epidemiology: Cool First, Transport Second

[18] RECOVER Initiative: 2026 First Aid: Algorithms and Figures for Owners

FONTES

Referências e leitura 3

Bases técnicas públicas e diretrizes veterinárias consultadas (links clicáveis).

[19] **Cornell University:** Gastric Dilatation Volvulus (GDV)

[20] **PDSA:** Emergency: Cat Cannot Pass Urine

[21] **RSPCA:** What Do Rabbits Eat?

[22] **Merck Veterinary Manual:** Management of Pet Birds

[23] **Merck Veterinary Manual:** Management and Husbandry of Reptiles

[24] **Merck Veterinary Manual:** Clinical Techniques in Amphibians

[25] **FDA:** Who Do You Call if You Have a Pet Emergency?

[26] **AAHA:** RECOVER Publishes First Aid Guidelines for Dogs and Cats

[27] **American Red Cross:** What to Do if Your Cat Is Choking

FONTES

Referências e leitura 4

Bases técnicas públicas e diretrizes veterinárias consultadas (links clicáveis).

[28] PDSA: First Aid for Heatstroke

PARA GUARDAR

Preparação é cuidado e carinho

Um bom plano nunca substitui o atendimento de quem sabe cuidar.

Salve os telefones, conheça a rota, revise o kit e ensine sua família a reconhecer sinais de perigo. Em uma emergência, **agir com segurança e buscar atendimento rapidamente** é mais importante do que improvisar procedimentos.

PREVENÇÃO

Deixe riscos e substâncias perigosas fora do alcance.

OBSERVAÇÃO

Reconheça alterações em respiração, apetite, postura e consciência.

AÇÃO

Organize informação, ligue para a clínica e transporte com cuidado.



Sobre este material

- Edição novembro de 2026. Guia educativo com base em literatura veterinária e fontes institucionais públicas.
- Não é consulta, diagnóstico ou prescrição. Antes de comercialização, recomenda-se revisão integral por médico-veterinário habilitado, com experiência em emergência e espécies abrangidas.