

Les différentes méthodes de contraception

Méthode contraceptive		Nom	Généralité	Mode d'utilisation	Mode d'action	Efficacité	Principales contre-indications
La contraception hormonale	La contraception œstro-progestative	La pilule	Elle associe un œstrogène de synthèse à un progestatif de synthèse . Les différentes pilules se différencient en fonction du dosage en hormones, du type de progestatif, du schéma de prise ou encore de la nature de l'œstrogène... - pilule monophasique : tous les comprimés contiennent la même quantité d'hormones. - pilule multiphasique : Les comprimés contiennent des quantités d'hormones différentes. Il est très important de respecter l'ordre de prise des comprimés de la plaquette.	La toute première fois, la prise de pilule débute le 1 ^{er} jour des règles. Selon la pilule, la prise se fait quotidiennement pendant 21 ou 28 jours consécutifs, au même moment de la journée, sans dépasser un décalage de prise de 12 heures. Puis : - si votre plaquette comporte 21 comprimés : interrompre pendant 7 jours la prise des comprimés et le 8 ^{ème} jour, débiter une autre plaquette. - si votre plaquette comporte 28 comprimés (avec 2,4 ou 7 comprimés placebo), la prise se fait en continu. Il faut enchaîner une autre plaquette sitôt la précédente terminée. Dans tous les cas, lisez attentivement la notice.	- Blocage de l'ovulation - Modification de l'endomètre pour empêcher la nidation - Modification de la glaire pour empêcher les spermatozoïdes de franchir le col de l'utérus	L'efficacité est bonne dans leur emploi courant, sans oubli de prise, d'application ou d'insertion.	Les plus graves sont les troubles cardio-vasculaires, les pathologies hépatiques, certains cancers hormono-dépendants et l'allergie à l'un des composants. Un entretien, un examen médical une prise de sang et un suivi médical sont indispensables pour la recherche d'éventuelles contre-indications et pour une prescription adaptée à chaque femme.
		Le patch (ou dispositif transdermique)	Il délivre en continu des hormones oestroprogestatives	Le patch est adhésif, il se colle sur la peau. Il y a plusieurs sites d'applications possibles : l'abdomen, le bras (face antérieure), les fesses et le torse (partie supérieure). Ne pas appliquer le patch sur les seins. Utiliser un patch par semaine pendant 3 semaines : 3 semaines avec patch, une semaine sans patch. Les règles surviennent pendant la semaine sans patch.			
		L'anneau vaginal	En matière synthétique, il délivre en continu des hormones oestroprogestatives . Ces hormones passent dans la circulation sanguine en traversant la paroi vaginale.	L'anneau vaginal est inséré par la femme au fond du vagin pour 3 semaines : 3 semaines avec anneau et 1 semaine sans anneau (les règles surviennent pendant la semaine sans anneau)			
	La contraception progestative	La pilule progestative	Elle ne contient qu'une seule hormone : un progestatif de synthèse . Elle est souvent utilisée par les femmes ne supportant pas l'œstrogène.	Plaquette de 28 comprimés. Prendre le 1 ^{er} comprimé le 1 ^{er} jour des règles puis tous les jours sans interruption entre les 2 plaquettes. Pour que l'efficacité soit maintenue, la prise doit se faire très régulièrement, sans dépasser un décalage de prise de 3 heures (sauf mentions spéciales de la notice).	- Modification de l'endomètre pour empêcher la nidation - Modification de la glaire pour empêcher les spermatozoïdes de franchir le col de l'utérus - Blocage de l'ovulation possible selon le type de pilule progestative	L'efficacité est bonne dans son emploi courant, sans oubli de prise	Les pathologies hépatiques, certains troubles vasculaires, certains cancers hormono-dépendants et l'allergie à l'un des composants
		L'implant	Il se compose d'un bâtonnet cylindrique qui délivre en continu dans la circulation sanguine un progestatif	L'implant se place sous la peau, à la face interne du bras sous anesthésie locale. Après avoir écarté les contre-indications éventuelles, il est mis en place pour 3 ans, par le médecin, lors d'une consultation. Il se retire par une petite incision sous anesthésie locale.	- Blocage de l'ovulation - Modification de l'endomètre pour empêcher la nidation - Modification de la glaire cervicale pour empêcher les spermatozoïdes de franchir le col de l'utérus	L'efficacité est bonne et n'est pas liée à une prise ou à une utilisation régulière	
		Le système intra-utérin progestatif (SIU)	Constitué d'un petit « réservoir » contenant un progestatif de synthèse délivré en continu, porté par une structure plastique en forme de T	Le SIU progestatif est inséré par le médecin dans la cavité utérine. Il a une durée d'action maximum de 5 ans.	- Modification de l'endomètre pour empêcher la nidation grâce à l'effet progestatif local - Modification de la glaire pour empêcher les spermatozoïdes de franchir le col de l'utérus La libération locale de ce progestatif a un impact important sur les règles : elles diminuent en durée et en volume et peuvent même disparaître	L'efficacité est bonne et n'est pas liée à une prise ou à une utilisation régulière	Les malformations de l'utérus, un risque infectieux, les pathologies hépatiques, certains cancers hormono-dépendants et l'allergie à l'un des composants

La contraception mécanique	La contraception intra-utérine au cuivre	Le dispositif intra-utérin au cuivre	Il existe différentes formes de dispositifs intra-utérins au cuivre (DIU Cu) : ils sont constitués d’une armature plastique généralement en forme de T recouverte partiellement d’un fil de cuivre	Le DIU est inséré par le médecin dans la cavité utérine, pour une durée de 4 à 5 ans, voire même 10 ans	- Action toxique du cuivre sur les spermatozoïdes en les empêchant de parvenir jusqu’aux trompes - Réaction inflammatoire (et non infectieuse) de la muqueuse utérine qui empêche la nidation de la cellule-œuf Les DIU au cuivre peuvent, dans certains cas, avoir un impact sur les règles en augmentant leur volume et leur durée	L’efficacité est bonne et n’est pas liée à une prise ou une utilisation régulière	Les malformations de l’utérus, les maladies hémorragiques, un risque infectieux élevé, les allergies au cuivre
	Les préservatifs	Préservatif masculin	Il est disponible en différentes épaisseurs, textures et tailles, en latex ou polyuréthane	Il se déroule sur le pénis	Empêche l’entrée des spermatozoïdes dans le vagin lors de l’érection	Compte-tenus des risques de rupture et de glissement, la femme qui les utilise en tant que méthode contraceptive doit être informée des possibilités de contraception d’urgence Seuls les préservatifs assurent une protection efficace contre les IST	Allergies au latex
		Préservatif féminin	En plastique très fin	Il se place à l’intérieur du vagin avant les rapports sexuels	Bloque l’entrée du col de l’utérus empêchant les spermatozoïdes de passer		
	Diaphragme et cape cervicale		Le diaphragme est un disque souple en latex, bombé en coupole, entouré d’un anneau spiralé. La cape cervicale a une forme plus bombée.	Une fois introduit dans le vagin, il se déploie en demi-sphère et vient recouvrir le col de l’utérus On l’introduit au plus tôt 6 heures avant les rapports sexuels et on l’enlève au plus tôt 6 à 8 heures après (mais pas plus tard que 24 heures)	Bloque l’entrée du col de l’utérus, empêchant les spermatozoïdes de passer Le spermicide que l’on utilise toujours avec ce système tue ou immobilise les spermatozoïdes	Efficaces lorsqu’elles sont utilisées de manière optimale	Allergies au latex
La contraception chimique	Les spermicides		Ce sont des crèmes, des gels ou des ovules	Ils sont à déposer dans le vagin avant l’acte sexuel	Forment une barrière chimique qui détruit les spermatozoïdes ou les rend inactifs Ces produits ne sont généralement pas utilisés seuls mais en complément d’autres méthodes comme le préservatif ou le diaphragme		Allergies aux composants
Les méthodes naturelles	Enregistrement de la température corporelle Evaluation des modifications de la glaire cervicale Méthode du retrait ou coït interrompu		Ce sont des méthodes se basant sur la connaissance du cycle sexuelle chez la femme et les modifications qui sont associées	Au moment de l’ovulation, une légère augmentation de la température st observée et qui reste à cette valeur jusqu’à la fin du cycle La glaire cervicale est lâche au moment de l’ovulation Retrait du pénis avant éjaculation	Empêche toute rencontre entre le spermatozoïde et l’ovule	Très faible. Ce sont les méthodes où la probabilité d’avoir un enfant est forte (entre 20 à 27 % de taux d’échec)	
La contraception d’urgence	Norlévo et Ellaone		Méthode de rattrapage après tout rapport non protégé ou à la suite d’un accident de préservatif, ou en cas d’oubli de pilule, de patch ou d’anneau	La prise de cette contraception d’urgence (1 comprimé en une seule prise) doit se faire le plus rapidement possible (dans les 72 heures jusqu’à 5 jours selon notice de la contraception) après le rapport sexuel à risque Elle est disponible en pharmacie et sans ordonnance. Elle est gratuite pour les jeunes filles mineures. Il s’agit d’une méthode contraceptive d’exception et en aucun cas d’un mode de contraception régulier !	- Retarde l’ovulation ou la perturbe quand elle est sur le point de se produire - Modifie l’endomètre de façon à ce qu’il ne puisse pas accueillir une éventuelle cellule-œuf	L’efficacité est liée à la rapidité de prise après le rapport non protégé	

