

۱ نقطه $(-2, 1)$ رأس یک سهمی است. معادله خطی که از این نقطه و یکی از ریشه‌ها می‌گذرد، $y = 4x - 6$ است. عرض نقطه برخورد این سهمی با محور عرض‌ها کدام است؟

- (۱) ۱۲ (۲) ۴
(۳) ۸ (۴) ۶


۲ نمودار سهمی $f(x) = (mx - 4)(4 + 2x)$ بر محور x مماس است. مقدار m چه عددی است؟

- (۱) -۴ (۲) ۲
(۳) -۲ (۴) ۴

۳ خط به معادله $y = -\frac{5}{2}x$ محور تقارن منحنی تابع با ضابطه $y = \frac{1}{4}x^2 - 3x + a$ را بر روی خود منحنی قطع می‌کند. a کدام است؟


- (۱) -۲ (۲) -۱
(۳) ۱ (۴) ۲

۴ در سهمی شکل زیر، محل تلاقی نمودار با محور عرض‌ها کدام است؟



- (۱) ۱ (۲) ۱/۵
(۳) ۳۲/۲۵ (۴) ۱۶/۲۵


۵ شکل زیر، نمودار تابع $f(x) = ax^2 + bx + c$ است. a کدام است؟



- (۱) $-\frac{2}{9}$ (۲) $-\frac{1}{9}$
(۳) $-\frac{1}{2}$ (۴) $-\frac{2}{5}$

۶

نمودار زیر مربوط به سهمی $y = f(x)$ است. مجموع مربعات جواب‌های معادله $f(x) = 0$ کدام است؟



(۱) ۵


(۲) ۶

(۳) ۷

(۴) ۸

۷

در سهمی شکل زیر به معادله $f(x) = ax^2 + bx + c$ ، اگر $a - b = -3$ ، آنگاه $f(1)$ کدام است؟



(۱) -۴

(۲) صفر

(۳) ۴

(۴) ۵

۸

صفرهای تابع درجه دومی، دو عدد زوج متوالی است. اگر طول رأس ۳ و محل تلاقی منحنی با محور عرض‌ها -۴ باشد، آنگاه ماکزیمم تابع کدام است؟

(۲) ۷/۵

(۱) ۵/۰


(۴) ۱۰/۵

(۳) ۹/۵


۹

اگر در سهمی $y = ax^2 + bx + c$ ، ضرایب a ، b و c هر سه مثبت باشند، در این صورت کدام گزینه می‌تواند نمودار این سهمی باشد؟


(۲)




(۴)




(۱)



(۳)



باتوجه به نمودار تابع درجه دوم $y = 3x^2 + ax + 18$ ، مساحت مثلث سایه زده کدام است؟



- (۱) $\frac{3}{2}$
(۲) $\frac{3}{4}$
(۳) $\frac{3}{8}$
(۴) $\frac{3}{16}$

رأس سهمی به معادله $y = x^2 + mx - \frac{1}{4}$ ، روی نیمساز ناحیه اول و سوم محورهای مختصات واقع است. اگر این سهمی محور xها را در نقاط A و B قطع کند، طول پاره خط AB کدام است؟

- (۱) $\sqrt{2}$
(۲) $\frac{\sqrt{2}}{2}$
(۳) ۱
(۴) $\frac{1}{2}$

اگر α و β ریشه‌های معادله $mx^2 - x + m = 3$ باشند و داشته باشیم: $\alpha < 1 < \beta < 2$ ، محدوده m کدام است؟

- (۱) $0 < m < 1$
(۲) $1 < m < 2$
(۳) $-1 < m < 0$
(۴) $-2 < m < -1$


خط $y = a$ نمودار تابع f با ضابطه $f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x & ; x \geq 0 \\ x - 1 & ; x < 0 \end{cases}$ را فقط در یک نقطه قطع می‌کند. حدود a کدام است؟

- (۱) $[-1, 0)$
(۲) $(-\infty, -1]$
(۳) $(-\infty, -1) \cup [0, +\infty)$
(۴) $(-\infty, -1] \cup (0, +\infty)$

اگر منحنی به معادله $y = (a - 1)x^2 + x + 3$ نسبت به خط $x = 2$ متقارن باشد، این منحنی محور xها را با کدام طول مثبت قطع می‌کند؟


- (۱) ۲
(۲) ۳
(۳) ۴
(۴) ۶

شکل زیر، نمودار تابع درجه دوم $f(x) = ax^2 + bx - 1$ است. کدام دوتایی برای (a, b) قابل قبول است؟



- (۱) $(1, -2)$
(۲) $(-2, -1)$
(۳) $(-1, 4)$
(۴) $(-1, 2)$

۱۶ نمودار سهمی $f(x) = ax^2 + bx + c$ به صورت زیر است. $f(4)$ کدام است؟



(۱) ۱

(۲) $\frac{3}{2}$

(۳) $\frac{1}{4}$

(۴) $\frac{3}{4}$

۱۷ اگر نمودار سهمی $f(x) = ax^2 + 4x + a - 3$ ، محور x ها را در دو نقطه متمایز با طول مثبت قطع کند، رأس سهمی به ازای کدام مقادیر a ، زیر محور x ها قرار دارد؟

(۱) $(-1, 0)$

(۲) \emptyset

(۳) $(-\infty, 0)$

(۴) $(-\frac{1}{4}, 0)$

۱۸ به ازای چه مقادیری از a ، سهمی به معادله $y = (a-1)x^2 + (2a-1)x + a$ فقط از ناحیه اول محورهای مختصات عبور نمی‌کند؟

(۱) $[0, +\infty)$

(۲) $(-\infty, 0]$

(۳) $(-\infty, 1)$

(۴) \emptyset

۱۹ نقطه $(3, 4)$ رأس یک سهمی درجه دوم است که نمودار آن، پاره‌خطی به طول ۸ روی محور x ها جدا می‌کند. نمودار این منحنی محور y ها را با کدام عرض قطع می‌کند؟

(۱) $\frac{4}{3}$

(۲) $\frac{4}{3}$

(۳) $\frac{4}{3}$

(۴) $\frac{5}{3}$

۲۰ اگر هر دو سهمی $f(x) = x^2 - 2x + 4$ و $g(x) = ax^2 + bx + \frac{1}{3}$ در نقطه رأس مشترک باشند، آنگاه صفرهای سهمی $g(x)$ کدام است؟

(۱) 2 و -4

(۲) 4 و -2

(۳) 3 و -1

(۴) 5 و -3

۲۱ به ازای کدام مقدار a کمترین مقدار تابع $y = x^2 + ax + a^2 - 12$ روی محور x ها است؟

(۱) 4


(۲) -4

(۳) ± 4

(۴) $\pm 2\sqrt{3}$

۲۲

نمودار تابع $f(x) = mx^2 + 8x - 2$ به شکل زیر است. m چند مقدار صحیح می‌تواند داشته باشد؟



(۱) ۷

(۲) ۸

(۳) ۹

(۴) ۱۰

۲۳

دیوار یک ورزشگاه بیش از صد متر طول دارد. اگر بخواهیم با ۸۰ متر تور سیمی، روبه‌روی دیوار ورزشگاه، محوطه‌ای مستطیلی‌شکل با بیشترین مساحت ممکن جهت محیطی برای انتظار تماشاگران تا باز شدن درب ورزشگاه ایجاد کنیم، مساحت قسمت ایجادشده چند مترمربع است؟

(۱) ۸۰۰

(۲) ۸۰۰۰

(۳) ۱۶۰۰

(۴) ۶۴۰۰


۲۴

اگر $x = 1$ بین مقادیر دو ریشه معادله $x^2 + kx + 2k = 0$ قرار داشته باشد، محدوده k کدام گزینه زیر است؟

(۱) $(-\frac{1}{3}, +\infty)$ (۲) $(\frac{1}{3}, +\infty)$ (۳) $(-\infty, \frac{1}{3})$ (۴) $(-\infty, -\frac{1}{3})$

۲۵

شکل زیر، نمودار یک سهمی است که محورهای مختصات را در نقاط A ، B و C قطع می‌کند. اگر مساحت مثلث ABC برابر با ۶ باشد، کمترین مقدار سهمی کدام است؟

(۱) $-\frac{1}{2}$ (۲) $-\frac{3}{2}$ (۳) -2 (۴) -1 

۲۶

به ازای چه حدودی از a نمودار تابع درجه دوم $y = ax^2 - (a - 4)x + \frac{9}{4}$ فقط از ناحیه چهارم محورهای مختصات نمی‌گذرد؟

(۱) $-1 < a < 0$ (۲) $-2 < a < -1$ (۳) $1 < a < 2$ (۴) $0 < a < 1$

۲۷

به ازای چه مقادیری از m ، سهمی $y = mx^2 - 2mx + 1$ از نواحی اول و دوم صفحه مختصات نمی‌گذرد؟


(۱) $m < 0$ (۲) $-1 < m < 0$ (۳) $0 < m < 1$ (۴) $\{\}$

۲۸

به ازای چه مقادیری از a ، نمودار تابع $f(x) = (a^2 - 4)x^2 + (a^2 - 9)x + 1$ از هر ۴ ناحیه دستگاه مختصات عبور می‌کند؟

(۱) $(-3, 3)$ (۲) $(-2, 2)$ (۳) $\mathbb{R} - (-2, 2)$ (۴) $\mathbb{R} - [-3, 3]$

شکل زیر مربوط به تابع درجه دوم $y = f(x)$ است. حاصل $\alpha^3 + \beta^3$ کدام است؟



(۱) ۶۰

(۲) ۷۰


(۳) ۸۰

(۴) ۹۰

حدود m چقدر باشد تا نمودار تابع $y = (2m + 1)x^2 + (3m + 4)x + m + 4$ حداقل از ۳ ناحیه مختصاتی بگذرد؟

(۲) $0 < m < 12$ (۱) $m \leq 0$ یا $m \geq 12$ (۴) $0 \leq m \leq 12$ (۳) $m < 0$ یا $m > 12$

نمودار $y = -2x^2 + ax + b$ به صورت زیر است. اندازه قطعه‌ای که نمودار روی محور x ها ایجاد می‌کند (طول پاره‌خط AB)، کدام است؟




(۱) ۴

(۲) $2\sqrt{2}$ (۳) $\frac{1}{2}$

(۴) ۳

حدود a کدام باشد تا نمودار تابع $f(x) = ax^2 + (3 - a)x + b$ به صورت زیر باشد؟

(۱) $a > 1$ (۲) $a < 3$ (۳) $0 < a < 3$ (۴) $1 < a < 3$

نمودار یک سهمی از نقاط $(1, -2)$ و $(2, -3)$ می‌گذرد و محور y ها را در نقطه‌ای به عرض ۱ قطع می‌کند. کدامیک از نقاط زیر روی این سهمی قرار دارد؟

(۲) $(-2, 10)$ (۱) $(-1, 6)$ (۴) $(4, -1)$ (۳) $(3, 2)$

۳۴

استادیومی به شکل مستطیل با دو نیم‌دایره در دو انتهای آن در حال ساخت است. اگر محیط استادیوم ۱۵۰۰ متر باشد، طول مستطیل چقدر باشد تا مساحت مستطیل حداکثر مقدار ممکن شود؟



(۱) ۷۵۰

(۲) ۳۷۵

(۳) $\frac{۷۵۰}{\pi}$

(۴) $\frac{۳۷۵}{\pi}$

۳۵

به ازای کدام مجموعه مقادیر a ، کمترین مقدار تابع $f(x) = ax^2 + 2(x + a) - 1$ در ربع سوم قرار دارد؟

(۱) $-1 < a < \frac{1}{2}$

(۲) $-\frac{1}{2} < a < 1$

(۳) $0 < a < 1$

(۴) $a > 0$

۳۶

به ازای کدام مقادیر a ، سهمی به معادله $y = ax^2 - (a + 2)x$ از ناحیه دوم محورهای مختصات نمی‌گذرد؟

(۱) $a \leq -2$


(۲) $a > -2$

(۳) $a > 0$

(۴) $-2 \leq a < 0$

۳۷

نمودار تابع $f(x) = ax^2 + bx$ به صورت زیر است. حاصل $f(5)$ کدام است؟



(۱) -۲

(۲) -۳

(۳) -۴

(۴) -۵

۳۸

اگر سهمی‌هایی به صورت $y = x^2 + ax + b$ بر خط $y = -4$ مماس باشند، آنگاه قدر مطلق تفاضل صفرهای این سهمی از هم کدام است؟

(۱) ۲

(۲) ۳

(۳) ۴

(۴) ریشه ندارد.

۳۹


کدام ضابطه می‌تواند مربوط به سهمی شکل زیر باشد؟

(۱) $y = -x^2 + 2x + 4$


(۲) $y = -x^2 - 2x - 4$

(۳) $y = -x^2 + 4x - 2$

(۴) $y = -x^2 - 4x - 2$



پنجره‌ای به شکل زیر است. اگر محیط پنجره ۱۶ متر باشد، مقدار x چقدر باشد تا پنجره حداکثر نوردهی را داشته باشد؟



(۱) $\frac{12}{11}$

(۲) ۱

(۳) $\frac{24}{11}$

(۴) ۲

$$y = 4\alpha - 6 \Rightarrow 4\alpha - 6 = 0 \Rightarrow \alpha = \frac{3}{2}$$

پس یکی از ریشه‌ها $\frac{3}{2}$ است. $x = 1$ محور تقارن سهمی است، بنابراین:

$$\frac{\alpha + \beta}{2} = 1 \Rightarrow \beta = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow y = a \left(x - \frac{1}{2} \right) \left(x - \frac{3}{2} \right)$$

با قرار دادن مختصات رأس سهمی در معادله آن $a = 8$ به دست می‌آید؛ بنابراین:

$$\Rightarrow y = 8x^2 - 16x + 6 \Rightarrow \text{عرض نقطه برخورد} = 6$$

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره ۴ تابستان ۱۳۹۸

نکته: برای آنکه نمودار سهمی $y = f(x)$ بر محور x مماس باشد، باید معادله $f(x) = 0$ ریشه مضاعف داشته باشد. باتوجه به نکته بالا، باید معادله $f(x) = 0$ ریشه مضاعف داشته باشد، یعنی باید ریشه هر دو پرانتز یکسان باشد.


$$\begin{cases} mx - 4 = 0 \Rightarrow x = \frac{4}{m} \\ 4 + 2x = 0 \Rightarrow x = -2 \end{cases} \Rightarrow \frac{4}{m} = -2 \Rightarrow m = -2$$

گزینه دو علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره ۳ تابستان ۱۳۹۸

گزینه دو ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره ۳ تابستان ۱۳۹۸

باتوجه به مفروضات مسئله $y = \frac{-5}{2}$ عرض نقطهٔ مینیمم منحنی است. به شکل زیر توجه کنید.

$$-\frac{5}{2} = -\frac{\Delta}{4a'} \Rightarrow \frac{5}{2} = \frac{9-2a}{2} \Rightarrow a = 2$$



قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره ۲ ۱۳۹۸

به دلیل آنکه سهمی محور x ها را در نقاطی به طول -1 و 4 قطع می‌کند، معادلهٔ کلی سهمی به این فرم است:

$$y = a(x+1)(x-4)$$

همچنین مختصات رأس سهمی $S(\frac{3}{2}, 2)$ است.

$$f\left(\frac{3}{2}\right) = 2 \Rightarrow 2 = a \underbrace{\left(\frac{3}{2} + 1\right)\left(\frac{3}{2} - 4\right)}_{-\frac{25}{4}} \Rightarrow a = \frac{-8}{25}$$

$$\Rightarrow y = \frac{-8}{25}(x+1)(x-4)$$

$$\text{محله تلاقی نمودار با محور عرض ها } f(0) = \frac{-8}{25}(1)(-4) = \frac{32}{25}$$

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره ۲ تابستان ۱۳۹۸

$$f(0) = 3 \Rightarrow c = 3 \Rightarrow f(x) = ax^2 + bx + 3$$

یکی از ریشه‌ها $x = 3$ است، پس $f(3) = 0$ است:

$$9a + 3b + 3 = 0 \xrightarrow{\div 3} 3a + b + 1 = 0$$

عرض رأس سهمی هم $\frac{25}{8}$ است:

$$\frac{-\Delta}{4a} = \frac{25}{8} \Rightarrow -\frac{b^2 - 4a(3)}{4a} = \frac{25}{8} \Rightarrow -b^2 + 12a = \frac{25}{2}a$$

$$\xrightarrow{\times 2} -2b^2 + 24a = 25a \Rightarrow a = -2b^2$$

به جای a در معادله $3a + b + 1 = 0$ مقدار $-2b^2$ را قرار می‌دهیم.

$$3(-2b^2) + b + 1 = 0 \Rightarrow -6b^2 + b + 1 = 0 \Rightarrow 6b^2 - b - 1 = 0$$

$$b = \frac{1 \pm \sqrt{1 + 24}}{2(6)} = \frac{1 \pm 5}{12} = \begin{cases} \frac{6}{12} = \frac{1}{2} \\ -\frac{4}{12} = -\frac{1}{3} \end{cases}$$

چون $a < 0$ و طول رأس سهمی $(-\frac{b}{2a})$ هم مثبت است، پس باید $b > 0$ باشد و $b = -\frac{1}{3}$ قابل قبول نیست.

$$b = \frac{1}{2} \Rightarrow a = -2b^2 = -2\left(\frac{1}{2}\right)^2 = -\frac{1}{2}$$

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره ۱ ۱۳۹۷

ضابطه تابع را به صورت $f(x) = ax^2 + bx + c$ در نظر می‌گیریم:

$$f(0) = -2 \Rightarrow c = -2$$

باتوجه به اینکه $f(-2) = f(0) = -2$ است، طول رأس سهمی میانگین صفر و -2 یعنی -1 است.

$$\Rightarrow x_s = \frac{-b}{2a} = -1 \Rightarrow b = 2a \quad (1)$$

$$f(-1) = a - b - 2 = -4 \Rightarrow a - b = -2 \quad (2)$$

$$\xrightarrow{(1),(2)} a = 2, b = 4 \Rightarrow f(x) = 2x^2 + 4x - 2$$

اگر جواب‌های معادله $f(x) = 0$ را α و β در نظر بگیریم، داریم:

$$S = \alpha + \beta = -\frac{b}{a} = -2, P = \alpha\beta = \frac{c}{a} = -1$$

$$\Rightarrow \alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = S^2 - 2P = (-2)^2 - 2(-1) = 6$$

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره ۱۸ ۱۳۹۸

باتوجه به شکل سؤال، می‌توان نوشت:

$$(-1, 1) \in f \Rightarrow f(-1) = 1 \Rightarrow a(-1)^2 + b(-1) + c = 1$$

$$\Rightarrow a - b + c = 1 \xrightarrow{a-b=-3} c = 4$$

$$\frac{-b}{2a} = 1 \Rightarrow b + 2a = 0 \xrightarrow{a-b=-3} a = -1 \Rightarrow b = 2$$

$$\Rightarrow f(x) = -x^2 + 2x + 4$$

$$\Rightarrow f(1) = -1 + 2 + 4 = 5$$

قلمچی ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره ۱۲ ۱۳۹۴

چون تابع درجه دوم نسبت به محور تقارن که همان طول رأس است، متقارن است؛ پس صفرهای تابع $x = 2, 4$ است. ضابطه تابع درجه دوم $y = a(x - 2)(x - 4)$ است و از نقطه $(0, -4)$ می‌گذرد.

$$-4 = a(0 - 2)(0 - 4) \Rightarrow a = -\frac{1}{2} \Rightarrow y = -\frac{1}{2}x^2 + 3x - 4$$

$$\text{ماکزیمم تابع} = -\frac{\Delta}{4a} = -\frac{9 - 4(-\frac{1}{2})(-4)}{4(-\frac{1}{2})} = \frac{1}{2}$$

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره ۱ ۱۳۹۸

باتوجه به اینکه $a > 0$ است، بنابراین دهانه سهمی باید روبه بالا باشد؛ لذا گزینه "۳" رد می‌شود. از طرفی باتوجه به اینکه $c > 0$ ، پس نقطه برخورد سهمی با محور y ‌ها بالاتر از مبدأ مختصات قرار دارد؛ بنابراین گزینه "۴" نیز رد می‌شود.

حال بنا بر فرض مسئله نتیجه می‌گیریم $\frac{-b}{a} < 0$ است. لذا حاصل جمع ریشه‌ها (در صورت وجود) باید مقداری منفی باشد، پس گزینه "۱" نیز رد می‌شود و نمودار گزینه "۲" می‌تواند نمودار سهمی موردنظر باشد.

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره ۳ ۱۳۹۷

$$y(3) = 0 \Rightarrow 0 = 3(3)^2 + a(3) + 18 \Rightarrow 3a = -45 \Rightarrow a = -15$$

$$\Rightarrow y = 3x^2 - 15x + 18 = 3(x-2)(x-3) \xrightarrow{y=0} \begin{cases} x=2 \\ x=3 \end{cases}$$

$$y = 3x^2 - 15x + 18 \Rightarrow y_{\text{رأس}} = -\frac{\Delta}{4a} = -\frac{9}{4 \times 3} = -\frac{3}{4}$$

$$S_{\text{مثلث}} = \frac{1}{2} \times \text{ارتفاع} \times \text{قاعده} = \frac{1}{2} \times \frac{3}{4} \times 1 = \frac{3}{8}$$

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره ۳ ۱۳۹۸

رأس هر سهمی به معادله $y = ax^2 + bx + c$, $(a \neq 0)$ نقطه $S(\frac{-b}{2a}, \frac{-\Delta}{4a})$ است.

رأس این سهمی روی نیمساز ناحیه اول و سوم مختصات، یعنی خط $y = x$ واقع است، پس داریم:

$$y = x^2 + mx - \frac{1}{4}, \quad y_S = x_S \Rightarrow \frac{-b}{2a} = \frac{-\Delta}{4a}$$

$$\Rightarrow \frac{-m}{2} = \frac{-(m^2 + 1)}{4} \Rightarrow 2m = m^2 + 1 \Rightarrow (m-1)^2 = 0 \Rightarrow m = 1$$

$$\Rightarrow \text{معادله سهمی: } y = x^2 + x - \frac{1}{4}$$

می‌دانیم اگر x_1 و x_2 جواب‌های معادله درجه دوم $ax^2 + bx + c = 0$ باشند، آنگاه: $|x_1 - x_2| = \frac{\sqrt{\Delta}}{|a|}$

طول پاره‌خط AB برابر با قدر مطلق تفاضل جواب‌های معادله درجه دوم $x^2 + x - \frac{1}{4} = 0$ است، پس:

$$AB = |x_1 - x_2| = \frac{\sqrt{\Delta}}{|a|} = \frac{\sqrt{2}}{1} = \sqrt{2}$$

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره ۲ ۱۳۹۸

باتوجه به صورت سؤال مشخص است که α و β ریشه‌های معادله $p(x) = mx^2 - x + (m-3) = 0$ هستند. باتوجه به آنکه $x=1$ بین دو ریشه و $x=2$ خارج دو ریشه قرار دارد، پس علامت $P(1)$ و $P(2)$ متفاوت است:

$$\begin{cases} p(1) = m - 1 + (m - 3) = 2m - 4 = 2(m - 2) \\ p(2) = 4m - 2 + (m - 3) = 5m - 5 = 5(m - 1) \end{cases}$$

$$\xrightarrow{p(1)p(2) < 0} 10(m-1)(m-2) < 0 \xrightarrow{\text{بین دو ریشه}} 1 < m < 2$$


قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره ۸ ۱۳۹۸

نمودار تابع f را رسم می‌کنیم؛ بنابراین:

$$f(x) = x(x - 2) : x \geq 0, \quad x_s = \frac{-b}{2a} = \frac{2}{2} = 1$$

x	\bullet	1
$y = x^2 - 2x$	\bullet	-1

x	-1	\bullet
$y = x - 1$	-2	-1



طبق شکل واضح است که $a \leq -1$ یا $a > 0$ باشد.

معادله محور تقارن سهمی $y = a'x^2 + b'x + c'$ از رابطه $x = -\frac{b'}{2a'}$ به دست می‌آید.

$$x = -\frac{1}{2(a-1)} = 2 \Rightarrow a-1 = -\frac{1}{4}$$

$$y = -\frac{1}{4}x^2 + x + 3$$

در تلاقی با محور xها، $y = 0$ است، پس:

$$y = 0 \Rightarrow -\frac{1}{4}x^2 + x + 3 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - 4x - 12 = 0 \Rightarrow (x-6)(x+2) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 6 \\ x = -2 \end{cases}$$

پس سهمی در نقطه به طول مثبت ۶ محور xها را قطع می‌کند.

قلمچی علوم تجربی دهم آزمون شماره ۱۳۹۶۷

قلمچی ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره ۱۳۹۶۷

تابع ماکزیمم‌دار است؛ بنابراین $a < 0$ ، ازطرفی:

$$x = -\frac{b}{2a} > 0 \xrightarrow{a < 0} b > 0$$


پس یکی از گزینه‌های ۳ یا ۴ می‌تواند درست باشد، ازطرفی، در معادله آن $\Delta = 0$ است، پس:

$$\Delta = b^2 + 4a = 0 \Rightarrow b^2 = -4a$$

با کنترل گزینه‌ها، گزینه (۴) درست است.

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره ۵ تابستان ۱۳۹۸

ابتدا ضابطه سهمی را به دست می‌آوریم:



$$\begin{cases} f(0) = -3 \Rightarrow c = -3 \\ f(2) = 0 \Rightarrow 4a + 2b - 3 = 0 \\ f(6) = 0 \Rightarrow 36a + 6b - 3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -\frac{1}{4} \\ b = 2 \\ c = -3 \end{cases}$$

$$\Rightarrow f(x) = -\frac{1}{4}x^2 + 2x - 3 \Rightarrow f(4) = -\frac{1}{4} \times 16 + 2(4) - 3 = 1$$

گزینه دو ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره ۴ تابستان ۱۳۹۸

اولاً نمودار سهمی، محور xها را در دو نقطه متمایز با طول مثبت قطع کرده است، پس باید داشته باشیم:

$$۱) \Delta > 0 \Rightarrow ۱۶ - ۴a(a - ۳) > 0$$

$$\xrightarrow{+(-۴)} \underbrace{a^2 - ۳a - ۴}_{(a-۴)(a+۱)} < 0 \Rightarrow -۱ < a < ۴$$


$$۲) P > 0 \Rightarrow \frac{a - ۳}{a} > 0 \Rightarrow a < 0 \text{ یا } a > ۳$$

$$۳) S > 0 \Rightarrow \frac{-۴}{a} > 0 \Rightarrow a < 0$$

اشتراک ۳ شرط فوق برابر $-۱ < a < 0$ می‌شود. ثانیاً باید رأس سهمی زیر محور xها باشد؛ یعنی $y_s < 0$ داریم:

$$y_s < 0 \Rightarrow \frac{-\Delta}{۴a} < 0 \xrightarrow{\Delta > 0} a > 0 \xrightarrow{\text{اشتراک با شرط } -۱ < a < 0} a \in \emptyset$$

نمودار سهمی مورد نظر باید به یکی از دو صورت زیر باشد:



پس اولاً ضریب x^2 باید منفی باشد:

$$a - 1 < 0 \Rightarrow a < 1 \quad (1)$$

طول محل برخورد نمودار با محور x ها را به دست می آوریم:

$$y = (a - 1)x^2 + (2a - 1)x + a = 0$$

$$\Delta = (2a - 1)^2 - 4(a - 1)a = 1$$

$$x = \frac{-(2a - 1) \pm 1}{2(a - 1)} \Rightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = \frac{a}{1 - a} \end{cases}$$

طبق نمودار سهمی، باید $\frac{a}{1 - a}$ نامثبت باشد، پس:

$$\frac{a}{1 - a} \leq 0 \Rightarrow a \leq 0 \text{ یا } a > 1 \quad (2)$$

$$\xrightarrow{(1) \cap (2)} a \leq 0$$

قلمچی علوم تجربی دهم آزمون شماره ۹ ۱۳۹۸

طول پاره‌خطی که روی محور x ها جدا شده است، ۸ واحد است. چون رأس سهمی وسط پاره‌خط است، پس یک نقطه روی محور x ها ۴ واحد جلوتر از ۳ و یک نقطه ۴ واحد عقبتر از ۳ است.

$$\begin{cases} x_1 = 3 - 4 = -1 \\ x_2 = 3 + 4 = 7 \end{cases}$$

$$\xrightarrow{\text{معادله سهمی}} y = a(x + 1)(x - 7) \xrightarrow{\text{نقطه } (3, 4) \text{ در منحنی صدق می‌کند}} a(3 + 1)(3 - 7) = 4 \Rightarrow -16a = 4 \Rightarrow a = -\frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow y = -\frac{1}{4}(x + 1)(x - 7) \xrightarrow{\text{عرض از مبدأ}} -\frac{1}{4}(0 + 1)(0 - 7) = \frac{7}{4}$$

قلمچی ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره ۸ ۱۳۹۷

برای سهمی $f(x) = a'x^2 + b'x + c'$ ، مختصات رأس را محاسبه می‌کنیم:

$$S \left| \begin{array}{l} -\frac{b'}{2a'} = -\frac{-2}{2} = 1 \\ f\left(-\frac{b'}{2a'}\right) = f(1) = 1^2 - 2 + 4 = 3 \end{array} \right.$$

نقطه $S(1, 3)$ رأس سهمی $g(x)$ نیز می‌باشد.

$$g(x) = ax^2 + bx + \frac{\lambda}{3} \Rightarrow S \left| \begin{array}{l} -\frac{b}{2a} = 1 \Rightarrow b = -2a \\ g(1) = 3 \end{array} \right.$$

$$\xrightarrow{b=-2a} g(x) = ax^2 - 2ax + \frac{\lambda}{3}$$

$$\xrightarrow[\text{در معادله آن صدق می‌کند}]{\text{مختصات رأس سهمی}} 3 = a \times 1^2 - 2a \times 1 + \frac{\lambda}{3}$$

$$\Rightarrow -a = \frac{1}{3} \Rightarrow a = -\frac{1}{3} \xrightarrow{b=-2a} b = \frac{2}{3}$$

$$\Rightarrow g(x) = -\frac{1}{3}x^2 + \frac{2}{3}x + \frac{\lambda}{3}$$

$$\xrightarrow[g(x)=0]{\text{صفرهای سهمی } g(x)} -\frac{1}{3}x^2 + \frac{2}{3}x + \frac{\lambda}{3} = 0$$

$$\xrightarrow{\times(-3)} x^2 - 2x - \lambda = 0 \Rightarrow (x - 4)(x + 2) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x - 4 = 0 \Rightarrow x = 4 \\ x + 2 = 0 \Rightarrow x = -2 \end{cases}$$

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره ۳ تابستان ۱۳۹۸

از اتحاد مربع کامل استفاده می‌کنیم:

$$y = x^2 + ax + a^2 - 12, \Rightarrow y = \left(x + \frac{a}{2}\right)^2 - \frac{a^2}{4} + a^2 - 12$$

می‌دانیم y وقتی کمترین مقدار است که جمله مربع کامل برابر صفر باشد پس کمترین مقدار y به صورت $\frac{3a^2}{4} - 12$ است. اگر کمترین مقدار روی محور x ها باشد الزاماً $0 = \frac{3a^2}{4} - 12$ یا $a^2 = 16$ یا $a = \pm 4$ است.

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله دوم ۱۳۹۳


باتوجه به نمودار تابع می‌توان گفت تابع ماکزیمم دارد ($m < 0$) و معادله $mx^2 + 8x - 2 = 0$ دارای دو جواب مثبت است، پس داریم:

$$\begin{cases} \Delta > 0 \Rightarrow 64 + 8m > 0 \Rightarrow m > -8 \\ \frac{c}{a} > 0 \Rightarrow -\frac{2}{m} > 0 \Rightarrow m < 0 \\ m < 0 \end{cases} \Rightarrow -8 < m < 0$$

بنابراین m می‌تواند مقادیر صحیح $-7, -6, \dots, -1$ را داشته باشد.

قلمچی ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره ۸ ۱۳۹۴

درواقع محیط ایجادشده برابر خواهد بود با:



$x.y$ ماکزیمم شود، $2x + y = 80$

$$y = 80 - 2x \Rightarrow x.y = x(80 - 2x) = 80x - 2x^2$$

$$\Rightarrow z = -2x^2 + 80x$$

از آنجاکه مقدار ماکزیمم در رأس سهمی رخ می‌دهد، خواهیم داشت:

$$x_{\max} = \frac{-80}{2(-2)} = 20$$

$$\Rightarrow x = 20, y = 80 - 40 = 40$$

$$\text{ماکزیمم مساحت} = x.y = 20 \times 40 = 800$$

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره ۴ ۱۳۹۸

معادله باید دو جواب داشته باشد، یعنی $\Delta > 0$ باشد:

$$\Delta = k^2 - 8k > 0 \Rightarrow k < 0 \text{ یا } k > 8 \quad (1)$$

حال برای اینکه $x = 1$ ، بین دو ریشه قرار بگیرد، علامت عبارت موردنظر به ازای $x = 1$ ، مخالف علامت ضریب x^2 باشد؛ یعنی:

$$(1)^2 + k(1) + 2k < 0 \Rightarrow 3k + 1 < 0 \Rightarrow k < -\frac{1}{3} \quad (2)$$

$$\xrightarrow{(1) \cap (2)} k \in \left(-\infty, -\frac{1}{3}\right)$$

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره ۶ ۱۳۹۸

مساحت مثلث برابر است با:

$$\frac{y_A \times 4}{2} = 6 \Rightarrow y_A = 3$$

چون عرض از مبدأ سهمی برابر با ۳ می‌شود، پس $y = ax^2 + bx + 3$ معادله منحنی خواهد بود.


$$2 \times 6 = \frac{c}{a} \Rightarrow 12 = \frac{3}{a} \Rightarrow a = \frac{1}{4}$$

$$2 + 6 = \frac{-b}{a} = 8 \Rightarrow -\frac{b}{\frac{1}{4}} = 8 \Rightarrow b = -2$$

$$f(x) = y = \frac{1}{4}x^2 - 2x + 3 \Rightarrow y_{\min} = -\frac{\Delta}{4a} = -\frac{4 - 4\left(\frac{1}{4}\right)(3)}{4\left(\frac{1}{4}\right)} = -1$$

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره ۲ تابستان ۱۳۹۸

باتوجه به شکل زیر، برای اینکه نمودار فقط از ناحیه چهارم نگذرد باید حالت زیر رخ دهد، باتوجه به این حالت:



تابع محور عرض‌ها را بالای مبدأ قطع می‌کند، پس باید: $f(0) = \frac{9}{4}$
تابع باید مینیمم داشته باشد، پس: $a > 0$ (I)


$$S = x_1 + x_2 = \frac{-b}{a} < 0 \xrightarrow{a > 0} a - 4 < 0 \Rightarrow a < 4 \quad (\text{II})$$

$$P = x_1 x_2 = \frac{c}{a} > 0 \xrightarrow{a > 0} c > 0 \Rightarrow \frac{9}{4} > 0 \quad \text{همواره برقرار است}$$

$$\Delta = b^2 - 4ac > 0 \Rightarrow \Delta = (a - 4)^2 - 9a = a^2 - 17a + 16 > 0$$

$$(a - 1)(a - 16) > 0 \Rightarrow a < 1 \quad \text{یا} \quad a > 16 \quad (\text{III})$$

$$\frac{(I) \cap (II) \cap (III)}{\rightarrow} 0 < a < 1$$



قلمچی علوم تجربی چهارم آزمون شماره ۳ ۱۳۹۴


$$\Rightarrow \begin{cases} \Delta = b^2 - 4ac \leq 0 \Rightarrow 4m^2 - 4m \leq 0 \Rightarrow 4m(m - 1) \leq 0 \Rightarrow 0 \leq m \leq 1 & (1) \\ a < 0 \Rightarrow m < 0 & (2) \end{cases}$$

$$(1) \cap (2) = \emptyset = \{\}$$

یعنی به ازای هیچ مقداری برای m ، شرط گفته شده برقرار نیست.

قلمچی ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره ۱۱ ۱۳۹۸

برای اینکه نمودار $f(x)$ از هر ۴ ناحیه عبور کند، باید معادله $f(x) = 0$ دارای ۲ ریشهٔ مختلف‌العلامت باشد. (به شکل دقت کنید) بنابراین باید حاصل ضرب ریشه‌ها منفی باشد:



$$\frac{c}{a} < 0 \Rightarrow \frac{1}{a^2 - 4} < 0 \Rightarrow a^2 - 4 < 0 \Rightarrow a^2 < 4 \\ \Rightarrow -2 < a < 2 \Rightarrow a \in (-2, 2)$$

دقت کنید اگر $\frac{c}{a} < 0$ ، آنگاه $ac < 0$ ، پس $-4ac > 0$ در نتیجه $\Delta = b^2 - 4ac > 0$ و دیگر نیازی به بررسی شرط $\Delta > 0$ نیست.

گزینه دو علوم تجربی چهارم آزمون شماره ۳ ۱۳۹۶

معادلهٔ سهمی با رأس (x_s, y_s) به صورت $f(x) = a(x - x_s)^2 + y_s$ است. چون رأس سهمی نقطهٔ $(2, 4)$ است، پس معادلهٔ آن به صورت $f(x) = a(x - 2)^2 + 4$ است. نقطهٔ $(0, 1)$ روی نمودار این سهمی قرار دارد، پس:

$$f(0) = 1 \Rightarrow 4a + 4 = 1 \Rightarrow a = -\frac{3}{4}$$

بنابراین معادلهٔ سهمی به صورت زیر است:

$$f(x) = -\frac{3}{4}(x - 2)^2 + 4 \Rightarrow f(x) = -\frac{3}{4}x^2 + 3x + 1$$

α و β ریشه‌های معادلهٔ $-\frac{3}{4}x^2 + 3x + 1 = 0$ هستند. مقدار S و P را حساب می‌کنیم:


$$\begin{cases} S = -\frac{b}{a} = \frac{-3}{-\frac{3}{4}} = 4 \\ P = \frac{c}{a} = \frac{1}{-\frac{3}{4}} = -\frac{4}{3} \end{cases}$$

پس:

$$\alpha^3 + \beta^3 = S^3 - 3PS = 4^3 - 3\left(-\frac{4}{3}\right)(4) = 64 + 16 = 80$$

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره ۱۲ ۱۳۹۸

اگر نمودار سهمی بخواهد حداقل از ۳ ناحیه مختصاتی بگذرد، تنها چهار موقعیت زیر را نسبت به محور x ها نمی‌تواند داشته باشد:



برای اینکه این چهار حالت رخ ندهد، کافی است شرط $\Delta > 0$ را اعمال کنیم:

$$\Delta > 0 \Rightarrow 9m^2 + 24m + 16 - 4(2m + 1)(m + 4) > 0$$

$$\Rightarrow m^2 - 12m > 0 \Rightarrow m(m - 12) > 0 \Rightarrow m > 12 \text{ یا } m < 0$$

توجه کنید که به ازای $m = -\frac{1}{p}$ ، تابع خطی خواهد شد و از سه ناحیه محوره‌های مختصات عبور خواهد کرد.

می‌دانیم مختصات رأس یک سهمی به صورت $S(-\frac{b}{2a}, \frac{-\Delta}{4a})$ است، پس:

$$\Rightarrow \lambda = \frac{-\Delta}{4a} \xrightarrow{a=-2} \lambda = \frac{-\Delta}{-8} \Rightarrow \Delta = 64$$

$$\text{ازطرفی } |AB| = |x_1 - x_2| = \frac{\sqrt{\Delta}}{|a|} \text{ یعنی؛}$$

$$\Rightarrow |AB| = \frac{\sqrt{64}}{2} = \frac{8}{2} = 4$$

باید $a > 0$ باشد، چون دهانه سهمی روبه بالا است. به علاوه عرض از مبدأ سهمی $b = 1$ است؛ پس داریم:

$$f(x) = ax^2 + (3 - a)x + 1$$

به علاوه طول رأس سهمی منفی است:

$$\frac{-(3-a)}{2a} < 0 \Rightarrow \frac{3-a}{2a} > 0 \xrightarrow{a>0} 3-a > 0 \Rightarrow a < 3$$

شرط آخر هم این است که $\Delta < 0$ باشد:

$$\Delta = (3-a)^2 - 4(a)(1) = 9 + a^2 - 6a - 4a = a^2 - 10a + 9$$

$$= (a-9)(a-1) < 0 \Rightarrow 1 < a < 9$$

از اشتراک شرط‌های به دست آمده $1 < a < 3$ می‌شود.

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره ۲ ۱۳۹۸

فرض کنیم معادله سهمی به صورت $f(x) = ax^2 + bx + c$ باشد. طبق فرض، سهمی از نقاط $(0, 1)$ ، $(1, -2)$ ، $(2, -3)$ و $(0, 1)$ می‌گذرد، پس این نقاط در معادله سهمی صدق می‌کنند.


$$\begin{cases} (0, 1) \Rightarrow f(0) = 1 \Rightarrow a \times (0)^2 + b \times (0) + c = 1 \Rightarrow c = 1 \\ (1, -2) \Rightarrow f(1) = -2 \Rightarrow a \times (1)^2 + b(1) + c = -2 \Rightarrow a + b = -3 \quad (1) \\ (2, -3) \Rightarrow f(2) = -3 \Rightarrow f(2) = a(2)^2 + b(2) + c = -3 \Rightarrow 4a + 2b = -4 \quad (2) \end{cases}$$

با حل دستگاه شامل معادلات (۱) و (۲) داریم:

$$\begin{cases} a + b = -3 \\ 4a + 2b = -4 \end{cases} \Rightarrow a = 1, b = -4 \Rightarrow y = x^2 - 4x + 1$$

بنابراین ضابطه این سهمی به صورت $f(x) = x^2 - 4x + 1$ است. در بین گزینه‌ها، تنها نقطه گزینه ۱ روی این سهمی قرار دارد.

گزینه دو ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره ۷ ۱۳۹۷



اگر طول مستطیل را x و شعاع نیم‌دایره را r بنامیم، محیط استادیوم برابر با $2x + 2\left(\frac{1}{2} \times 2\pi r\right)$ خواهد بود که طبق فرض برابر با ۱۵۰۰ است؛ پس:

$$2x + 2\pi r = 1500 \Rightarrow x + \pi r = 750 \Rightarrow x = 750 - \pi r \quad (*)$$

طول مستطیل برابر با x و عرض آن برابر با $2r$ است، پس مساحت آن عبارت است از:

$$S = x(2r) = 2xr \xrightarrow{(*)} S = 2(750 - \pi r)r = -2\pi r^2 + 1500r$$

تابع $S(r) = -2\pi r^2 + 1500r$ که مساحت مستطیل است، یک سهمی روبه‌پایین است. ماکزیمم این سهمی در رأس آن حاصل می‌شود:

$$r_{\max} = \frac{-1500}{-4\pi} = \frac{375}{\pi} \xrightarrow{(*)} x = 750 - \pi r = 750 - \pi\left(\frac{375}{\pi}\right) = 750 - 375 = 375$$

گزینه دو علوم تجربی یازدهم آزمون شماره ۳ ۱۳۹۷

چون تابع دارای مینیمم است، پس $a > 0$. ازطرفی کمترین مقدار در ربع سوم قرار دارد، پس $y = 0$ دارای دو ریشه است، پس $\Delta > 0$.

$$4 - 4a(2a - 1) > 0 \Rightarrow 4a^2 - 4a - 4 < 0 \Rightarrow 2a^2 - a - 1 < 0$$


$$\Rightarrow (2a + 1)(a - 1) < 0 \Rightarrow -\frac{1}{2} < a < 1 \xrightarrow{a > 0} 0 < a < 1$$

$$-\frac{b}{2a} = \frac{-2}{2a} < 0 \quad \text{به ازای } 0 < a < 1 \text{ بدیهی است}$$

قلمچی علوم تجربی چهارم آزمون شماره ۱۸ ۱۳۹۶

نمودار از مبدأ گذشته (نقطه $(0, 0)$) در معادله آن صدق می‌کند و از ناحیه دوم عبور نمی‌کند، بنابراین شکل آن به صورت زیر خواهد بود.

سهمی رو به پایین باز می‌شود، پس ضریب x^2 منفی است؛ در نتیجه: $a < 0$
از طرفی محور تقارن آن نامنفی است، لذا:



$$x = -\frac{b}{2a} \geq 0 \Rightarrow \frac{a+b}{2a} \geq 0$$

در نامساوی بالا، از آنجایی که مخرج کسر منفی است، باید صورت کسر کوچک‌تر یا مساوی صفر باشد تا کسر بزرگ‌تر یا مساوی صفر شود:

$$a + b \leq 0 \Rightarrow a \leq -b$$

قلمچی علوم تجربی دهم آزمون شماره ۱۳۹۶۷

قلمچی ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره ۱۳۹۶۷

نقطه $(2, 4)$ نقطهٔ ماکزیمم سهمی $f(x) = ax^2 + bx$ است، پس مختصات آن در معادلهٔ سهمی صدق می‌کند و طول این نقطه همواره $x = -\frac{b}{2a}$ است، داریم:

$$\begin{cases} 4 = 4a + 2b \\ -\frac{b}{2a} = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b + 2a = 2 \\ b = -4a \end{cases} \Rightarrow -2a = 2 \Rightarrow a = -1, b = 4$$

$$f(x) = -x^2 + 4x \Rightarrow f(5) = -25 + 20 = -5$$

قلمچی ریاضی و فیزیک سوم آزمون شماره ۱۳۹۶۳

وقتی سهمی بر خط $y = -4$ مماس است یعنی عرض رأس سهمی -4 است.

$$-\frac{\Delta}{4a'} = -4 \Rightarrow \Delta = 16(a') = 16(1) = 16$$

قدر مطلق تفاضل صفرهای تابع درجه دوم برابر است با:

$$\frac{\sqrt{\Delta}}{|a'|} = \frac{\sqrt{16}}{1} = 4$$

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره ۳ ۱۳۹۸

نکته: در نمودار سهمی $y = ax^2 + bx + c$ اگر $a > 0$ ، جهت سهمی روبه بالا و اگر $a < 0$ ، جهت سهمی روبه پایین است.
نکته: اگر α و β ریشه‌های معادله درجه دوم $ax^2 + bx + c = 0$ باشند، آنگاه داریم:

$$\alpha + \beta = -\frac{b}{a}, \quad \alpha\beta = \frac{c}{a}$$

باتوجه به نمودار، تابع دارای دو ریشه منفی است؛ پس اگر α و β صفرهای تابع باشند، مطابق نکات باید سه شرط $\alpha\beta > 0$ ، $\Delta > 0$ و $\alpha + \beta < 0$ برقرار باشد. تک تک گزینه‌ها را بررسی می‌کنیم:

$$\text{گزینه ۱: } \alpha\beta = \frac{4}{-1} < 0 \quad \times$$

$$\text{گزینه ۲: } \Delta = 4 - 16 < 0 \quad \times$$

$$\text{گزینه ۳: } \alpha + \beta = \frac{-4}{-1} > 0 \quad \times$$

$$\text{گزینه ۴: } \begin{cases} \Delta = 16 - 8 > 0 \\ \alpha\beta = \frac{-2}{-1} > 0 \\ \alpha + \beta = \frac{4}{-1} < 0 \end{cases} \quad \checkmark$$

بنابراین گزینه "۴" پاسخ است.

گزینه دو ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره ۵ ۱۳۹۷

$$\begin{aligned}
 \text{مساحت مستطیل} & \quad \text{مساحت مربع} \\
 S = \underbrace{3xy}_{\text{مساحت مستطیل}} + \underbrace{x^2}_{\text{مساحت مربع}} \\
 P = 16 \Rightarrow 3x + 2x + 3x + 2y = 16 \\
 \Rightarrow 8x + 2y = 16 \xrightarrow{\div 2} 4x + y = 8 \Rightarrow y = 8 - 4x \\
 S = 3x(8 - 4x) + x^2 \Rightarrow S = -11x^2 + 24x
 \end{aligned}$$

عبارت فوق یک تابع درجه دوم است که حداکثر مقدار S در $x = \frac{-b}{2a}$ رخ می‌دهد، پس:

$$x = \frac{-b}{2a} = \frac{-24}{2 \times (-11)} = \frac{12}{11}$$

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره ۴ ۱۳۹۷