๒ᲘᲮՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԱՐՏԱՇԵՍ ՇԱՀԻՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՖԻԶԻԿԱՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՀԱՏՈւԿ ԴՊՐՈՑ



Դետաքրքրաշարժ և տրամաբանական խնդիրներ

2001-2020 տարիների ընդունելության քննությունների տարբերակներ

(7-10-րդ դասարաններ)

Կազմող՝ Հ.Նավասարդյան

ԵՐԵՎԱՆ 2020 Ժողովածուի առաջին մասում բերված են 235 հետաքրքիր և ինքնատիպ խնդիրներ՝ իրենց պատասխաններով։ Որոշ խնդիրների համար տրված են ցուցումներ կամ պատասխաններ։ Երկրորդ մասում ներառված են ԵՊՀ-ին առընթեր Ա.Շահինյանի անվան ֆիզմաթ հատուկ դպրոցի 2001-2020 թվականների ընդունելության քննությունների տարբերակները։

Որոշ խնդիրներ իրենց բովանդակությամբ ոչ ստանդարտ են, որոնց լուծելու համար պահանջվում է հնարամիտ և տրամաբանական մոտեցում։

Ժողովածուն օգտակար կլինի 7-9 դասարանների աշակերտների, մաթեմատիկայի խմբակների ղեկավարների, հիմնական դպրոցի մաթեմատիկայի ուսուցիչների և բոլոր նրանց համար ովքեր սիրում են զբաղվել մաթեմատիկական հետաքրքրաշարժ խնդիրներով։

- 1. 56** աստղանիշները փոխարինել թվանշաններով այնպես, որ ստացված քառանիշ թիվը բաժանվի և՛ 6-ի, և՛ 8-ի, և՛ 15-ի։
- 2. 18 թվի աջից և ձախից գրեք մեկական թվանշան այնպես, որ ստացված քառանիշ թիվը բաժանվի 18-ի։ Քանի՞ դեպք կա։
- 3. **13* թվի մեջ աստղանիշները փոխարինել թվանշաններով այնպես, որ ստացվի 24-ի բաժանվող այդպիսի ամենամեծ թիվը։
- 4. Որքանո՞վ է 1-ից 100 եղած զույգ թվերի գումարը մեծ կենտ թվերի գումարից։
- 5. Երկու փոխադարձաբար պարզ թվերի արտադրյալը հավասար է 432-ի։ Գտեք այդ թվերը։
- 6. 7 խնձորը հավասարապես բաժանել 12 երեխաների այնպես, որ ոչ մի խնձոր չբաժանվի 4-ից ավել մասերի։
- 7. 9 մետաղադրամներից մեկը կեղծ է և թեթև։ Նժարավոր կշեռքով ընդամենը երկու կշռում կատարելով ինչպե՞ս գտնել կեղծ մետաղադրամը։
- 8. Գտնել ո-ի այն բոլոր ամբողջ արժեքները, որոնց դեպքում հետևյալ արտահայտության արժեքը ևս ամբողջ թիվ է.

$$\text{ w) } \frac{2n-8}{n-6} \,, \qquad \text{p) } \frac{2n+9}{n-3} \,, \quad \text{q) } \frac{4n-5}{2n-1} \,:$$

- 9. 1-ից մինչև 1000 բնական թվերի մեջ ո՞ր թվերն են շատ, նրանք, որ բաժանվում են 3-ի կամ 5-ի, թե նրանք, որ չեն բաժանվում 3-ի կամ 5-ի:
- 10. Սեղանի վրա դրված է 7 թուղթ։ Ամեն անգամ թույլատրվում է վերցնել ցանկացած թվով թղթեր և յուրաքանչյուրը բաժանել 7 մասի։ Յնարավո՞ր է արդյոք, որ որոշ քայլերից հետո սեղանին լինի 1998 կտոր թուղթ։
- 11. Եռանիշ թիվը վերջանում է 2-ով։ Եթե այն տեղափոխենք թվի սկիզբը, ապա նոր ստացված թվի 90%-ը 4-ով փոքր կլինի սկզբնական թվից։ Գտնել եռանիշ թիվը։
- 12. Ինչպե՞ս 12լ հեղուկից ստանալ 6լ հեղուկ, օգտագործելով միայն 8լ և 5լ տարողությամբ ամաններ։
- 13.Ավտոբուսի տոմսը համարվում է երջանիկ, եթե նրա թվանշանների միջև կարելի է դնել թվաբանական գործողություններ և փակագծեր այնպես, որ արդյունքում ստացվի100։ Երջանիկ է արդյո՞ք 123456 համարի տոմսը։
- 14. Ժամը վեցը ազդարարելու համար (վեց զարկ) հարկավոր է 6 վայրկյան։ Քանի՞ վայրկյան է անհրաժեշտ ժամը 11-ը ազդարարելու համար։
- 15. Առաջին պարկը պարունակում է միայն 5 լումա արժեք ունեցող մետաղադրամներ, իսկ երկրորդ պարկը՝ միայն 10 լումա արժեք ունեցող մետաղադրամներ։ 5 լումա արժեք ունեցող մետաղադրամը 2 անգամ

ծանր է 10 լումա արժեք ունեցող մետաղադրամից։ Որքա՞ն է երկրորդ պարկի քաշը, եթե առաջին պարկը 1կգ է և հայտնի է, որ մետաղադրամների գումարային արժեքները երկու պարկերում էլ նույնն են։

16. Գրքից պոկվել ընկել են մի քանի թերթեր։ Պոկված թերթերից առաջին էջը 231-ն է, իսկ վերջին էջի համարը կազմված է այդ նույն թվանշաններով, բայց գրված մեկ ուրիշ կարգով։ Քանի՞ թերթ է պոկվել գրքից։

17. Իրար հետևից գրված են 1-ից մինչև 1000 թվերը։ Այդ շարքում

քանի՞ անգամ է հանդիպում 4 թվանշանը։

18. Մանկական դոմինոյի խաղաքարերի վրա պատկերված են 12 տարբեր կենդանիներ։ Քանի՞ խաղաքար է պարունակում դոմինոյի այդպիսի լրիվ հավաքածուն։

19. Ունենք քարերի կույտ։ Երկու խաղացողներից յուրաքանչյու-րն ամեն անգամ կույտից կարող է վերցնել 1, 2 կամ 3 քար։ Պարտվում է նա, ով այլևս քար չի ունենում վերցնելու։ Կույտի քարերի սկզբնական ինչպիսի՞ քանակի դեպքում կիաղթի երկրորդ խաղացողը։

20. Կարո՞ղ է արդյոք 2 երկնիշ թվերի արտադրյալը հավասար լինել

միևնույն թվանշանից բաղկացած քառանիշ թվի։ Ինչու՞։

21. Վերծանել գրառումը. * * • * = * +1:

- 22. Երեք որսորդներ նախաճաշի ժամանակ եփեցին շիլա։ Նրանցից մեկը տվեց իր մոտ եղած երկու բաժակ բրինձը, երկրորդը՝ իր մոտ եղած մեկ բաժակ բրինձը։ Նրանք շիլան կերան հավասարապես։ Երրորդ որսորդը, որն իր մոտ բրինձ չէր ունեցել, նախաճաշի համար տվեց 8 փամփուշտ։ Ինչպե՞ս բաժանել այդ փամփուշտները առաջին և երկրորդ որսորդների միջև։
- 23. Անահիտը, Գոհարը և Անին տոնի համար պետք է գնեին 12 հատ խմորեղեն։ Անահիտը գնեց 5 հատ, Գոհարը՝ 7 հատ, իսկ Անին իր բաժին խմորեղենի դիմաց նրանց վճարեց 1000 դրամ։ Ինչպե՞ս պետք է բաժանեն այդ գումարը Անահիտը և Գոհարը։

24. Ոչխարներն ու հավերը միասին ունեն 1000 գլուխ և 3200 ոտք։

Որքա՞ն է ոչխարների թիվը։

- 25. Դասարանի 26 աշակերտներին բաժանեցին 90 խնձոր։ Աղջիկներից յուրաքանչյուրին տվեցին 4 խնձոր, իսկ յուրաքանչյուր տղայի՝ 3 խնձոր։ Քանի՞ տղա և քանի՞ աղջիկ կա դասարանում։
- 26. 10 տետր գնելու համար Յասմիկին պակասում է 20 դրամ։ Եթե նա գնի 7 տետր, ապա նրա մոտ կմնա 55 դրամ։ Որքա՞ն է մեկ տետրի գինը։
- 27. 8 մատիտ գնելու համար Աշխենին պակասում է 10 դրամ։ Եթե նա գնի 6 մատիտ, ապա նրա մոտ կմնա 30 դրամ։ Որքա՞ն դրամ ունի Աշխենը։
- 28. Շիշը և բաժակը կշռում են այնքան, որքան սափորը։ Շիշը կշռում է այնքան, որքան բաժակը և ափսեն։ Երկու սափորը կշռում են այնքան, որքան 3 ափսեն։ Քանի՞ բաժակը կկշռի այնքան, որքան մեկ շիշը։

29. Յասմիկն ու Աշխենը ունեն հավասար գումար։ Աշխենը իր գումարի ո՞ր մասը պետք է տա Յասմիկին, որ Յասմիկի մոտ լինի ա) երեք, բ) երկու անգամ ավել շատ գումար, քան Աշխենի։

30. Եթե ես ապրեմ իմ ապրածի ևս կեսը, էլի երրորդ մասը և չորրորդ

մասը, ապա կդառնամ 100 տարեկան։ Քանի՞ տարեկան եմ ես։

31. Այն հարցին թե քանի՞ աշակերտ է հաճախում նրա մոտ, հույն մաթեմատիկոս Պյութագորասը պատասխանել է. «Իմ աշակերտների կեսն ուսումնասիրում է մաթեմատիկա, քառորդ մասը` բնություն, հինգերորդ մասը ժամանակն անցկացնում է լռությամբ խորհելու վրա, մնացած մասը կազմում են երեք աղջիկ»։ Քանի՞ աշակերտ ուներ Պյութագորասը։

32. Երբ ուղևորը գնացքով անցավ ամբողջ ճանապարհի կեսը, պառկեց քնելու և քնեց այնքան ժամանակ, մինչև որ մնաց անցնելու այն ճանապարհի կեսը, որ նա քնած էր անցել։ Ամբողջ ճանապարհի ո՞ր մասը

նա քնած անցավ։

33. Յետիոտնը անցավ 1կմ և մնացած ճանապարհի կեսը, որից հետո նրան մնաց անցնելու ամբողջ ճանապարհի երրորդ մասը և էլի 1կմ։ Որքա՞ն է ամբողջ ճանապարհը։

34. Տարբեր երկարություն և հաստություն ունեցող երկու մոմերից երկարը լրիվ այրվում է 6 ժամում, իսկ կարճը՝ 8 ժամում։ Չորս ժամ միաժամանակ այրվելուց հետո նրանց երկարությունները հավասար-

վեցին։ Սկզբում քանի՞ անգամ էր մի մոմը երկար մյուսից։

35. Արմենի ծննդյան տարեդարձին ներկա էին նրա 5 ընկերները։ Առաջինի համար նա կտրեց տորթի 1/6 մասը, երկրորդի համար կտրեց մնացածի 1/5 մասը, երրորդի համար՝ մնացածի 1/4 մասը, չորրորդի համար՝ մնացածի 1/3 մասը։ Տորթի մնացած կտորը Արմենը հավասարապես կիսեց հինգերորդ ընկերոջ հետ։ Ու՞մ հասավ տորթի ավելի մեծ կտոր։

36. Ձին մի դեզ խոտը ուտում է 2 օրում, կովը` 3 օրում, իսկ ոչխարը` 6 օրում։ Որքա՞ն ժամանակում ձին, կովը և ոչխարը միասին կուտեն մի դեզ

խոտը։

37. Այծը և կովը մի դեզ խոտը ուտում են 45 օրում, կովը և ոչխարը` 60 օրում, իսկ ոչխարն ու այծը` 90 օրում։ Քանի՞ օրում այծը, կովը և ոչխարը

միասին կուտեն մի բեռ խոտը։

- 38. Ջրավազանը հնարավոր է լցնել երեք խողովակով։ Առաջին և երկրորդ խողովակներով այն լցվում է 20 ժամում, երկրորդ և երրորդ խողովակներով՝ 10 ժամում, իսկ առաջին և երրորդով՝ 12 ժամում։ Յուրաքանչյուր խողովակով քանի՞ ժամում կլցվի ջրավազանը և քանի՞ ժամում այն կլցվի, եթե միաժամանակ բացեն երեք խողովակները։
- 39. Շարժասանդուղքը իր վրայով իջնող մարդուն ներքև է հասցնում 1 րոպեում։ Եթե մարդը սկսի իջնել երկու անգամ ավելի արագ, ապա նա կհասնի ներքև 45 վայրկյանում։ Որքա՞ն ժամանակում կհասնի ներքև շարժասանդուղքի վրա անշարժ կանգնած մարդը։

- 40. Արամը սովորաբար դպրոցից տուն է վերադառնում ոտքով։ Մի անգամ նա ճանապարհի կեսն անցավ ավտոբուսով, որի արագությունը 15 անգամ մեծ էր իր արագությունից։ Յանդիպելով ընկերոջը նա ճանապարհի երկրորդ կեսն անցավ զրուցելով՝ շարժվելով սովորականից երկու անգամ ավելի դանդաղ։ Այդ անգամ Արամը տուն սովորականից շու՞տ հասավ, թե՞ ուշ։
- 41. Գնացքը 800 մ երկարությամբ թունելն անցնում է 40 վայրկյանում, իսկ սյան կողքով` 8 վայրկյանում։ Որոշել գնացքի արագությունը և երկարությունը։
- 42. Երկու ընկերներ 2 կմ հեռավորությունից սկսում են քայլել դեմհանդիման` երկուսն էլ 2 կմ/ժ արագությամբ։ Շունը, սկսելով նրանցից մեկի մոտից, վազում է դեպի մյուսը և, հասնելով նրան, արագ շրջվում ու ետ է գնում մյուսի մոտ, և այդպես շարունակ` մինչև ընկերների հանդիպելը։ Որքա՞ն ճանապարհ կանցնի շունն այդ ընթացքում, եթե նրա արագությունը 8 կմ/ժ է։
- 43. Տուրիստը երեկ անցել է 3 կմ քիչ, քան անցյալ օրը և 20 կմ քիչ, քան անցյալ օրը և այսօր միասին։ Ինչքա՞ն է նա անցել այսօր։
- 44. Անցնելով ճանապարհի կեսը մոտորանավակը արագությունը մեծացրեց 25%-ով և տեղ հասավ կես ժամ շուտ։ Մոտորանավակը քանի՞ ժամ եղավ ճանապարհին։
- 45. Երկու թվերի գումարը 162 է։ Նրանցից մեծը փոքրի վրա բաժանելիս քանորդում ստացվում է 5։ Գտեք այդ թվերը։
- 46. Իրարից տարբեր երեք բնական թվերի գումարը հավասար է 186-ի։ Այդ թվերից յուրաքանչյուր երկուսի գումարը բաժանվում է երրորդի վրա։ Գտեք այդ թվերը։
- 47. Որքա՞ն երկնիշ թվեր կան, որոնց տասնյակների թվանշանը մեծ է միավորների թվանշանից։
- 48. Գտնել երկու հաջորդական բնական թվեր, որոնցից յուրաքանչյուրի թվանշանների գումարը բաժանվում է 17-ի։
- 49. Յնգանիշ թիվը, որի բոլոր թվանշանները տարբեր են, բազմապատկեցին 4-ով։ Արդյունքում ստացվեց նույն թվանշաններով կազմված, բայց հակառակ կարգով գրված թիվ։ Գտեք սկզբնական թիվը։
- 50. Կարո՞ղ է արդյոք բնական թվի թվանշանների արտադրյալը հավասար լինել 528-ի։
- 51. 100 և 90 թվերը բաժանեցին նույն թվի վրա։ Առաջին դեպքում մնացորդում ստացան 4, իսկ երկրորդի դեպքում` 18։ Ի՞նչ թվի վրա էր կատարվում բաժանումը։
- 52. Երեք որսորդներ ունեին հավասար քանակությամբ փամփուշտ։ Երբ յուրաքանչյուր որսորդը կրակեց չորս անգամ նրանց մոտ ընդամենը մնաց այնքան փամփուշտ, որքան կար յուրաքանչյուրի մոտ սկզբում։ Ընդամենը քանի՞ փամփուշտ կար յուրաքանչյուր որսորդի մոտ մինչև կրակելը։

- 53. Թիվը 2-ի բաժանելիս մնացորդում ստացվում է 1, իսկ 3-ի բաժանելիս` 2։ Ի՞նչ մնացորդ կստացվի, եթե այդ թիվը բաժանենք 6-ի։
- 54. Թիվը 6-ի բաժանելիս մնացորդում ստացվում է 4, իսկ 15-ի բաժանելիս՝ 7։ Ի՞նչ մնացորդ կստացվի, եթե այդ թիվը բաժանենք 30-ի։
- 55. Ի՞նչ թվանշանով է վերջանում բոլոր երկնիշ թվերի արտադրյալի և բոլոր երկնիշ կենտ թվերի արտադրյալի տարբերությունը։
- 56. 2-րդ հարկ գնալու համար պետք է բարձրանալ 20 աստիճան։ Քանհ՞ աստիճան պետք է բարձրանալ 4-րդ հարկ գնալու համար։
- 57. Երկու բանվոր 2 ժամում փորում են 2մ երկարությամբ փոս։ Քանի՞ բանվոր 5 ժամում կփորեն 5մ երկարությամբ փոս։
- 58. Աշոտը Ա քաղաքից Բ քաղաքը գնում է 10 օրում, իսկ Արամը՝ Բ-ից Ա 15 օրում։ Քանի՞ օր հետո նրանք կհանդիպեն, եթե Ա և Բ քաղաքներից դուրս գան միաժամանակ։
 - 59. Տարվա մեջ ամենաշատը քանի՞ շաբաթ օր կարող է լինել։
- 60. Կախարդական ծառի վրա աճել է 25 բանան և 30 նարինջ։ Այգեպանն ամեն օր քաղում է երկու միրգ։ Եթե նա քաղում է տարբեր տեսակի միրգ, ապա նրանց փոխարեն աճում է բանան, իսկ եթե քաղում է միևնույն տեսակի միրգ՝ աճում է նարինջ։ Ի վերջո ծառի վրա մնացել է մեկ միրգ։ Ի՞նչ միրգ է դա։
- 61. Գոյություն ունի՞ արդյոք բնական թիվ, որի թվանշանների արտադրյալը հավասար լինի 1998-ի։
- 62. Գրատախտակի վրա գրված են 1,2,...,1996,1997 թվերը։ Թույլատրվում է ամեն անգամ մաքրել ցանկացած երկուսը և փոխարենը գրել նրանց տարբերության մոդուլը։ Վերջում գրատախտակի վրա մնացել է մեկ թիվ։ Կարո՞ղ է այդ թիվը հավասար լինել 0-ի։ Ինչու՞։
 - 63. 3×9 չափի ուղղանկյունը տրոհել ութ քառակուսիների։
- 64. Կարելի՞ է արդյոք 1-ից մինչև 1997 բնական թվերը բաժանել մի քանի խմբի այնպես, որ յուրաքանչյուր խմբում ամենամեծ թիվը հավասար լինի այդ խմբի մնացած բոլոր թվերի գումարին։ Ինչու՞։
- 65. Վերծանել **+9*+**=*0* հավասարությունը, եթե հայտնի է, որ նրա ձախ մասի գումարելիները պարզ թվեր են և նրանց բոլոր թվանշաններն իրարից տարբեր են:
- 66. 54×37 չափի ուղղանկյունը երկու նկարիչներ տրոհում են փոքրիկ ուղղանկյունների հետևյալ ձևով. նրանցից մեկը, ամեն անգամ, ընտրած ուղղանկյունը տրոհում է 5 ուղղանկյունների, իսկ մյուսը՝ 9 ուղղանկյունների։ Որոշ ժամանակ հետո նրանք դադարեցրին իրենց աշխատանքը։ Կարո՞ղ է արդյոք փոքրիկ ուղղանկյունների քանակը լինել 1999։ Ինչու՞։
- 67. Վոլեյբոլի առաջնությանը մասնակցել են 10 թիմ, որոնցից երկուսը վերջում հավաքել են հավասար միավորներ։ Ապացուցել, որ կան այնպիսի երեք՝ Ա,Բ և Գ թիմեր, որ Ա-ն հաղթել է Բ-ին, Բ-ն հաղթել է Գ-ին, իսկ Գ-ն հաղթել է Ա-ին։

- 68. Գրատախտակին գրված են մի քանի դրական թվեր, որոնցից յուրաքանչյուրը հավասար է մնացած բոլորի կիսագումարին։ Քանի՞ թիվ է գրված գրատախտակին։
- 69. Գտնել այն ամենափոքր թիվը, որը 2-ի բաժանելիս տալիս է 1 մնացորդ, 3-ի բաժանելիս՝ 2 մնացորդ, 4-ի բաժանելիս՝ 3 մնացորդ, 5-ի բաժանելիս՝ 4 մնացորդ, 6-ի բաժանելիս՝ 5 մնացորդ։
- 70. Դասարանում սովորում են 30 աշակերտ։ Նրանցից 18-ը մասնակցում են սպորտային խմբակի պարապմունքներին, իսկ 10-ը՝ արվեստի խմբակի պարապմունքներին։ 3 աշակերտ մասնակցում են այդ երկու խմբակների պարապմունքներին։ Դասարանի աշակերտներից քանի՞սը չեն մասնակցում այդ երկու խմբակների պարապմունքներից ոչ մեկին։
- 71. 4373 և 826 թվերը նույն թվի վրա բաժանելիս համապատասխանաբար ստացվում են 8 և 7 մնացորդներ։ Ի՞նչ թվի էին բաժանել։
- 72. Արկղում կան 70 փուչիկներ, որոնցից 20-ը կարմիր է, 20-ը՝ կապույտ, 20-ը՝ դեղին, իսկ մնացածը՝ կանաչ և սպիտակ։ Արկղից, առանց նայելու, ամենաքիչը քանի՞ փուչիկ պետք է հանել, որպեսզի նրանց մեջ գոնե 10 փուչիկ լինեն նույն գույնի։
- 73. Գտնել այն ամենամեծ քառանիշ թիվը, որը բոլոր (բացի 1 թվից) միանիշ թվերի վրա բաժանելիս 1 մնացորդ է ստացվում։
- 74. Սուրճի լիքը բաժակի կեսը խմեցի և փոխարենը կաթ ավելացրի։ Յետո ստացվածի 1/3 մասը խմեցի ու նորից կաթ լցրեցի։ Այնուհետև ստացվածի 1/6-ը խմեցի և կրկին կաթ ավելացրի։ Դրանից հետո մինչև վերջ խմեցի։ Կա՞թ շատ խմեցի, թե՞ սուրճ։
- 75. Ապացուցել, որ մեկից մեծ ցանկացած կենտ թիվ կարելի է ներկայացնել երկու բնական թվերի քառակուսիների տարբերության տեսքով։
- 76. Գոյություն ունի՞ արդյոք բնական թիվ, որի թվանշանների արտադրյալը 2001 է։
- 77. 10 պոմպերի օգնությամբ 10 րոպեում կարելի է արտամղել 10 տոննա ջուր։ Քանի՞ րոպեում է հնարավոր 25 պոմպերով արտամղել 25 տոննա ջուր։
- 78. Ձամբյուղում եղած նարինջների քանակը 70-ից փոքր է։ Նարինջները հնարավոր է հավասարապես բաժանել 2, 3 կամ 5 երեխաների, սակայն հնարավոր չէ բաժանել 4 երեխաների։ Քանի՞ նարինջ կա զամբյուղում։
- 79. Ստախոսների քաղաքի բոլոր բնակիչները միայն սուտ են խոսում, իսկ ճշմարտախոսների քաղաքի բոլոր բնակիչները` միայն ճիշտ։ Քաղաքներն իրար շատ մոտ են գտնվում, այդ պատճառով թե մեկ, թե մյուս քաղաքի փողոցներում կարելի է հանդիպել ցանկացած քաղաքի բնակչի։ Քաղաքներից մեկի փողոցում պատահական անցորդի միայն մեկ հարց տալով ինչպե՞ս կարելի է հասկանալ, թե որ քաղաքում ես գտնվում։

80. Ֆուտբոլային թիմը երեք խաղում խփել է 3 գնդակ և իր դարպասը թողել 1-ը։ Յայտնի է, որ խաղերից մեկում թիմը հաղթել է, մեկում ոչ ոքի է արել, իսկ երրորդում պարտվել է։ Պարզել թե ին՞չ հաշվով է ավարտվել յուրաքանչյուր խաղը։

81. Ավազանն առաջին ծորակով լցվում է երկու ժամում, երկրորդով` երեք ժամում, իսկ երրորդով` չորս ժամում։ Երեք խողովակները միասին

ինչքա՞ն ժամանակում կլցնեն ավազանը։

82. 4x4 չափի քառակուսու վանդակներում տեղադրեք չորս տառ չորսական այնպես, որ յուրաքանչյուր հորիզոնական շարքում, յուրա-քանչյուր ուղղագիծ շարքում և յուրաքանչյուր անկյունագծի վրա այդ տառերից ամեն մեկը գրված լինի միայն մեկ անգամ։

83. Ապացուցել, որ ցանկացած 15 բնական թվերի մեջ կան երկու թվեր

որոնց տարբերությունը բաժանվում է 14-ի։

- 84. Կոտորակի համարիչը մեծացրեցին 20%-ով։ Քանի՞ տոկոսով պետք է փոքրացնեն կոտորակի հայտարարը, որպեսզի արդյունքում կոտորակը մեծանա երկու անգամ։
- 85. Երեք բանվոր երկու ժամում շարում են 3 քառ.մ. պատ։ Վեց բանվորը հինգ ժամում քանի՞ քառ.մ. պատ կշարեն։
- 86. Արկղում կան չորս գույնի գնդիկներ, յուրաքանչյուր գույնից` 10 գնդիկ։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ գնդիկ պետք է վերցնել արկղից, որպեսզի նրանց մեջ գոնե 10 գնդիկներ լինեն նույն գույնի։

87. Գտնել 5n+6 և 8n+7 թվերի ընդհանուր բաժանարարները, որտեղ n-ը

բնական թիվ է։

- . 88. \mathbf{R} \mathbf{R}
- 89. Գիտաժողովին մասնակցող մաթեմատիկներից յուրաքանչյուր չորրորդը տիրապետում է անգլերենին, իսկ անգլերենին տիրապետողներից յուրաքանչյուր հինգերորդը մաթեմատիկ է։ Գիտաժողովի մասնակիցների մեջ ովքե՞ր են շատ, մաթեմատիկնե՞րը, թե՞ անգլերենին տիրապետողները։

90. Գտնել այն բնական թվերը, որոնք երկու անգամ մեծ են իրենց

թվանշանների գումարից։

- 91. Ինչպե՞ս գրիչը թղթից չկտրելով, և գծելով ընդամենը վեց հատված, անցնել վանդակավոր թղթի 3x3 չափերի քառակուսու բոլոր 16 հանգույցներով։
- 92. Յայրիկը Յասմիկին, Տիգրանին և մյուս երեխաներին բաժանեց 50 կոնֆետ, յուրաքանչյուրին ոչ քիչ քան երկու կոնֆետ։ Տիգրանն անմիջապես կերավ իր բոլոր կոնֆետները, իսկ մյուսները պահեցին և հաջորդ օրը յուրաքանչյուրն իր կոնֆետների կեսը տվեց Յասմիկին՝ ծննդյան օրվա առթիվ։ Այդ պատճառով Յասմիկի կոնֆետների թիվն ավելացավ 10 անգամ։ Տիգրանը քանի՞ կոնֆետ էր կերել։

- 93. Գոյություն ունե $^{\circ}$ ն արդյոք x,y ամբողջ թվեր այնպես, որ $x^2+x+10y=2001$ ։
- 94. Ապացուցել, որ հետևյալ հավասարումները բնական թվերով լուծումներ չունեն.

 - q) (2n+1)(2n+3)+3=2003, n) (n+3)(n+4)+4m+8k=2003:
- 95. 3 տարի հետո հայրը որդուց մեծ կլինի 6 անգամ։ Քանի՞ տարեկան է այժմ որդին, եթե նրանց տարիքները գրվում են նույն թվանշանով։
- 96. Արմենը 2003 թվականին դարձավ այնքան տարեկան, որքան նրա ծննդյան թվի թվանշանների գումարն է։ Քանի՞ տարեկան դարձավ Արմենո։
- 97. 8 տետրի արժեքը այնքան է, որքան տետր կարելի է գնել 5000 դրամով։ Որքա՞ն է մեկ տետրի գինը։
- 98. Դասարանում կա 30 աշակերտ։ Նրանց ցանկացած 20 հոգիանոց խմբում գոնե մեկը աղջիկ է, իսկ ցանկացած 12 հոգիանոց խմբում գոնե մեկը տղա է։ Քանի՞ տղա և քանի՞ աղջիկ կա դասարանում։
- 99. Իրար հետևից գրված են 1-ից 1000 բնական թվերը։ Գտնել այդ շարքի 2001-րդ թվանշանը։
- 100. Գիրքը էջակալելու համար օգտագործվել է 2004 թվանշան։ Քանի՞ էջից է բարկացած գիրքը, եթե համարակալումը սկսել են 1-ին էջից։
- 101. Շրջանագծի վրա կամայական ձևով դասավորված են 1-ից 9 թվերը։ Ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ իրար հետևից դասավորված երեք թվանշաններ կազմում են եռանիշ թիվ։ Գտնել այդպիսի բոլոր ինը թվերի գումարը։
- 102. Երկու դրական x և y թվերի համար հայտնի է, որ x+y>2.5 և $x^2+y^2<4$ ։ Ապացուցել, որ xy>1։
- 103. Կարելի՞ է արդյոք 44 մետաղադրամները բաժանել10 դրամապանակների մեջ այնպես, որ նրանցից ցանկացած երկուսը պարունակեն տարբեր քանակությամբ մետաղադրամներ։
- 104. Ապացուցել, որ ցանկացած 5 մարդկանց մեջ կա 2 հոգի, որոնք այդ 5 հոգու մեջ ունեն հավասար թվով ծանոթներ։
- 105. Ապացուցել, որ ցանկացած 6 մարդկանց մեջ կա 3 հոգի, որոնք զույգ առ զույգ իրար ճանաչում են, կամ կա 3 հոգի, որոնք զույգ առ զույգ իրար չեն ճանաչում։
- 106. Ձին մեկ դեզ խոտը ուտում է 1 ամսում, այծը` 2 ամսում, իսկ ոչխարը` 3 ամսում։ Նրանք միասին ինչքա՞ն ժամանակում կուտեն մեկ դեզ խոտը։
- 107. Յունվար ամսին եղել է 4 երկուշաբթի և 4 ուրբաթ։ Շաբաթվա ի՞նչ օր է եղել հունվարի 20-ր։
- 108. Գրատախտակի վրա գրված են 0,1,0,0 թվերը։ Ամեն անգամ թույլատրվում է ցանկացած երկուսին ավելացնել մեկեր։ Յնարավո՞ր է արդյոք հասնել այն բանին, որ գրատախտակին գրված բոլոր թվերը իրար հավասար լինեն։

109. Սեղանի վրա դրված են 7 շրջված բաժակ։ Թույլատրվում է միաժամանակ շրջել ցանկացած 2 բաժակ։ Յնարավո՞ր է արդյոք հասնել

այն բանին, որ բոլոր բաժակները դրված լինեն ուղիդ։

110. Գրքի գինը սկզբում բարձրագրին 30%-ով, իսկ որոշ ժամանակ հետո նոր գինը բարձրացրին 10%-ով։ Որքա՞ն դարձավ գրքի գինը, եթե նրա սկզբնական գինը 1200 դրամ էր։

111. Ո՞րն է ավելի շատ. 60 տետրերի 20%-ր, թե՞ 20 տետրերի 60%-ր։

112. Գրքի գինը սկզբում իջեցրին 20%-ով, իսկ հետո նոր գինը բարձրագրին 25%-ով, որից հետո այն դարձավ 500 դրամ։ Գտնել գրքի սկզբնական գինը։

113. Աշխենը 40%-ով քիչ փող ունի, քան Յասմիկը։ Յասմիկը Քանի՞

տոկոսով ավելի շատ փող ունի, քան Աշխենը։

114. Քանի՞ տոկոսով կմեծանա քառակուսու մակերեսը, եթե նրա պարագիծը մեծացվի 10%-ով։

- 115. Ապրանքի գինը սկզբում բարձրագրին, իսկ հետո իջեզրին նույն տոկոսով։ Արդյունքում ապրանքի գինը իջավ 1%-ով։ Քանի՞ տոկոսով էին փոխում ապրանքի գինը։
- 116. Երկու գնազքներ, որոնցից լուրաքանչյուրն ունի 250 մետր երկարություն և 45 կմ/ժ արագություն, շարժվում են հակառակ ուղղություններով և անգնում են իրար կողքով։ Քանի՞ վայրկյան կտևի անցումային այդ ժամանակը։
- 117. Երկու երկնիշ պարզ թվեր կազմված են նույն թվանշաններից, բայզ հակառակ կարգով գրված։ Գտեք այդ թվերը։
- 118. Երկնիշ քվին ձախից կզագրեցին 100, իսկ աջից` 1, որից հետո առաջին թիվը 37 անգամ մեծ եղավ երկրորդից։ Գտեք այդ երկնիշ թիվը։
- 119. Գտնել բնական թվի քառակուսի հանդիսացող այնպիսի քառանիշ թիվ, որը նույնն է մնում 180⁰ շրջելիս։
- 120. Գրատախտակին գրված են 1-ից մինչև 252 բնական թվերը։ Արմենը ջնջեց բոլոր զույգ թվերը, բացի նրանցից՝ որոնք բաժանվում են 5-ի։ Այնուհետև Սուրենը ջնջեց 5-ի վրա բաժանվող բոլոր թվերը, բացի նրանցից` որոնք բաժանվում են 2-ի։ Գրատախտակին քանի՞ թիվ մնաց։
- 121. Ապրանքների գները իջել են 20%-ով։ Քանի՞ տոկոսով ավելի ապրանք կարելի է գնել նույն աշխատավարձով։
- 122. Ապացուցել, որ ո-ի ցանկացած ամբողջ արժեթի դեպթում ո³+11ո-ր բաժանվում է 6-ի։
- 123. Ցույզ տալ, որ n^2+n+1 արտահայտությունը n-h բոլոր բնական արժեքների դեպքում կենտ թիվ է և չի հանդիսանում որևէ բնական թվի pառակուսի:
- 124. Թարմ միրգը պարունակում է 72% ջուր, իսկ չոր միրգը՝ 20%: Որքա՞ն չոր միրգ կստացվի 20կգ թարմ մրգից։
- 125. Գտնել բնական թիվը, եթե այն 7 անգամ մեծ է իր միավորների թվանշան**ի**զ։

126. Բնական թիվը գրված է 309 հատ մեկերով և 100 հատ զրոներով։ Ինչու՞ այդ թիվը չի կարող լինել լրիվ քառակուսի։

127. Ապացուցել, որ ցանկացած բնական ո-ի դեպքում 10^ո-4-ը

բաժանվում է 3-ի։

128. Ապացուցել, որ եռանիշ թվի և նույն թվանշաններով, բայց հակառակ կարգով գրված թվի տարբերությունը չի կարող լինել լրիվ քառակուսի։

- 129. Ապացուցել, որ եթե որևէ թվի թվանշանների գումարը հավասար է 21-ի, ապա այն չի կարող լինել լրիվ քառակուսի։
- 130. Գտնել այն բոլոր ab պարզ թվերը, որոնց համար $\overline{ab}+b^2$ թիվը բնական թվի քառակուսի է:
- 131. Գտնել 5n+6 և 8n+7 թվերի ընդհանուր բաժանարարները, որտեղ n-ր բնական թիվ է։
- 132. Ֆուտբոլի առաջնությանը մասնակցում են 10 թիմ, որոնք իրար հետ պետք է խաղան մեկական խաղ։ Ապացուցել, որ առաջնության ցանկացած պահին կլինեն գոնե երկու թիմեր, որոնք խաղացել են հավասար թվով խաղեր։
- 133. Ա գյուղում կա 150 աշակերտ, իսկ հարևան Բ գյուղում՝ 100 աշակերտ։ Ա գյուղից ի՞նչ հեռավորության վրա պետք է կառուցել դպրոցը, որպեսզի բոլոր աշակերտների ամենօրյա անցած ճանապարհների գումարը լինի ամենափոքրը։
- 134. Ունենք երեք կույտ քարեր։ Երկու խաղացողներից յուրաքանչյուրը կարող է վերցնել ցանկացած քանակությամբ քարեր, բայց ամեն անգամ միայն մի կույտից։ Յաղթում է վերջին քար վերցնողը։ Բոլոր կույտերում սկզբում կան հավասար թվով քարեր։ Ինչպե՞ս խաղա սկսողը, որպեսզի հաղթի։
- 135. Յնարավո՞ր է արդյոք շախմատի տախտակի 64 վանդակներից 62-ը ծածկել դոմինոյի 31 քարերով այնպես, որ բաց մնան երկու հանդիպակաց անկյունային վանդակները։
- 136. Զամբյուղում սալորներ կան։ Եթե մայրիկը երեխաներից մեկին տա սալորների կեսը և էլի 1 սալոր, մյուսին` մնացածի կեսը և էլի 2 սալոր, երրորդին` մնացածի կեսը և էլի 3 սալոր, ապա զամբյուղում սալոր չի մնա։ Քանի՞ սալոր կար զամբյուղում։
- 137. Մի վաճառական 3 քաղաքով անցավ։ Առաջին քաղաքում նրանից ունեցվածքի կեսի և 1/3-ի չափ հարկ գանձեցին, երկրորդում` մնացածի կեսի ու 1/3-ի չափ, երրորդում` մնացածի կեսի ու 1/3-ի։ Վաճառականի մոտ մնաց 11 դահեկան։ Սկզբում քանի՞ դահեկան ուներ։
- 138. L.V.Snլստոյի խնդիրը։ Մի խումբ հնձվորներ պետք է հնձեին երկու խոտհարք, որոնցից մեկը երկու անգամ մեծ էր մյուսից։ Օրվա կեսն ամբողջ խումբը մեծ խոտհարքում հունձ արեց, հետո բաժանվեց երկու հավասար մասերի։ Մի մասը մնաց մեծ խոտ-հարքում հունձը ավարտելու համար, իսկ մյուս մասը սկսեց հնձել փոքր խոտհարքը։ Երեկոյան մեծ

խոտհարքի հունձն ավարտվեց, իսկ փոքրի մնացած կտորը հնձեց մեկ հնձվոր՝ ամբողջ հաջորդ օրվա ընթացքում։ Խմբում քանի՞ հնձվոր կար։

139. **Նյուտոնի խնդիրը։** Կանաչ խոտը մարգագետնում աճում է հավասարաչափ։ Յայտնի է, որ 70 կովերի նախիրն ամբողջ խոտը կարածի-կվերջացնի 24 օրում, իսկ 30 կովերի նախիրը՝ 60 օրում։ Քանի՞ կով կարող է ուտել ամբողջ խոտը 96 օրում։

140. **Էյլերի խնդիրը։** Ծերունին իր դրամական խնայողությունը ամբողջովին բաժանեց որդիների միջև հավասարաչափ` կազմելով

այսպիսի կտակ.

-Մեծ որդիս պետք է ստանա 1000 ռուբլի և մնացած գումարի 1/8-րդ մասը, հաջորդ որդիս՝ 2000 ռուբլի և դրանից հետո մնացած գումարի 1/8-րդ մասը, երրորդը՝ 3000 ռուբլի և դրանից հետո մնացած գումարի 1/8-րդ մասը և այդպես շարունակ։

Որոշել ծերունու որդիների քանակը և դրամական խնայողության չափը։

141. 12 մարդ տանում են 12 hաց։ Յուրաքանչյուր տղամարդ տանում է 2 hաց, յուրաքանչյուր կին` կես hաց, իսկ յուրաքանչյուր երեխա` քառորդ hաց։ Պարզել, թե քանի՞ տղամարդ, քանի՞ կին և քանի՞ երեխա կա։

142. Մոտորանավակը լճով գնաց S կմ և ետ վերադարձավ։ Նույն Տկմ-ը մոտորանավակը գնաց և ետ վերադարձավ գետով՝ պահպանելով նույն սեփական արագությունը։ Ո՞ր դեպքում նավակը ավելի քիչ ժամանակ ծախսեց և ինչու՞։

143. Իր ծննդյան օրվա առթիվ սկյուռիկը պատրաստել էր մի մեծ տորթ։ Նապաստակը և սկյուռիկը միասին կշռում են այնքան, որքան ոզնին և տորթը միասին։ Ամբողջ տորթն ուտելուց հետո պարզվեց, որ նապաստակը կշռում է այնքան, որքան սկյուռիկը և ոզնին միասին։ Պարզել, թե նապաստակի կերած տորթի կտորը ու՞մ նախկին քաշին է հավասար՝ իր, սկյուռիկի, թե ոգնու։

144. Ալի-Բաբան քարանձավում գտավ ոսկի և ադամանդ պարունակող գանձ։ Դատարկ սնդուկը, որը կշիռ չունի, տեղավորում է 200կգ ոսկի, կամ՝ 40կգ ադամանդ։ 1կգ ոսկին արժե 20 դինար, իսկ 1կգ ադամանդը՝ 60 դինար։ Ալի-Բաբան կարող է միանգամից վերցնել և տանել 100կգ-ից ոչ ավելի։ Քարանձավից ընդամենը մեկ անգամ գանձ տանելով նա ամենաշատը քանի՞ դինար կարող է վաստակել։

145. Վերծանել հավասարությունը.

$$u$$
) $(*+*) \cdot *+15 = 100$,

p)
$$abc \cdot 5 = dad$$
,

q)
$$abc + ba = dcca$$
,

n)
$$\overline{abc} + \overline{acc} + \overline{dbc} = \overline{bcc}$$
:

146. Լուծել բնական թվերով. 3^m+54=n²:

147. Լուծել հավասարումը. $\overline{ab} + \overline{ba} = x^2$:

- 148. Ապացուցել, որ եթե x+y+z=0, ապա $x^3+y^3+z^3=3xyz$:
- 149. Ապացուցել, որ եթե չորս հաջորդական բնական թվերի արտադրյալին ավելացնենք 1, ապա կստանանք բնական թվի քառակուսի:

150. Ապացուցել, որ ցանկացած բնական n>1 դեպքում

$$\frac{n^4 - 3n^2 + 1}{n^4 - n^2 - 2n - 1}$$
 կոտորակը կանոնավոր է։

- 151. Ապացուցել, որ եթե p>3 պարզ թիվ է, ապա p^2 -1-ը բաժանվում է 24-ի։
- 152. Գտնել այն երկնիշ պարզ թիվը, որին եթե ավելացնենք նրա թվանշանների գումարը, ապա կստանանք եռանիշ պարզ թիվ:

153. Կառուցել հետևյալ հավասարման գրաֆիկը.

u)
$$2x^2+2y^2-2x+2y+1=0$$
, p) $2x^2+2y^2+2x-2y+1=0$:

- 154. Բազմանիշ թիվը կանվանենք համասեռ, եթե այն կազմված է միևնույն թվանշաններից (22,33,666 և այլն)։ Գտնել երկու երկնիշ թվեր այնպես, որ նրանց գումարը լինի երկնիշ համասեռ թիվ, իսկ արտադրյալը եռանիշ համասեռ թիվ։
- 155. Ֆուտբոլային առաջնությունում առաջին տեղը գրաված թիմը հավաքել է 7 միավոր, երկրորդ տեղը՝ 5 միավոր, իսկ երրորդ տեղը՝ 3 միավոր։ Քանի՞ թիմ է մասնակցել առաջնությանը և քանի՞ միավոր է հավաքել վերջին տեղը գրաված թիմը։
 - 156. Ապացուցել, որ (10ⁿ+8)²-ն բաժանվում է 81-ի։
- 157. Ապացուցել, որ ցանկացած բնական ո-ի դեպքում 3^{4ո}-1-ը բաժանվում է 10-ի։
- 158. Ապացուցել, որ ցանկացած բնական ո-ի դեպքում 9²ⁿ+14-ը բաժանվում է 5-ի։
- 159. ¬այտնի է, որ mn+pq-ն բաժանվում է (m-p)-ի վրա առանց մնացորդի։ Ապացուցել, որ mq+np-ն ևս առանց մնացորդի բաժանվում է (m-p)-ի վրա։
 - 160. Ապացուցել, որ $(\overline{abc}-\overline{cba})^2$ -ն բաժանվում է 121-ի։
- 161. Ապացուցել, որ x-ի և y-ի ցանկացած արժեքների դեպքում տեղի ունի $x^2+2y^2+2xy+6y+10>0$ անհավասարությունը:
 - 162. Ապացուցել, որ եթե a > 0, b > 0, c > 0, ապա

$$\text{ w) } a+b+c \geq \sqrt{ab}+\sqrt{ac}+\sqrt{bc},$$

p)
$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \ge \frac{1}{\sqrt{ab}} + \frac{1}{\sqrt{ac}} + \frac{1}{\sqrt{bc}}$$
:

163. Ապացուցել, որ եթե a>0,b>0,c>0 , ապա

$$ab(a+b)+bc(b+c)+ac(a+c) \ge 6abc$$

p)
$$2(a^3 + b^3 + c^3) \ge ab(a+b) + bc(b+c) + ac(a+c)$$
:

- 164. Գտնել ինգաթև աստղի բոլոր հինգ գագաթների անկյունների գումարը։
 - 165. Կարո՞ղ են եռանկյան երկու կիսորդները լինել փոխուղղահայաց:
- 166. Ինչպե՞ս որոշել անկյան մեծությունը, եթե նրա գագաթը գտնվում է գծագրից դուրս։
- 167. Միևնույն շրջանագծի վրա դասավորված չորս տան համար որտե՞ղ է պետք փորել ջրհորը, որպեսզի տներից մինչև ջրհոր եղած հեռավորությունների գումարը լինի փոքրագույնը:
- 168. Վեցանկյան բոլոր գագաթները միացված են իրար կարմիր կամ կապույտ հատվածներով։ Ապացուցել, որ միշտ կգտնվի եռանկյուն, որի բոլոր կողմերն ունեն նույն գույնը։
- 169. Կառուցել անկյան կիսորդը, եթե նրա գագաթը գտնվում է գծագրից դուրս։
- 170. Յայտնի է, որ եռանկյան մեջ անկյան կիսորդը, բարձրությունը և միջնագիծը անկյունը բաժանել են չորս հավասար մասերի։ Գտնել այդ անկյան մեծությունը։
- 171. Ապացուցել, որ ցանկացած քառանկյուն ամբողջովին ծածկվում է այն չորս շրջաններով, որոնց համար տրամագիծ են հանդիսանում այդ քառանկյան կողմերը։
- 172. Ուռուցիկ բազմանկյունն ամենաշատը քանի՞ սուր անկյուն կարող է ունենալ:
- 173. Ո՞ր ուռուցիկ բազմանկյան մեջ է անկյունագծերի քանակը հավասար կողմերի քանակին։
- 174. Նմա՞ն են արդյոք նկարի սովորական շրջանակի արտաքին և ներքին ուղղանկյունները։
- 175. Գտնել եռանկյան անկյունները, եթե նրան ներգծված և արտագծված շրջանագծերի կենտրոնները համաչափ են եռանկյան որևէ կողմի նկատմամբ։
- 176. ABC եռանկյան AC ներքնաձիգի վրա կառուցված է քառակուսի, որի կենտրոնը O կետն է։ Ապացուցել, որ BO-ն B անկյան կիսորդն է։
- 177. Եռանկյան երկու բարձրությունները համապատասխանաբար փոքր չեն եռանկյան այն կողմերից, որոնց ուղղահայաց են։ Գտնել այդ եռանկյան անկյունները։
- 178. Ապացուցել, որ ուղղանկյուն եռանկյան ներքնաձիգի խորանարդը մեծ է էջերի խորանարդների գումարից։
- 179. Գոյություն ունի՞ արդյոք այնպիսի ուղղանկյուն եռանկյուն, որի էջերի երկարությունները կենտ թվեր են, իսկ ներքնաձիգի երկարությունը ամբողջ թիվ է։
- 180. ABCD քառանկյան անկյունագծերը հատվում են E կետում։ Յայտնի է, որ AB=CE, BE=AD, ∠AED=∠BAD։ Ապացուցել, որ BC>AD։

- 181. ABC եռանկյան մեջ տարված է BL կիսորդը։ Յայտնի է, որ BL=AB։ BL-ի շարունակության վրա K կետը վերցված է այնպես, որ \angle BAK+ \angle BAL=180 $^{\circ}$ ։ Ապացուցել, որ BK=BC։
- 182. ABC եռանկյան AB և BC կողմերի վրա D և E կետերը վերցված են այնպես, որ AD:DB=BE:EC=2 և ∠ACB=2∠DEB: Ապացուցել, որ ABC եռանկյունը հավասարասրուն է։
- 183. Ապացուցել, որ եթե ABC եռանկյան BC կողմի վրա M կետը վերցրած է այնպես, որ AC=BM, ապա AB>MC:
- 184. Ուռուցիկ 65-անկյուն բազմանկյան գագաթներում գրված են 2011-ին չգերազանցող բնական թվեր։ Ապացուցել, որ կգտնվեն երկու անկյունագծեր, որոնց գագաթներում գրված թվերի տարբերությունները հավասար են։
- 185. Գրատախտակին գրված են 1-ից 2011 բնական թվերը։ Յնարավո՞ր է արդյոք բոլոր այդ թվերի միջև դնելով «+» կամ «-» նշաններ` ստացված արտահայտության արժեքը ստանալ 2012։
- 186. Ապացուցել, որ հետևյալ հավասարումները ամբողջ թվերով լուծումներ չունեն. ա) $15x^2-7y^2=9$ p) $x^2-7y=9$:
- 187. Բացիկ գնելու համար Արամին պակասեց 11 դրամ, իսկ Կարենին՝ 1 դրամ։ Նրանք որոշեցին միասին գնել բացիկը, սակայն նրանց ունեցած գումարը նորից չբավարարեց։ Որքա՞ն արժե բացիկը։
- 188. Գտնել բոլոր եռանիշ թվերը, որոնց թվանշանների գումարը 11 անգամ փոքր է այդ թվերից։
- 189. Լուսաբացին Ա-ից Բ և Բ-ից Ա միաժամանակ դուրս եկան երկու հեծանվորդ։ Նրանք հանդիպեցին կեսօրին և առանց կանգնելու շարունակեցին ճանապարհը։ Նրանցից առաջինը Բ հասավ ժամը 16-ին, իսկ մյուսը Ա՝ ժամը 21-ին։ Առավոտյան, ո՞ր ժամին էին շարժվել հեծանվորդները։
- 190. ABC եռանկյան կողմերի վրա (դեպի դուրս) կառուցված են հավասարակողմ եռանկյուններ։ Ապացուցել, որ այդ եռանկյունների կենտրոնները (միջնագծերի հատման կետերը) հանդիսանում են հավասարակողմ եռանկյան գագաթներ։
- 191. Յնարավո՞ր է արդյոք 10x6 չափերի ուղղանկյունը տրոհել /կտրել/ 15 հատ 1x4 չափերի ուղղանկյունների։
- 192. 8x8 չափերի շախմատի տախտակի վրա ամենաշատը իրար չիարվածող քանի՞ ձի կարելի է դասավորել։
- 193. Ամենաշատը քանի՞ միատեսակ նվեր կարելի է պատրաստել 96 կոնֆետից և 36 խնձորից։
- 194. Գտնել 6x34y տեսքի բոլոր հնգանիշ թվերը, որոնք բաժանվում են 30-ի։
- 195. Գտնել $\overline{1xy}2\overline{z}$ տեսքի ամենամեծ հնգանիշ թիվը, որը բաժանվում է 45-ի։

- 196. Ապացուցել, որ եթե a>2>b, ապա տեղի ունի հետևյալ անհավասարությունը. $2a^2+ab^2+4b>2b^2+a^2b+4a$:
- 197. Գտնել այնպիսի բնական թիվ, որը 7-ով բազմապատկելիս ստացվում է բնական թվի քառակուսի, իսկ այդ նույն թիվը 17-ով բազմապատկելիս ստացվում է բնական թվի խորանարդ։
- 198. Թիմի 6 շախմատիստների միջին տարիքը 35 է։ Հիվանդության պատճառով նրանցից մեկը չմասնակցեց մրցաշարին։ Թիմի միջին տարիքը դարձավ 34։ Քանի՞ տարեկան է հիվանդացած շախմատիստը։
- 199. Պապս ինձանից 65 տարով է մեծ, իսկ հորիցս` 26 տարով։ Հայրս քանի՞ տարեկան էր, երբ ես ծնվեցի։
- 200. Իրար հետևից գրված են 7 թվեր այնպես, որ յուրաքաչյուր երեք հարևան թվերի արտադրյալը 48 է։ Առաջին թիվը 4 է։ Ի՞նչ թիվ է գրված 7-րդ տեղում։
- 201. Գտեք x և y թվերը, եթե $\{1-x\} \cap \{y+1\} = \{y-x\}$:
- 202. Գանել 43*2* տեսքի բոլոր այն հնգանիշ թվերը, որոնք բաժանվում են 36-ի։
- 203. Գտնել 2005** տեսքի վեցանիշ թվերը, որոնք բաժանվում են և՛ 9-ի և՛ 7-ի։
- 204. Գտնել 21 հայտարարով սովորական կոտորակ, որը գտնվի 3/8 և $5/12\,$ թվերի միջև:
- 205. 2007 բնական թվերի արտադրյալը 105 է, իսկ նրանց գումարը հավասար է 2043։ Գտնել այդ թվերից մեծագույնը։
- 206. x-ի ո՞ր արժեքների դեպքում 2x-3 երկանդամի արժեքները գտնվում են (-7;-1] բազմությունում։
- 207. x-ի ո°ր արժեքների դեպքում 2|x|+3 արտահայտության արժեքները գտնվում են [-1;5) միջակայքում։
- 208. Հաշվել 2-3+4-5+6-...+500-501։
- 209. 3^{18} ; 5^{12} և 8^9 թվերը դասավորել աճման կարգով։
- 210. Գտնել 36-ի բաժանվող ամենամեծ բնական թիվը, որի գրառման մեջ մեկական մասնակցում են 1-ից 9 բոլոր թվանշանները :
- 211. Երեք թվերի արտադրյալը 2000 է։ Առաջին երկու թվերը փոքրացրին 20%-ով, իսկ երրորդը՝ մեծացրին 30%-ով։ Ինչի՞ է հավասար ստացված թվերի արտադրյալը։
- 212. Կոմբայնը մեկ օրում հնձում է 12hա, իսկ հավաքում`20hա։ Կոմբայնը մեկ օրում որքա $^\circ$ ն մակերես կարող է և' հնձել և' հավաքել։

- 213. Ինչպե՞ս կփոխվի ուղղանկյան մակերեսը, եթե նրա երկարությունը մեծացնենք 30%-ով, իսկ լայնությունը փոքրացնենք 30%-ով։
- 214. Երկու տղաներից յուրաքանչյուրն ուներ դրամ։ Մեկ բաժակ արևածաղիկ գնելու համար տղաներից մեկին չէր բավարարում 20 դրամ, մյուսին՝ 2 դրամ։ Միացնելով ունեցած ողջ դրամը՝ տղաները նորից չկարողացան գնել այն։ Ի՞նչ արժե մեկ բաժակ արևածաղիկը։
- 215. 521 թիվն ունի հետևյալ հատկությունը. կամայական թվանշան իր հաջորդից մեծ է ամենաքիչը երկու անգամ։ Զրոյով չվերջացող բանի՞ եռանիշ թիվ կա, օժտված այդ հատկությունով։
- 216. Ապացուցել, որ ցանկացած ամբողջ a թվի դեպքում $(a^2+5a+5)^2-1$ թիվը բաժանվում է 24-ի:
- 217. Դիցուք a,b,c և d-ն կենտ բնական թվեր են։ Հնարավո՞ր է արդյոք,

np
$$\frac{1}{a} - \frac{1}{b} - \frac{1}{c} + \frac{1}{d} = 1$$
:

218. Պարզեցնել արտահայտությունը.

$$\sqrt{x^2-8x+16}+\sqrt{x^2-12x+36}$$
, then $4 \le x \le 6$:

- 219. Լուծել անհավասարումը. $\sqrt{12x+1} < 4\sqrt{2+5x}$:
- 220. ABC եռանկյան AA_1 և BB_1 կիսորդները հատվում են M կետում։ Գտեք ACM և BCM անկյունները, եթե $\angle AMB = 136^\circ$:
- 221. ABC եռանկյան մեջ CH -ը բարձրություն է։ Գանել AH –ն, եթե $\angle C=90^{\circ}$, AC=10 սմ, AB=20 սմ։
- 222. ABCD սեղանի մեջ AB = BC = CD = AD/2։ Գտնել սեղանի բութ անկյունը։
- 223. ABC եռանկյան AC կողմի վրա M կետն ընտրված է այնպես, որ AM:MC=7:4: Գտնել AO:OD հարաբերությունը, որտեղ O-ն AD միջնագծի և BM հատվածի հատման կետն է։
- 224. ABC հավասարասրուն եռանկյան A գագաթից տարված բարձրությունը AC հիմքի հետ կազմում է 45^{0} -ի անկյուն։ Գտեք B գագաթից տարված միջնագծի երկարությունը, եթե AC=12 սմ։
- 225. ABC հավասարասրուն սուրանկյուն եռանկյան AB և AC սրունքներին տարված բարձրությունները հատվում են M կետում։ Գտեք $\angle BMC$ -ն, եթե $\angle BAC$ =50 $^{\circ}$:

- 226. 45^{0} -ի հավասար A անկյան կողմերի վրա նշված են B և C կետերը, իսկ անկյան ներքին տիրույթում՝ D կետն այնպես, որ \angle ABD= 90^{0} , \angle ACD= 90^{0} : Գտեք BDC անկյունը:
- 227. ABC եռանկյան AK և BN բարձրություններն ընդգրկող ուղիղները հատվում են M կետում։ Գտեք \angle AMB-ն, եթե \angle A=40°, \angle B=30°:
- 228. a կողմով երկու քառակուսի ունեն մի ընդհանուր գագաթ, ընդ որում՝ նրանցից մեկի կողմը գտնվում է մյուսի անկյունագծի վրա։ Գտեք այդ քառակուսիների ընդհանուր մասի մակերեսը։
- 229. 5 ամ կողմով շեղանկյան փոքր անկյունագիծը 6ամ է։ Մեծ անկյունագիծն ի՞նչ երկարությամբ հատվածների է բաժանվում բութ անկյան գագաթից տարված բարձրությամբ։
- 230. 2 տարբեր շրջանագծերը հատվում են A և B կետերում, ընդ որում շրջանագծերի կենտրոնները գտնվում են AB ուղղի տարբեր կողմերում։ Ապացուցել, որ շրջանագծերի կենտրոններով անցնող ուղիղը կիսում է AB հատվածը և ուղղահայաց է նրան։
- 231. ABC եռանկյան AD միջնագծի վրա գտնվող M կետով և B գագաթով անցնող ուղիղը K կետում հատում է AC կողմը։ Գտեք AK:KC հարաբերությունը, եթե AM:MD=1:3:
- 232. ABC եռանկյան AB և BC կողմերի վրա համապատասխանաբար վերցվրած են M և N կետերն այնպես, որ AM=MB և BN:NC=1:3։ Եռանկյան BC կողմին տարված միջնագիծը հավասար է 10սմ։ Գտնել MN հատվածի երկարությունը։
- 233. ABC եռանկյան մեջ BD կիսորդն է, իսկ AB և BC կողմերից մեկը 6սմ է, մյուսը՝ 3սմ։ Գտնել AB և BC կողմերի երկարություները, եթե $\angle BDC > \angle BDA$:
- 234. B գագաթով ABC հավասարասրուն եռանկյան հիմքին առընթեր անկյունները 75° են, AM-ը կիսորդ է, BM=10 սմ։ Գտեք M կետի հեռավորությունը AC հիմքից։
- 235. Գանել հավասարասրուն սեղանի ներգծած շրջանագծի շառավիղը, եթե նրա պարագիծը 72սմ է, իսկ մեծ հիմքին առընթեր անկյունների գումարը՝ 60° :

ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ, ՑՈւՑՈւՄՆԵՐ, ԼՈւԾՈւՄՆԵՐ

1. 5640։ Ցուցում։ Նկատել, որ այդ թիվը պետք է բաժանվի 2-ի, 5-ի և 3-ի։ **2.** 5 դեպք: **3.** 98136: **4.** 50-ով: **5.** 16 և 27: **6.** 3 հատր 4 հավասար մասերի, իսկ 4 հատր 3 հավասար մասերի։ 7. Դիտարկել 3-ական մետաղադրամ։ **8.** ա) 2;4;5;7;8;10։ բ) –12;-2;0;2;4;6;8;18։ գ) –1;0;1;2։ **9.** Որոնք չեն բաժանվում 3-ի կամ 5-ի։ 10. Ոչ։ Ամեն մի թուղթը կտրատելիս թղթերի քանակն ավելացնում ենք 6-ով։ Քանի, որ սկզբում 7 թուղթ ունենք, ապա զանկացած պահի թոթերի քանակը կլինի 7+6ո տեսքի, սակայն 1998-ը բաժանվում է 6-ի։ 11. 202։ 12. Վերցնենք 8լ հեղուկ և դատարկենք 5 լիտրանոց ամանի մեջ: 5 լիտրանոց ամանը դատարկենք և նրա մեջ լցնենք 8 լիտրանոց ամանում մնացած 3լ հեղուկը։ Նորից 8 լիտրանոցով հեղուկ վերցնենք և նրանից դատարկենք 5 լիտրանոց ամանի մեջ՝ մինչև լիքը լցվելը։ 8 լիտրանոց ամանում կմնա 6լ հեղուկ։ **13.** Այո։ 1+(2+3+4)·(5+6)=100: **14.** 12: **15.** 250q.: **16.** 41: **17.** 300: **18.** 78: **19.** 4n, $n \in \mathbb{N}$: 20. Ως: $aaaa = a \cdot 1111 = a \cdot 11 \cdot 101$ snigh thyuhz thyni pwdwuwրար։ 21. 10-1=9+1։ 22. Բոլոր փամփուշտները տալ առաջին որսորդին, քանի որ նրանցից լուրաքանչյուրը կերել է 1 բաժակ բրնձի շիլա, այսինքն երրորդ որսորդը կերել է առաջին որսորդի 1 բաժակ բրնձի շիլան։ 23. 250-ր Անահիտին, 750-ր Գոհարին։ 24. 600։ 25. 12 տղա և 14 աղջիկ։ **26.** 25 դրամ։ **27.** 150։ **28.** 5: **29.** ա) 1/2-ը; բ) 1/3-ը։ **30.** 48։ **31.** 60։ **32.** 1/3: **33.** 9 կմ։ **34.** 1,5: **35.** Յուրաքանչյուրին հասավ տորքի 1/6 մասո։ 36. 1 օրում։ 37. 40։ 38. 1-ինը 60 ժ, 2-րդը 30 ժ, 3-րդը 15 ժ, միասին $8\frac{\pi}{7}$

ժամում։ 39, 90 վրկ։ 40, Ուշ։ 41, 25մ/վրկ, 200մ։ 42, 4կմ։ 43, 17 կմ։ 44, 4,5 ժամ։ 45. 135 և 27: 46. 31;62;93: 47. 45: 48. 8899 և 8900: 49. 21978: 50. Ng: 51. 24: 52. 6: 53. 5: 54. 22: 55. 5-nd: 56. 60: 57 2: 58 6: 59 53: 60. Բանան։ Ցուցում։ Ամեն օր բանանների քանակը կամ չի փոխվում, կամ պակասում է 2-ով: **61.** Ոչ: 1998=2·3·9·37: Քանի որ 37-ր պարզ թիվ է, ուստի որևէ թվի թվանշանների արտադրյալը չի կարող բաժանվել 37-ի։ 62. U>: Uın թվերի մեջ ևան 999 hwm կենտ edtn:Ուստh 1+2+...+1996+1997 գումարը կենտ թիվ է։ Երբ մաքրում ենք երկու ցույգ թիվ կամ երկու կենտ թիվ, ապա փոխարենը գրում ենք զույգ թիվ, իսկ երբ մաքրում ենք մի ցույգ և մի կենտ թիվ, ապա փոխարենը գրում ենք կենտ թիվ։ Յետևաբար, լուրաբանչյուր բայլից հետո մնացած թվերի գումարը կլինի կենտ։

63.

_64. Ոչ։ 1-ից մինչև 1997 թվերի գումարը կենտ է։ Եթե հնարավոր լիներ բաժանել, ապա յուրաքանչյուր խմբում թվերի գումարը կլիներ զույգ

(հավասար կլիներ այդ խմբի ամենամեծ թվի կրկնապատիկին), ուստի բոլոր թվերի գումարը նույնպես կլիներ ցույշ: 65. 43+97+61=201: Պարզ է, որ երկրորդ գումարելին 97-ն է, իսկ աջ մասում գրված է 300-ից փոքր թիվ։ Եթե 97-ին գումարենք երկու երկնիշ թիվ, ապա կստանանք 110-ից մեծ թիվ։ Ձախ մասի անհայտ գումարելիների վերջին թվանշանները պետք է լինեն 1 և 3 (9,7 և 5 լինել չեն կարող)։ Ուստի աջ մասում գրված է Դիտարկելով 13 և 91, 23 և 81, 33 և 71, 43 և 61, 53 և 51, 63 և 41, 73 և 31, 83 և 21, 93 և 11 ցույգերը, համոցվում ենք, որ խնդրի պայմաններին բավարարում է 43 և 61 գույգը։ 66. Ոչ։ Քանի որ նրանցից առաջինն ուղղանկյունների քանակն ավելացնում է 4-ով, իսկ երկրորդը՝ 8-ով։ Ուստի ցանկացած պահի ուղղանկյունների քանակը պետք է լինի 1+4ո $(n \in N)$ untuph, hul 1999=4n+3: **67.** Thomps U-G L P-G hudwight to հավասար միավորներ։ Եթե գոյություն չունենա այդպիսի Գ թիմ, ապա Ա-ն և Բ-ն զանկացած թիմի կամ երկուսն էլ հաղթել են, կամ երկուսն էլ պարտվել։ Ուստի նրանց հավաբած միավորները մյուս թիմերից կլինեն hավասար: Քանի որ կամ Ա-ն է հարթել Բ-ին, կամ Բ-ն է հարթել Ա-ին, ապա նրանք հավասար միավորներ ունենալ չէին կարող։ 68. 3: 69. 59: Ցուցում։ Նկատենք, որ եթե այդ թիվը ո-ն է, ապա ո+1-ը բաժանվում է 2,3,4,5 և 6 թվերից յուրաքանչյուրի վրա։ **70.** 5։ Ցուցում։ Տես նկարը։

թվերի բազմապատիկն է` ավելացրած 1։

74. Յավասար։ Քանի որ խմվել է 2 բաժակ հեղուկ։ **75.** $2k+1=(k+1)^2-k^2$ ։ 2001 = 3.667 = 3.23.29: Neumh win pyh pywūzwūūtnh **76.**Ns: արտադրյալը բաժանվում է 23-ի, որը պարզ թիվ է, իսկ միանիշ թվերի արտադրյալը 23-ի բաժանվել չի կարող։ 77. 10 րոպեում։ Պարզ է, որ 1 պոմպով 10 րոպեում արտամղվում է 1 տոննա ջուր։ Ուստի 25 պոմպերով 25 տոննա ջուրը կարտամղվի 10 րոպեում։ <u>78.</u> 30։ Գտեք 2, 3 և 5 թվերի րնդհանուր բազմապատիկները, որոնք փոքր են 70-ից։ Դրանք են 30 և 60 թվերը։ Սակայն 60-ը բաժանվում է 4-ի, ուստի զամբյուղում կա 30 նարինջ։ **79.** «Դու այ՞ս քաղաքից ես»-հարցին ճշմարտախոսների քաղաքում կստանանք «այո» պատասխան, իսկ ստախոսների քաղաքում՝

«nչ»։ <u>80.</u> 3:0, 0:0, 0:1։ <u>81.</u> $\frac{12}{13}$ ժ։ 1 ժամում երեքը միասին կլցնեն

ավազանի $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{13}{12}$ մասը։ Ուստի ամբողջ ավազանը կլցնեն $\frac{12}{13}$ ժ ժամում։

|--|


U	ፁ	ф	Դ
ф	Դ	Ц	ፁ
Դ	ф	ተ	U
Ŀ	IJ	Դ	q.

83. Բնական թիվը 14-ի բաժանելիս ստացվում են 14 տարբեր մնացորդներ։ 15 թվերի մեջ կգտնվեն երկուսը որոնք 14-ի բաժանելիս ստացվում է միևնույն մնացորդը։ Յետևաբար, դրանց տարբերությունը կբաժանվի 14-ի։

84. 40%-ով։ 85. 15 քառ.մ.։ Իրոք, վեց բանվորը երկու ժամում կշարեն 6 քառ.մ. պատ, հետևաբար, վեց բանվորը 1 ժամում կշարեն 3 քառ.մ. պատ։ Ուստի վեց բանվորը 5 ժամում կշարեն 5։3=15 քառ.մ. պատ։ 86. 37։ 87. 1 կամ 1 և 13։ Իրոք, եթե a թիվը 5n+6 և 8n+7 թվերի ընդհանուր բաժանարարն է, ապա a-ի վրա կբաժանվեն նաև 40n+48 և 40n+35 թվերը, հետևաբար նաև նրանց տարբերությունը։ Այսպիսով, քանի որ 40n+48 – (40n+35) =13, ուրեմն a-ն 13-ի բաժանարարն է։

88. $b^2=a^2-a^2+b^2=a^2-(a^2-b^2)=(a-b)k-(a-b)(a+b)=(a-b)(k-a-b)$: 89. ชน์คนทุกธน์ช գիտաժողովի ո մասնակիցներ մաթեմատիկներ են և տիրապետում են անգլերենին։ Այդ դեպքում մաթեմատիկների թիվը կլինի 4ո, իսկ անգլերենին տիրապետողների թիվը՝ 5n։ Ակնհայտ է, որ երբ n=0, ապա մաթեմատիկների և անգլերենին տիրապետողների քանակը նույնն է և հավասար է 0-ի։ Երբ n≠0, ապա 4n<5n, այսինքն անգլերենին տիրապետողները շատ են։ 90. 18։ Ակնհայտ է, որ այդպիսի բնական միանիշ թիվ չկա (a=2a, հետևաբար a=0)։ Պարզ է, որ այդպիսի եռանիշ թիվ նույնպես չկա։ Իրոք, ամենափոքր եռանիշ թիվը 100-ն է, իսկ ամենամեծ գումարը, որը կարող է ստացվել 2(9+9+9)=54-ն է։ Նման ձևով դժվար չէ նկատել, որ եռանիշից մեծ այդպիսի թիվ լինել չի կարող։ դեպքը, թիվր երկնիշ Դիտարկենք այն երբ է։ Կունենանք՝ ab = 2(a+b) կամ 10a+b=2a+b, որտեղից՝ b=8a, որի միակ ιπιόπιδο t a=1, b=8: **91.** Պետք t նկատել, որ խնդրի պահանջում tարգելվում քառակուսու տիրույթից դուրս գալը։ Տես նկարը։

92.12։ Դիցուք Տիգրանը կերել էր a կոնֆետ, իսկ Յասմիկը ստացել էր x կոնֆետ։ Յասմիկին մյուսները տվել էին 9x կոնֆետ, ուստի իրենց մոտ ևս մնացել էր 9x կոնֆետ։ 9x+9x+x+a=50, որտեղից` 19x+a=50։ Պարզ է, որ x<3 և $x\geq 2$, ուստի x=2։ Որտեղից` a=50-38=12։



93. Ոչ։ Նկատենք, որ x²+x=x(x+1) և 10y թվերը զույգ թվեր են, ուրեմն հավասարման ձախ մասը զույգ թիվ է, իսկ հավասարման աջ մասը կենտ թիվ է։ 95. 3։ 96. 25։ 97. 25 դրամ։ 98. 19 տղա և 11 աղջիկ։ 99. 3։ (703 թվի վերջին թվանշանը)։ 100. 704 էջ։ 101. 4995։ Նկատենք, որ 1-ից 9-ը

թվանշաններից յուրաքանչյուրը մասնակցում է ընդամենը երեք եռանիշ թվերի մեջ։ Ընդ որում մեկ անգամ որպես հարյուրավոր, մեկ անգամ որպես տասնավոր և մեկ անգամ որպես միավոր։ Ուստի կարող ենք գումարը ներկայացնել հետևյալ տեսքով. 111+222+...+999=111(1+2+...

...+9)=111.45=4995: **102.** $(x+y)^2 > 6,25$ y=0 y=Որտեղից՝ xy>1,125>1: **103.** Ոչ: Նույնիսկ 0,1,2,...,9 թվերի գումարը մեծ է 44-ից։ **104.** Նրանցից լուրաբանչյուրը կարող է ունենալ ամենաշատը 4 ծանոթ, ամենաքիչը՝ ոչ մի ծանոթ։ Սակայն, եթե մեկն ունի 4 ծանոթ, ապա ծանոթ չունեցող չկա։ Նրանց քանակը 5 է, իսկ հնարավոր է ծանոթների թանակի 4 տարբերակ՝ 4,3,2,1: Ուրեմն նրանցից գոնե երկուսը կունենան նույն քանակով ծանոթներ։ **105.** Դիցուք A-ն նրանցից մեկն է։ Պարց է, որ մնացած 5 հոգու մեջ A-ն կամ ունի գոնե 3 ծանոթ, կամ ունի գոնե 3 անծանոթ։ Երկու դեպքում էլ ապացույցը կատարվում է միևնույն եղանակով: ենթադրենք A-ն ճանաչում է B-ին, C-ին և D-ին: Եթե B,C,D եռյակում որևէ երկուսը իրար ճանաչում են, ապա A-ի հետ նրանք կկազմեն իրար ճանաչող եռյակ, իսկ եթե B,C,D եռյակում ոչ մի զույգ իրար չի ճանաչում, ուրեմն B-ն,C-ն և D-ն կկազմեն իրար չճանաչող եռյակ։ 106. 6/11 ամսում։ Ցուցում։ Սկզբում պարզել, թե երեք ամսում նրանք միասին քանի դեց խոտ կուտեն։ 107. Կիրակի։ Յունվարի 1-ր, 2-ր և 3-ր երկուշաբթի չեն եղել, այլապես կլիներ 5 երկուշաբթի։ Նույն ձևով՝ 1-ր, 2-ր, 3-ր ուրբաթ չեն եղել, որտեղից հետևում է, որ 4-ր, 5-ր, 6-ր երկուշաբթի չեն եղել։ Այսպիսով, հունվարի 1-ից 6-ը երկուշաբթի չի եղել, երկուշաբթին հունվարի 7-ն է։ 108. Ոչ։ Ամեն գրատախտակին գրված չորս թվերի գումարը կենտ է։ 109. Ոչ։ Ամեն անգամ հնարավոր է հետևյալ երեք դեպքերից մեկը, շրջում ենք երկու շրջված բաժակ, երկու ուղիղ բաժակ, մեկ ուղիղ և մեկ շրջված բաժակ: Ամեն քայլից հետո բերանը ներքև շրջված բաժակների քանակը մնում է կենտ։ 110. 1716 դրամ։ 111 Յավասար են։ 112. 500 դրամ։ 113. 25։ **114.** 21: **115.** 10%-ով: **116.** 10 վրկ: **117.** 37 և 73: **118.** 27: **119.** 6889: **120.**126: **121.** 25%: **122.** $n^3+11n=n(n+1)(n+2)+3n(3-n)$: n(n+1)(n+2)-nորպես երեք հաջորդական թվերի արտադրյալ բաժանվում է 6-ի։ Śn(3-n) արտադրյալում կամ ո-ն է զույգ, կամ (3-ո)-ը, ուստի 3ո(3-ո)-ը նույնպես բաժանվում է 6-ի։ 123. $A=n^2+n+1=n(n+1)+1$ ։ Պարզ է, որ n(n+1)արտադրյալը զույգ է, ուստի A-ն կենտ է։ Նկատենք, որ $n^2 < n^2 + n + 1 < (n+1)^2$ ։ Ուրեմն A-ն լրիվ քառակուսի չէ: 124. 7կգ։ 125. 35։ 126. Ցուցում։ Եթե n^2 -ն բաժանվում է 3-ի, ուրեմն n^2 -ն բաժանվում է 9-ի։ **127.** Ցուցում։ 10ⁿ-4= $\underline{99...9}$ 6։ <u>**128.</u> Ցուցում։ Թվի թվանշանների տարբերությունը չի**</u>

կարող լինել 11։ <u>129.</u> <u>S</u>ես 69-րդ խնդրի ցուցումը։ <u>130.</u> 19։ Դիցուք $\overline{ab}+b^2=n^2$, որտեղից $\overline{ab}=(n-b)(n+b)$ ։ Քանի որ \overline{ab} -ն պարզ թիվ է, ուրեմն n-b=1 կամ n=b+1։ 10 $a+b+b^2=(b+1)^2$, որտեղից՝ 10 a=b+1,

ուրեմն b=9 և a=1: **131.** 13: Ցուցում։ Եթե 8n+7 և 5n+6 թվերը բաժանվում են d-ի, ապա նրանց տարբերությունը՝ 3n+1-ր նույնպես կբաժանվի d-ի։ Այդպես շարունակ։ 132. Տես 58-րդ խնդրի ցուցումը։ 133. Պետք է կառուցել Ա գյուղում։ <u>134.</u> Սկսողը պետք է վերցնի կույտերից մեկն ամբողջովին, այնուհետև, հետևելով երկրորդ խաղագողին՝ ամեն անգամ հավասարեցնի երկու կույտերի քարերի թիվը։ 135. Ոչ։ Անկյունային վանդակները միևնույն գույնի են, իսկ դոմինոյի 31 քարերով կարելի է ծածկել 31 սև և 31 սպիտակ վանդակ։ 136. 34։ Ցուցում։ խնդիրը լուծել դիտարկելով վերջից՝ սկիզբ։ 137. 2376։ Ցուցում։ Յուրաքանչյուր քաղաքից հետո վաճառականի մոտ մնացել է իր ունեզվածքի 1/6-ի չափ։ 138. 8։ Քանի որ մեծ խոտհարքը հնձել են կես օր հնձվորների ամբողջ խումբը և կես օր խմբի կեսը, ապա խմբի կեսը կես օրում հնձել է այդ խոտհարքի 1/3 մասր։ Նույն ժամանակում հնձվորների երկրորդ կեսը, փոքր խոտհարքում, նույնպես հնձել է 1/3 մասը։ Սակայն փոքր խոտհարքը 1/2 մաս էր, ուրեմն փոքր խոտհարքում երկրորդ օրվա համար մնացել էր հնձելու 1/2-1/3=1/6 մասը, որը հնձել է մեկ հնձվոր՝ ամբողջ օրվա ընթացքում։ Այսպիսով, մեկ ինձվորը մեկ օրում ինձում է մեծ խոտհարքի 1/6 մասը։ Առաջին օրը հնձել են 1+1/3=4/3=8/6 մասը։ Յետևաբար, եղել է 8 հնձվոր։ **139**. 20։ *1-ին եղանակ։* Մարգագետնում եղած խոտի քանակն ընդունենք 1 միավոր, իսկ մեկ օրում աճած խոտի քանակը՝ y: Դետևաբար, 24 օրում 70 կովերի նախիրը կերել է 1+24y խոտ։

Մեկ օրում մեկ կովի կերածը կլինի $\frac{1+24y}{24\cdot 70}$ ։ Նույն ձևով՝ 60 օրում 30

կովերի նախիրը կերել է 1+60y, ուստի մեկ օրում մեկ կովի կերածը կլինի $\frac{1+60y}{60\cdot 30}$ ։ Կունենանք $\frac{1+24y}{24\cdot 70} = \frac{1+60y}{60\cdot 30}$, որտեղից՝ y= $\frac{1}{480}$ ։ Ուրեմն մեկ

կովը մեկ օրում ուտում է $\frac{1+24y}{24\cdot 70} = \frac{1}{1600}$ մասը։ Ենթադրենք 96 օրում

մարգագետնի ամբողջ խոտը կարող է ուտել x կով։ Այդ դեպքում

$$\frac{1+96\cdot\frac{1}{480}}{96\cdot x}=\frac{1}{1600}$$
, որտեղից՝ x=20։ 2-րդ եղանակ։ Այժմ խնդիրը

լուծենք առանց փոփոխական ներմուծելու։ Ենթադրենք 1 կովը մեկ օրում ուտում է 1 բաժին խոտ։ 24 օրում 70 կովը կուտի 24·70=1680 բաժին, որի մեջ մտնում է մարգագետնում եղած սկզբնական խոտի պաշարը և 24 օրում աճած խոտը։ 60 օրում 30 կովը կուտի 60·30=1800 բաժին։ Ուստի 1800-1600=120 բաժինը 60-24=36 օրում աճած խոտն է։ Ուրեմն 24 օրում

աճած խոտը կլինի $\frac{120}{36} \cdot 24 = 80\,$ բաժին։ <code>¬ետևաբար</code>, խոտի սկզբնական

քանակը եղել է 1680-80=1600 բաժին, իսկ 96 օրում աճած խոտը կլինի $\frac{120}{36} \cdot 96 = 320$ բաժին։ Այսպիսով, 96 օրում կովերը կերել են

1600+320=1920 բաժին, ուստի 1 օրում կերել են 1920:96=20 բաժին: Յետևաբար, եղել է 20 կով: **140.** 7 որդի, 49000 ռուբլի։ Քանի որ բոլոր տղաները ստացել են հավասար գումար, ապա ամեն հաջորդ մնացորդի 1/8 մասը 1000 ռուբլով թիչ է, թան նախորդ մնացորդի 1/8 մասը։ Ուստի ամեն հաջորդ մնացորդ 8000 ռուբլով պակաս է նախորդ մնացորդից։ Փոքր տղան ստանալով մի քանի հացար ռուբլի, պետք է ստանար նաև մնացորդի 1/8 մասը։ Սակայն այդ մնացորդը չի եղել, հակառակ դեպքում ամբողջ գումարը չէր բաժանվի և կմնար վերջին մնացորդի 7/8 մասը։ Քանի որ վերջին մնացորդը 0 ռուբլի է, ուրեմն նախորդ մնացորդը 8000 ռուբլի է եղել։ Յետևաբար, նախավերջի տղան ստացել է այդ մնացորդի 1/8 մասը՝ 1000 ռուբլի, իսկ մնացած 7000 ռուբլին ստացել է փոքր տղան: Ուրեմն տղաների թիվը 7 է, իսկ ամեն մեկը ստացել է 7000 ռուբլի։ 141. 5 տղամարդ, 1 կին, 6 երեխա։ Ցուցում։ Նկատենք, որ տղամարդկանց քանակը 6-ից քիչ է և 3-ից շատ։ Տղամարդկանց քանակը 4 չէ, քանի որ մնացած 4 հացը 8 հոգով չէին կարող տանել։ <u>142.</u> Լճով գնալիս։ *1-ին եղանակ։* Նավակը գետով Տկմ անցնելու համար հոսանքի ուղղությամբ գնալիս ավելի քիչ ժամանակ կծախսի, քան հոսանքի հակառակ ուղղությամբ գնայիս։ Այսպիսով, գետի հոսանքը նավակին օգնում է ավելի քիչ ժամանակամիջոցում, քան խանգարում։ *2-րդ եղանակ։* Դիցուք նավակի սեփական արագությունը хկմ/ժ է, իսկ գետի հոսանքի արագությունը` yկմ/ժ: $t_{abm}=S/(x+y)+S/(x-y)=2Sx/(x^2-y^2)>2Sx/x^2=2S/x=t_ihd$: 143. Սկյուռիկի։ Ն+Ս=Ո+Տ, ն+ս+n=Տ, Ն+ն=Ս+ս+Ո+ո։ Յետևաբար, U+Ն+ն=2U+Ո+Տ-ն, որտեղից՝ ն=2U-ն։ Ուրեմն 2ն=2U, ն=U: **144.** 3000 դինար։ Ենթադրենք Ալի-Բաբան վերցրել է x կգ ոսկի և y կգ ադամանդ։ Չետևաբար, նա կարող է ստանալ 20x+60v ռինար։ Պարզ է, որ x+v≤100: Նկատենք, որ 1կգ ոսկին զբաղեցնում է սնդուկի 1/200 մասո, իսկ 1կգ ադամանդը՝ 1/40 մասը։ Ուրեմն նրա տարած գանձր կզբաղեցնի սնդուկի x/200+y/40 մասր: Պարզ է, որ x/200+y/40≤1: Այսպիսով, x+5y≤200 և Գումարելով այս անիավասարությունները x+v≤100: կստանանք` $2x+6y \le 300$, որտեղից՝ $20x+60y \le 3000$ ։ Յավասարության դեպքը տեղի ունի, երբ նշված անհավասարություններում տեղի ունեն հավասարության դեպքերը։ Լուծելով x+y=100 և x+5y=200 երկու հավասարումների համակարգը կստանանք՝ x=75 և y=25։ Ալի-Բաբան կարող է ստանալ դինար, եթե վերցնի 75կգ ոսկի և 25կգ ադամանդ։ 3000 $(8+9)\cdot5+15=100$; $(2)\cdot103\cdot5=515$; $(3)\cdot950+59=1009$; $(3)\cdot150+100+250=500$; Lուծենք ո)-ն։ Քանի որ c+c+c-ն ավարտվում է c-ով, ուրեմն c=5 կամ c=0:

c=5-ի դեպքում կունենանք b+5+b-ն ավարտվում է 4-ով, այսինքն b+b-ն ավարտվում է 9-ով, որը հնարավոր չէ։ Ուրեմն c=0։ Պարզ է, որ b=0, ուստի a+a+d=4: Որտեղից՝ a=1, d=2: <u>146.</u> m=3; n=9: Ցուցում։ $3^{m}+54=27(3^{m-3}+2)$: Դիտարկել m>3 և m≤3 դեպքերը։ **147.** z=-(x+y)։ Տեղադրել Ցուզում։ երկրորդ հավասաոման մեջ։ 149. $(n-1)n(n+1)(n+2)+1=n^4+2n^3-n^2-2n+1=(n^2+n-1)^2$: $n^4 - n^2 - 2n - 1 = (n^4 - 3n^2 + 1) + (2n^2 - 2n - 2) = (n^4 - 3n^2 + 1) + 2(n(n - 1) - 1) > n^4 - 3n^2 + 1,$ քանի որ n>1 դեպքում ո(n-1)>1–ից։ **151.** Ցուցում։ Օգտվել այն փաստից, որ եթե p>3 պարզ թիվ է, ապա p-ն ունի կամ 6k+1, կամ 6k-1 տեսքը։ **152.** 97: **153.** ա) գրաֆիկը (1/2;-1/2) կետն է,բ) գրաֆիկը (-1/2;1/2) կետն է: $2x^2+\overline{2y^2}-2x+2y+1=2(x^2-x+1/4)+2(y^2+y+1/4)=2(x-1/2)^2+2(y+1/2)^2$: 154. 18 L 37: Ցուցում: $aaa = a \cdot 111 = a \cdot 3 \cdot 37$: 3a + 37-ը պետք է լինի երկնիշ համասեռ թիվ, ուստի 3a+37-ը պետք է բաժանվի 11-ի։ 155. 5 թիմ, 2 միավոր։ Ցուցում։ Նկատենք, որ եթե մասնակցել է ո թիմ, ապա խաղացվել է n(n-1)/2 խաղ։ Ուրեմն եղել է ընդամենը n(n-1) միավոր։ Եթե նույնիսկ չորրորդ տեղից սկսած բոլոր թիմերն ունենան 3 միավոր, ապա luunwadh 15+3(n-3): Uuwhund. 15≤n(n-1)≤15+3(n-3): Nnuntnha` n=5: **156**. Ցուցում։ Ապացուցել, որ 10ⁿ+8-ը բաժանվում է 9-ի։ <u>157.</u> Ցուցում։ $\overline{3^{4n}}$ -1=(3⁴)ⁿ-1=81ⁿ-1: **158.** Snignių: 9²ⁿ+14=(9²)ⁿ+14=81ⁿ+14: **159.** Snignių: mq+np=mq-pq+pq+mn-mn+np=q(m-p)+mn+pq-n(m-p):

160. Ցուցում։ Ցույց տալ, որ abc - cba –ն բաժանվում է 11-ի։ 161. Ցուցում։ $x^2+2y^2+2xy+6y+10=(x+y)^2+(y+3)^2+1$ ։ 162. Ցուցում։ Անհավասարությունների երկու կողմերը բազմապատկել 2-ով, աջ մասը տեղափոխել ձախ կողմ և ներկայացնել երկանդամների քառակուսիների գումարի տեսքով։ 163. ա) $a^2b+ab^2+b^2c+bc^2+ac^2+a^2c-2abc-2abc-2abc-2abc=b(a-c)^2+ +a(b-c)^2+c(a-b)^2\ge0$ ։ p) $a^3+a^3+b^3+b^3+c^3+a^3-a^2b-ab^2-b^2c-bc^2-a^2c-ac^2=a^3-2a^2b+ +ab^2+b^3-2ab^2+a^2b+a^3-2a^2c+ac^2+c^3-2ac^2+a^2c+b^3-2b^2c+bc^2+c^3-2bc^2+b^2c= =a(a-b)^2+b(b-a)^2+a(a-c)^2+c(c-a)^2+b(b-c)^2+c(c-b)^2\ge0$ ։ 164. 180^0 ։ 165. Ոչ։ 166. Ցուցում։ Անկյան կողմերից մեկի վրա վերցնել կետ և այդ կետով տանել մյուս կողմին զուգահեռ։

՝ <u>167.՝</u> Զրիորը պետք է փորել AC և BD լարերի հատման կետում։ Ցուցում։ Դիտարկել որևէ M կետ և ցույց տալ, որ AM+BM+CM+DM>AC+BD։


B M C 168. Վեցանկյան յուրաքանչյուր գագաթից դուրս են գալիս 5 անկյունագիծ և կող, հետևաբար, այդ 5 հատվածներից գոնե 3-ը կարմիր են, կամ գոնե 3-ը կապույտ։ Ենթադրենք վեցանկյան A գագաթից դուրս եկող AB, AC, AD հատվածները կարմիր են։ Եթե BC, CD և BD հատվածները կապույտ են, ապա կունենանք BCD եռանկյունը, որի բոլոր կողմերը միևնույն գույնի են։ Իսկ եթե BC, CD և BD հատվածներից մեկը կարմիր է, ապա այն AB, AC և AD հատվածներից որևէ երկուսի հետ կկազմի եռանկյուն, որի բոլոր կողմերը

կլինեն կարմիր։ <u>169.</u> Ցուցում։ Անկյան ներքին տիրույթում տանել նրա կողմերին զուգահեռ և նրանցից հավասար հեռացված երկու ուղիղներ այնպես, որ նրանք հատվեն։ Կառուցել այդ ուղիղներով կազմված անկյան կիսորդը և ապացուցել, որ այն կհանդիսանա կիսորդ նաև տրված անկյան համար։ <u>170.</u> 90°։ Պարզ է, որ AB=BE։ ABC և EBC

եռանկյունների համար գրենք կիսորդի հատկությունը. $\frac{AE}{EC} = \frac{AB}{BC}$ և

$$rac{EM}{MC}=rac{BE}{BC}$$
 ։ Դետևաբար, $rac{AE}{EC}=rac{EM}{MC}$, կամ $rac{2a}{2a+2b}=rac{b}{2a+b}$ ։Որտեղից՝ $b=a\sqrt{2}$ ։ DBM եռանկյան մեջ գրենք

կիսորդի հատկությունը. $\frac{a}{b} = \frac{BD}{BM}$,




որտեղից`
$$\frac{BD}{BM}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$
։ Ուստի \angle BMD=45 $^{\circ}$, հետևաբար, \angle DBM=45 $^{\circ}$ և

∠ABC=90°: 171. Ցուցում։ Նախապես ցույց տալ, որ ցանկացած ABC եռանյուն ամբողջովին ծածկվում է երկու շրջանագծերով, որոնց համար տրամագիծ են հանդիսանում եռանկյան երկու կողմերը։ Դիցուք BH⊥AC։ Պարզ է, որ AB և BC տրամագծերով շրջանագծերը հատվում են H կետում, հետևաբար, ծածկում են ABC եռանկյունը։ 172. 3։ Ցուցում։ Յայտնի է, որ ուռուցիկ բազմանկյան յուրաքանչյուր գագաթի մոտ մեկական վերցրած արտաքին անկյունների գումարը 360° է։ 173. Յնգանկյան։ Ցուցում։ ո-անկյուն բազմանկյունն ունի ո(n-3)/2 հատ անկյունագիծ։ 174. Ոչ։ Ենթադրենք այդ ուղ-

ասկյունագրծ:
$$\frac{174}{174}$$
 ոչ: Եսթադրեսք այդ ուղ-
ղանկյունները նման են: Ուրեմն $\frac{2a+x}{x} = \frac{2a+y}{y}$,

որտեղից կստանանք` x = y: **175.** 36° , 36° , 108° :

Քանի որ AO=OC, ուստի O₁O-ն AC-ի միջնուղղահայացն է։ ∃ետևաբար,




O₁A=O₁C և ∠O₁AC=∠O₁CA, ուստի ∠BAC=∠BCA: Այսպիսով, ABC եռանկյունը հավասարասրուն է: Քանի որ O₁H=OH, ուստի ∠O₁AH=∠OAH=∠BAO₁: Սակայն AO=OB, ուրեմն ∠ABO=∠BAO: ∠BOA=180⁰-∠ABO-∠BAO=180⁰-6·∠HAO:

Մյուս կողմից` ∠BOA=90⁰-∠HAO: Յետևաբար, 180⁰-6·∠HAO=90⁰-∠HAO: Որտեղից` ∠HAO=18⁰, ∠BAC=36⁰ և ∠ABC=108⁰:

<u>176.</u> Ցուցում։ Օ կետից տանենք AC-ին OD ուղղահայացը։ Քանի որ OD=AD=DC=BD, ապա D կետը ABCO քառանկյանն արտագծած շրջանագծի կենտրոնն է։ AO և OC աղեղները հավասար են, հետևաբար \angle ABO= \angle CBO։ <u>177.</u> 45 $^{\circ}$, 45 $^{\circ}$, 90 $^{\circ}$ ։ Դիցուք a \leq ha և b \leq hb։ Պարզ է, որ ha \leq b և hb \leq a։ Այսպիսով, a \leq ha \leq b \leq hb այսինքն՝ a \leq hb։ Սակայն hb \leq a, ուրեմն a=ha=b=hb։ Եռանկյունը հավասարասրուն ողղանկյուն եռանկյուն է։ <u>178.</u> Իրոք։ c 2 =a 2 +b 2 , ուրեմն c 3 =a 2 c+b 2 c>a 3 +b 3 : <u>179.</u> Ոչ։ Ցուցում։ Օգտվել այն փաստից, որ ամբողջ թվի քառակուսին 4-ի բաժանելիս մնացորդում ստացվում է 0 կամ 1: <u>180.</u> Ակնհայտ է, որ Δ $BEC=\Delta BAD$: Յետևաբար,

BC=BD=BE+ED=AD+ED>AD։ <u>181.</u> Քանի, որ BL=AB, ուրեմն



 $\angle BAL = \angle BLA$: Ըստ պայմանի $\angle BAL + \angle BAK = 180^{0}$, սակայն $\angle BLA + \angle BLC = 180^{0}$, ուստի $\angle BAK = \angle BLC$: Դետևաբար,

 $\Delta BAK = \Delta BLC$ ըստ եռանկյունների հավասարության երկրորդ հայտանիշի։ Որտեղից՝ BC=BK: **182.** C կետից տանել DE-ին ցուցահեռ

CF հատվածը, որտեղ F-ր AB-ի հետ հատման կետն է։ Յամոզվել, որ CF-ր ABC եռանկյան մեջ և կիսորդ է, և միջնագիծ։ **184.** Անկյունագծերի գագաթներում գրված թվերի տարբերությունները կարող են լինել 0-ից մինչև 2010, ընդամենը՝ 2011 հնարավոր դեպք։ Ուռուցիկ 65-անկյուն ունի 65-62:2=2015 բազմանևյունն անևյունագիծ (ınınwpwūsının գագաթից դուրս է գալիս 62 անկլունագիծ, իսկ լուրաքանչյուր անկյունագիծը այդ հաշվարկում հաշվվել է երկու անգամ)։ Քանի որ անկյունագծերի քանակը ավելի է, քան տարբերությունների հնարավոր դեպքերը, ապա ինչ-որ անկյունագծերի տարբերությունները կկրկնվեն։ **185.** Ոչ։ Գրված են 1005 հատ կենտ թվեր, իսկ կենտ հատ կենտ թվերի գումարը կամ տարբերությունը կենտ թիվ է։ 186. ա) օգտվել 3-ի բաժանելության հայտանիշից։ բ) Նկատենք, որ x²-3-ր 7-ի չի բաժանվում։ Ամբողջ թվի քառակուսին 7-ի բաժանելիս ստացվում է 0, 1, 2, 4 մնացորդ։

<u>187.</u> 11 դրամ։ <u>188.</u> 198։ <u>189.</u> ժամը 6-ին։ Ա $^{-}$ Տ $^{9y}_{tx}$ ss 1 12^{00} Տ 4x $_{ty}$ S 8 Բ ։

Եթե Ա-ից դուրս եկող հեծանվորդի արագությունը նշանակենք x կմ/ժ,

իսկ Բ-ից դուրս եկողինը` y կմ/ժ, ապա կունենանք 9y=tx և 4x=ty: Որտեղից կստանանք $t^2=36$, ուստի t=6: 191. Ոչ։ Ուղղանկյան վանդակները ներկենք 1, 2, 3 և 4 գույներով այնպես, ինչպես ցույց է տրված նկարում։

1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
4	1	2	3	4	1	2	3	4	1
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
2	3	4	1	2	ფ	4	1	2	3

1x4 չափերի ուղղանկյան ցանկացած դասավորության դեպքում կծածկվեն բոլոր չորս գույներից 1-ական։ Յետևաբար, եթե հնարավոր լիներ ուղղանկյունը տրոհել, ապա յուրաքանչյուր գույնից կծածկվեր 15-ական։ Սակայն 1 և 3 գույներից ունենք 15-ական, 2 գույնից՝ 16, իսկ 4 գույնից՝ 14։ 192. 32։ Սպիտակ վանդակում գտնվող ձին հարվածում է միայն սև վանդակներում գտնվող ձիերին։ Յետևաբար, 32 սպիտակ վանդակներում դասավորված ձիերը իրար չեն հարվածում։ Եթե փորձենք տեղադրել 33-րդ ձին, ապա այն կգտնվի սև վանդակում, ուստի կհարվածի սպիտակ վանդակներում գտնվող ձիերից մի քանիսին։

193. 12: 194. 62340, 65340, 68340: 195. 19620: 197. 17 · 17 · 7 · 7 · 7 = 99127: 198. 40: 199. 39: 200. 4: 201. x=-1, y=1: 202. 43020, 43920, 43524, 43128: 203. 200529, 200592: Ցուցում։ Այդ թիվը պետք է բաժանվի 63-ի։ 2005**=200500+**=63 · 3182+34+**: Հետևաբար, 34+**-ը պետք է բաժանվի

63-ի։ Ուստի **-ը կամ 29 է, կամ 92։ $\frac{8}{21}$ ։ Ցուցում։ 8-ի, 12-ի և 21-ի

ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը 168-ն է։ Դիտարկել այդ կոտորակները 168 հայտարարով։ 205. 35։ 206. (-2;1] ։ 207. (-1;1) ։ 208. -250։ 209. 8 9 , 5 12 , 3 18 ։ Ցուցում։ Երկու թվերը համեմատելու համար դրանք ներկայացրեք միևնույն աստիձանի տեսքով։ Օրինակ. 5 12 =(5 2) 6 =25 6 , 3 18 =(3 3) 6 =27 6 ։ Քանի որ 25 6 <27 6 , հետևաբար, 5 12 <3 18 : 210. 987654312։ 211. 1664։ 212. 7,5 հա։ 213. Կփոքրանա 9%-ով։ 214. 21 դրամ։ 215. 14։ 216. Ցուցում։ 4 հաջորդական թվերի արտադրյալը բաժանվում է 24-ի։ 217. Ոչ։ Ցուցում։ Հավասարության երկու մասերը բազմապատկել abcd

pųnų: **218.** 2: **219.** $\left[-\frac{1}{12};+\infty\right)$: **220.** 46°, 46°: **221.** 5uú: **222.** 120°: **223.**

7:2։ Ցուցում։ D կետից տանենք AC-ին զուգահեռ ուղիղ։ Այդ ուղղի և BM-ի հատման կետը նշանակենք E-ով։ Դիտարկենք EDO և AMO եռանկյունները։ **224.** 6սմ։ **225.** 130º։ **226.** 135º։ **227.** 70º։ **228.**

$$a^2 \left(\sqrt{2} - 1 \right)$$
։ **229.** $1\frac{3}{4}$ ամ և $6\frac{1}{4}$ ամ։ **231.** 1:6։ Ցուցում։ D կետից տանենք

AC-ին զուգահեռ ուղիղ։ Այդ ուղղի և BK-ի հատման կետը նշանակենք E-ով։ Դիտարկենք DEM և AKM եռանկյունները։ **232.** 5սմ։ **233.** BC=6սմ, AB=3սմ։ **234.** 5սմ։ **235.** 4,5սմ։

Դպրոցի ընդունելության քննությունների տարբերակներ

2001թ. <u>7-րդ դասարան</u>

1. Կատարել գործողությունները.

$$(7\frac{1}{3} - 8\frac{1}{6}) : (5\frac{1}{2} - 1\frac{1}{3}) + 2\frac{1}{3} \cdot 1\frac{1}{5} :$$

- 3. C կետը բաժանում է AB հատվածը AC և CB հատվածների այնպես, ինչպես 3:4։ Գտեք այդ հատվածների երկարությունները, եթե AB հատվածի երկարությունը 84սմ է։
- 4. Գտնել 7x04y տեսքի բոլոր հնգանիշ թվերը, որոնք բաժանվում են 15-ի։
- 5. Կաթից ստացվում է 20% սերուցք, իսկ սերուցքից` 18% կարագ։ Որքա՞ն կարագ կստացվի 50կգ կաթից։
- 6. Մի քաղաքից մյուսը միաժամանակ մեկնեցին երկու մեքենաներ։ Առաջինի արագությունը 75կմ/ժ էր, երկրորդինը` 50կմ/ժ։ Երբ առաջին մեքենան հասավ մյուս քաղաք, երկրորդին մնում էր անցնելու կես ժամվա ճանապարհ։ Գտեք քաղաքների հեռավորությունը։
- 7. Մի տրակտորը կարող է վարել դաշտը 12 օրում, իսկ մյուսը՝ 9 օրում։ Առաջին տրակտորն աշխատեց 2 օր, իսկ երկրորդը՝ 3 օր։ Քանի՞ օրում կարող է վարել դաշտի մնացած մասը առաջին տրակտորը։
- 8. 1-ից 7 թվերը տեղադրել շրջանակներում այնպես, որ յուրաքանչյուր ուղղի վրա գըտնվող երեք թվերի գումարը հավասար լինի 12-ի։

<u>8-րդ դասարան</u>


1. Կատարել գործողությունները.

$$\frac{\left(3,4+1\frac{5}{7}\right)\cdot11\frac{2}{3}}{1\frac{2}{9}-1\frac{1}{18}}-\frac{\left(10,75-1\frac{5}{6}\right)\cdot6}{\left(5\frac{3}{20}-4,25\right)\cdot1\frac{1}{9}}:$$

- 2. Մի թիվ մեծացրել են 25%-ով։ Քանի՞ տոկոսով պետք է փոքրացնեն ստացված թիվը, որպեսզի նորից ստացվի սկզբնական թիվը։
- 3. Գտնել 6xy5z տեսքի ամենափոքր հնգանիչ թիվը, որը բաժանվում է 6-ի։
- 4. Շոգենավի սեփական արագությունը հարաբերում է հոսանքի արագությանն այնպես, ինչպես 36։5-ին։ Շոգենավը հոսանքի ուղղությամբ շարժվեց 5 ժամ 10 րոպե։ Որքա՞ն ժամանակ է պետք նրան ետ վերադառնալու համար։
- 5. AB հիմքով ABC հավասարասրուն եռանկյան AC սրունքի միջնուղղահայացը BC կողմը հատում է M կետում։ Գտեք \angle MAB-ն, եթե \angle ACB= 40° :
- 6. MOP անկյան արտաքին տիրույթում տարված են MT և PK զուգահեռ ճառագայթները։ Գտեք \angle MOP-ն, եթե \angle OMT=15°, իսկ \angle OPK=31°:
- 7. Տրակտորը կարող է մեկ ժամում կատարել երեք բանվորի 8-ժամյա աշխատանք։ Որոշ աշխատանք 6 ժամում կատարելու համար անհրաժեշտ էր 18 բանվոր։

Որքա[°]ն ժամանակում կկատարեն՝ այդ աշխատանքը երկու տրակտորը։

8. Պատկերը կազմված է վեց քառակուսիներից։ Գտնել A գագաթ ունեցող քառակուսու կողմը, եթե ամենափոքր քառակուսու կողմը 1սմ է։



9-րդ դասարան

1. Պարզեցնել արտահայտությունը.

$$\frac{a^2 + ab}{a^2 - 5a - b^2 + 5b} \cdot \frac{a^2 - b^2 + 25 - 10a}{a^2 - b^2} :$$

- 2. 200գ 30%-անոց սպիրտի լուծույթից դատարկեցին որոշ քանակությամբ լուծույթ և փոխարենը լցրեցին նույն կշռով 80%-անոց լուծույթ։ Ստացվեց 50%-անոց լուծույթ։ Քանի՞ գրամ լուծույթ դատարկեցին։
 - 3. Լուծել անհավասարումների համակարգը.

$$\begin{cases} \frac{x}{2} - \frac{7}{4} > \frac{5x}{2} - \frac{7}{8} \\ \frac{2x+1}{4} < 5 - \frac{1-2x}{3} \end{cases}$$

4. Ապացուցել անհավասարությունը.

$$a^4-2a+1\geq 2a^2(a-1)$$
:

- 5. Շեղանկյան մակերեսը 540սմ² է, իսկ անկյունագծերից մեկը` 4,5դմ։ Գտեք անկյունագծերի հատման կետի հեռավորությունը շեղանկյան կողմերից։
- 6. AD ուղղով ABC եռանկյան BM միջնագիծը բաժանվում է 5:1 հարաբերությամբ մասերի` հաշված B-ից։ Ի՞նչ հարաբերությամբ է բաժանում այդ ուղիղը եռանկյան մակերեսը։
- 7. Գետափնյա A և B վայրերից միաժամանակ միմյանց հանդեպ դուրս եկան նույն սեփական արագությունն ունեցող երկու նավակ։ A-ից դուրս եկած նավակը հանդիպումից 2 ժ հետո հասավ B, իսկ B-ից դուրս եկածը հանդիպումից 4,5 ժ հետո հասավ A։ Նավակների սեփական արագությունը քանի՞ անգամ է մեծ գետի արագությունից։
- 8. 1-ից մինչև 10000 բնական թվերի մեջ ո՞ր թվերն են շատ. որոնք բաժանվում են 11-ի վրա և չեն բաժանվում 5-ի, թե՞ որոնք բաժանվում են 2-ի վրա և չեն բաժանվում 7-ի։

2002թ. Առաջին փուլ <u>7-րդ դասարան</u>

1. Գտնել հավասարմանը բավարարող x–ի արժեքը

$$18 \text{ x} - 275 = 265$$
:

- 2. Գանել y-ը, եթե $\frac{27}{y} = \frac{18}{5}$:
- 3. Գտնել $\frac{72}{60}$ կոտորակի համարիչի և հայտարարի ամենամեծ

ընդհանուր բաժանարարը։

- 4. Կատարել գործողությունները. $\left(-18\frac{2}{9}-11\frac{1}{3}\right):\left(-\frac{8}{9}\right):$
- 5. Կոտորակներից ո՞րն է մեծ. $\frac{2}{3}$ -ը թե $\frac{1}{2}$ -ը :
- 6. Արտահայտել մետրերով 4մ 2սմ-ը։
- 7. Ուղղանկյան կողմերն են 15մ և 25մ։ Հաշվել ուղղանկյան պարագիծը և մակերեսը։
- 8. Ուղղանկյունանիստի (ուղղանկյուն զուգահեռանիստ) երեք չափումները /երկարություն, լայնություն, բարձրություն/ հավասար են 5մ-ի, 6մ-ի և 4մ-ի։ Գտնել նրա ծավալը։
- 9. Գիրքն ունի 800 էջ։ Առաջին օրը աշակերտը կարդաց գրքի 54 %-ը։ Քանի՞ էջ մնաց կարդալու։
- 10. Գառներն ու սագերը ունեն 29 գլուխ և 92 ռաք։ Քանի՞ գառ և քանի՞ սագ կա։
- 11. Գտնել օրինաչափությունը և ավելացնել ևս երկու թիվ
- 2, 5, 10, 17, ...:
- 12. Յուրաքանչյուր րոպեում զամբյուղում եղած խնձորների թիվը կրկնապատկվում է։ 10 րոպե հետո զամբյուղը լցվում է։ Որքան՞ ժամանակ հետո այն կիսով չափ կլցվի։

<u>8-րդ դասարան</u>

- 1. Գանել արտահայտության արժեքը. $\left(-59\frac{4}{5}+18\frac{1}{5}\right)-63\frac{7}{10}$:
- 2. 1-ից մինչև 100 բոլոր թվերից առանձնացրել են այն թվերը որոնք բազմապատիկ են 3-ին կամ վերջանում են 3-ով։ Քանի՞ թիվ է առանձնացվել։
- 3. Նվազելիի, հանելիի և տարբերության գումարը 72 է։ Գտնել նվազելին։
- 4. Առաջին հեծանվորդի արագությունը 15 կմ/ժ է, իսկ երկրորդինը՝ 240 d/p։ Ո՞ր հեծանվորդի արագությունն է ավելի մեծ։
- 5. Աշակերտը կարդաց 120 էջ, որը ամբողջ գրքի 80%-ն է։ Քանի՞ էջ ունի գիրքը։
- 6. Գտեք x թիվը, եթե նրա և 8-ի հարաբերությունը հավասար է 19:5:
- 7. Գտնել 630 և 660 թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը։
- 8. Համեմատման ի՞նչ նշան պետք է դնել *-ի փոխարեն, որպեսզի ստացվի ճիշտ համեմատում.

$$\left(-\frac{25}{28}\right) \cdot \frac{14}{15} * -\frac{1}{2} - \frac{2}{3}$$
:

- 9. Բեռը տեղափոխելու համար անհրաժեշտ է 3,5տ բեռնատարողությամբ 18 մեքենա։ Այդ նույն բեռը տեղափոխելու համար 1,5տ բեռնատարուղությամբ քանի՞ մեքենա անհրաժեշտ կլինի։
- $10.~\Omega^{\circ}$ ր կոտորակն է մեծ. $\frac{70}{80}$ -ը, թե $\frac{440}{550}$ -ը։
- 11. ABC հավասարակողմ եռանկյան BC կողմի D միջնակետից տարված է AC ուղղին DM ուղղահայացը։ Գտեք AM-ը, եթե AB=12սմ։
- 12. Ուղղանկյուն եռանկյան սուր անկյուններից մեկը 60^{0} է, իսկ ներքնաձիգի և փոքր էջի գումարը՝ 30սմ։ Գտեք եռանկյան ներքնաձիգը։

9-րդ դասարան

- 1. Վերլուծել արտադրիչների $18xa^2 24ax + 8x$:
- 2. Ինչպիսի° դրական a թվերի դեպքում $a^4 > a^2$:
- 3. Կոորդինատային ո՞ր քառորդում է գտնվում M(a,b) կետը, եթե

$$\begin{cases} a > 0 \\ b < -1 \end{cases}$$
:

4. Վերլուծել արտադրիչների

$$\sqrt{x^3} - \sqrt{y^3} + \sqrt{x^2y} - \sqrt{xy^2}; \quad x, y \ge 0:$$

5. Գտնել համակարգի ամենափոքր ամբողջ լուծումը

$$\begin{cases} 2x - 1 < 4 \\ 3x + 6 > -8 \end{cases}$$
:

- $6. -5\sqrt{6}, -6\sqrt{5}, -7\sqrt{4}$ թվերը դասավորել աճման կարգով։
- 7. Առաջին դեպքում քառակուսու կողմը եռապատկեցին, իսկ երկրորդ դեպքում նրա մակերեսը մեծացրին 5 անգամ։ Որ՞ դեպքում ավելի շատ մեծացրին քառակուսու մակերեսը։
- 8. Հնձվորը օրական աշխատելով 6 ժամ կարող է հնձել մարգագետինը 12 օրում։ Քանի՞ օրում նա կվերջացնի այդ աշխատանքը, եթե օրական աշխատի 3 ժամ ավելի։
- 9. Արևը ծագում է 5 անց 53 րոպեին, իսկ մայր է մտնում 21 անց 25 րոպեին։ Ժամը քանիսի՞ն է լինում այդ ժամանակահատվածի կեսօրը։
- 10.~ABC եռանկյան AA_1 և BB_1 բարձրությունները հատվում են M կետում։Գտնել $\angle AMB$ -ն, եթե $\angle A=55^\circ$, $\angle B=67^\circ$:
- 11. 50 սմ պարագծով զուգահեռագծի անկյունագծերից մեկը նաև նրա բարձրությունն է։ Գտնել այդ բարձրությունը, եթե կից կողմերի տարբերությունը 1 սմ է։
- 12. ABC եռանկյանն արտագծած է շրջանագիծ։ Գտնել այդ շրջանագծի շառավիղը, եթե AC=24 սմ, $\angle A=60^\circ$, $\angle B=30^\circ$:

Երկրորդ փուլ 7-րդ դասարան

1.
$$4 + \left(7 - 4\frac{3}{4}\right) \cdot 1\frac{1}{3} + \left(6 - 4\frac{2}{5}\right) : 1\frac{1}{3} :$$

- 2. 28 կիլոգրամ միրգը տեղավորեցին 2 արկղում 3:4 կշռային հարաբերությամբ։ Քանի՞ կիլոգրամ միրգ եղավ յուրաքանչյուր արկղում։
- 3. Մեքենան առաջին օրն անցավ ամբողջ ճանապարհի $\frac{3}{8}$ -ը, երկրորդ

օրը՝ առաջին օրվա անցածի $\frac{15}{17}$ -ը, և երրորդ օրը՝ մնացած 200կմ-ը։ Որքան $^\circ$ բեզին ծախսվեց, եթե 10կմ ճանապարհի վրա մեքենան ծախսում է $1\frac{3}{5}$ լիտր բենզին։

4. Վերականգնել օրինակը

- 5. Ինչպե՞ս 9լ և 11լ տարողություն ունեցող դույլերի միջոցով ավազանից վերցնել 10լ ջուր։
- 6. 11 ֆուտբոլիստների միջին տարիքը 22 է։ Խաղի ընթացքում ֆուտբոլիստներից մեկին հեռացրին դաշտից և մնացած խաղացողների միջին տարիքը դարձավ 21։ Քանի՞ տարեկան է դաշտից հեռացված ֆուտբոլիստը։
- 7. 5 տարի առաջ քրոջ և եղբոր տարիքների գումարը 8 էր։ Ինչի՞ հավասար կլինի նրանց տարիքների գումարը 3 տարի հետո։
- 8. Որքանո՞վ է առաջին 100 զույգ թվերի գումարը մեծ առաջին 100 կենտ թվերի գումարից։

<u>8-րդ դասարան</u>

1. Իրար հետևից գրված են 10 թվեր այնպես, որ յուրաքանչյուր երեք հարևան թվերի գումարը 15 է։ Առաջին թիվը 7 է։ Ի՞նչ թիվ է գրված 10-րդ տեղում։

- 2. Քրինձը պարունակում է 70% օսլա, իսկ գարին՝ 60%: Որքա՞ն գարի պետք է վերցնել, որպեսզի ստացվի այնքան օսլա, ինչքան ստացվում է 12կգ բրնձից։
- 3. Համեմատել 1, 2, 3,....., 99, 100 թվերի թվանշանների քանակը 1, 2, 3,....., 999, 1000 թվերի մեջ եղած գրոների քանակի հետ։
- 4. Իրար հետևից գրված են 10-ից 24 բոլոր թվերը։ Բաժանվո՞ւմ է արդյոք ստացած թիվը 24-ի։ Ինչու՞։
- 5. Շրջանակներում գրել մեկական բնական թվեր այնպես, որ յուրաքանչյուր երկու հարևան (մեկ գծիկով միացված) թվերն ունենան մեկից տարբեր ընդհանուր բաժանարար, իսկ ոչ հարևանները՝ լինեն փոխադարձաբար պարգ։
- 6. Հեծանվորդը հողե ճանապարհով անցավ որոշ հեռավորություն՝ 15կմ/ժ արագությամբ։ Նույն երկարության ճանապարհը նա անցավ ասֆալտապատ խճուղով՝ 20կմ/ժ արագությամբ։ Գտնել հեծանվորդի անցած ամբողջ ճանապարհի երկարությունը, եթե հեծանվորդը ընդամենը ծախսել է 42 րոպե է։
- 7. ABC հավասարասրուն սուրանկյուն եռանկյան AB և AC սրունքներին տարված բարձրությունները հատվում են M կետում։ Գտեք եռանկյան անկյունները, եթե $\angle BMC=140^{0}$:
- 8. ABC եռանկյան C գագաթով տարված է ուղիղ, որը զուգահեռ է AE կիսորդին և AB ուղիղը հատում է D կետում։ Գտեք AD-ն, եթե AC=8սմ։

<u>9-րդ դասարան</u>

- 1. $\operatorname{Impqhg(ihl)} ab + \frac{ab}{a+b} \cdot \left(\frac{a+b}{a-b} a b\right)$:
- 2. x-ի ի՞նչ արժեքների դեպքում 2x+3 երկանդամը գտնվում է (0;1) միջակայքում։
- 3. Արտադրիչը տանել արմատանշանի տակ

$$(x-y)\cdot\sqrt{\frac{3x}{y^2-x^2}}$$
, then $0 < x < y$:

- 4. Տրված է a:b=7:3 և 3b:c=9:2։ Գտնել a:c:
- 5. Միևնույն ամսում 3 կիրակի օրեր համընկել են զույգ օրերի հետ։ Այդ ամսվա 20-ը շաբաթվա \mathbf{n}° ր օրն է։
- 6. Դասարանի երեխաների մի մասը սիրում է միայն վանիլային պաղպաղակ, մի այլ մասը` միայն շոկոլադային, իսկ մնացածը`

երկուսն էլ։ Վանիլային պաղպաղակ սիրողները կազմում են դասարանի 45%-ը, իսկ շոկոլադային սիրողները՝ 90%-ը։ Գտնել, թե դասարանի ո՞ր տոկոսն են կազմում երկուսն էլ սիրողները։

- 7. ABC եռանկյան մեջ $\angle C = 120^\circ$, AC = BC = a ։ Գտեք այդ եռանկյան արտագծյալ շրջանագծի շառավիղը։
- $8. \ AD=17 \$ և $BC=5 \$ հիմքերով և $AB=10 \$ սրունքով ABCD հավասարասրուն սեղանի B գագաթով տարված է մի ուղիղ, որը կիսում է AC անկյունագիծը, իսկ AD հիմքը հատում է M կետում։ Գտնել BDM եռանկյան մակերեսը։


2003թ. 7-րդ դասարան (առաջին փուլ)

1.Կատարեք գործողությունները.

$$\left(-47\frac{1}{3}-6\frac{1}{6}\right)+51\frac{2}{3}$$

- 2. Գանել x-ի այն ամբողջ լուծումների քանակը, որոնց համար |x| <4:
- 3. Գտնել 264 և 660 թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը։
- 4. Երեք օրում կոմբայնը հնձեց 125 հա մակերեսով ցորենի դաշտը, ընդ որում առաջին օրը հնձեց դաշտի 40%-ը, իսկ երկրորդ օրը մնացածի 2/3 մասը։ Քանի՞ հա է հնձել կոմբայնը երրորդ օրը։
- 5. Երբ Կարենը հանգստավայրից մոտակա թերակղզին գնում է ոտքով և վերադառնում նավակով, ապա ճանապարհին ծախսում է 2ժ 30ր։ Երբ գնում և վերադառնում է նավակով, ապա ճանապարհին ծախսում է 30րոպե։ Որքա՞ն ժամանակ կծախսի Կարենը ճանապարհին, եթե թերակղզի գնա և վերադառնա ոտքով։
- 6. 5 հատ 4-ի և թվաբանական գործողությունների միջոցով ստացիր 5։
- 7. Գտիր օրինաչափություն և գրիր բաց թողնված թիվը.
- 7, 10, 19, *, 127:
- 8. 6 արկղերում կար հավասար թվով նուռ։ Երբ յուրաքանչյուրից հանեցին 44-ական, ապա բոլոր արկղերում մնաց այնքան նուռ, որքան սկզբում կար երկու արկղերում։ Սկզբում քանի՞ նուռ կար յուրաքանչյուր արկղում։
- 9. Գտնել համեմատության անհայտ անդամը. $X: 3\frac{1}{8} = 2,8: 3\frac{1}{2}$

- 10. Ուղղանկյունը և քառակուսին ունեն հավասար մակերես, յուրաքանչյուրը՝ 6400սմ 2 ։ Ուղղանկյան երկարությունը 160սմ է։ Ո՞ր պատկերի պարագիծն է ավելի փոքր և որքանո՞վ։
- 11. Թիվը վերլուծվում է երկու պարզ արտադրիչների որոնցից մեկը միանիշ թիվ է, իսկ մյուսը` երկնիշ։ Արտադրիչների տարբերությունը 18 է։ Գտեք այդ թիվը։
- 12. Պատկերված նկարում գտնել եռանկյունների թիվը։



8-րդ դասարան (առաջին փուլ)

1. Կատարեք գործողությունները.

$$\left(2\frac{7}{9}-1\frac{4}{5}\right):\left(-1\frac{7}{15}\right)$$

- 2. Գտնել 303-ի բնական բաժանարարների քանակը։
- 3. Քանի՞ տոկոսով է 117-ը փոքր 130-ից։
- 4. 5 գրիչը և 5 ալբոմը միասին արժեն 525 դրամ, իսկ 1 գրիչը և 2 ալբոմը՝ 150 դրամ։ Որքա՞ն արժեն 2 գրիչը և մեկ ալբոմը միասին։
- 5. Գտնել այն բնական թվերը, որոնք 8-ով բազմապատկելիս ստացվում է երկնիշ թիվ, իսկ 91-ով բազմապատկելիս՝ քառանիշ թիվ։
- 6. 7-ին բազմապատիկ քանի՞ թիվ կա 72 և 425 թվերի միջև։
- 7. $\angle u_2 dt_1.1+3-2-4+5+7-6-8+...+1997+1999-1998-2000+2001+2003$:
- 8. Ի՞նչ թիվ պետք է գրել x-ի փոխարեն, որպեսզի ստացվի ճշմարիտ հավասարություն. 1-(11x-3)-17x=2:
- 9. 80 կմ/ժ արագություն ունեցող գնացքը դիտողի մոտով անցավ 9 վայրկյանում։ Քանի՞ վագոն ունի գնացքը, եթե մեկ վագոնի երկարությունը 25 մ է։
- 10. Հավաքած խաղողը տեղավորեցին 4 արկղերում, ընդ որում առաջին և երրորդ արկղերում հավասար քանակով, իսկ երկրորդ և չորրորդ արկղերում համապատասխանաբար 12 կգ և 14 կգ։ Քանի՞ կգ խաղող էին հավաքել, եթե առաջին արկղում տեղավորել են նրա 5/23 մասը։
- 11. ABC եռանկյան մեջ B գագաթից տարված BM միջնագիծը հավասար է AC կողմի կեսին։ Գտնել AB կողմի երկարությունը, եթե AC=10 սմ, իսկ $\angle C=30^{0}$ ։

12. MNK եռանկյան N գագաթին հարակից արտաքին անկյան կիսորդը զուգահեռ է MK կողմին։ Գտնել MNK եռանկյան պարագիծը, եթե MK=10 uմ, MN=6 uմ։

9-րդ դասարան (առաջին փուլ)

- 1. Կրճատել կոտորակը՝ $\frac{2m^2-5m+2}{mn-2n-3m+6}$:
- 2. Ինչպիսի՞ բացասական a թվերի դեպքում է ճիշտ $a^4 < a^2$ անհավասարությունը:
- 3. Գրեք այն ուղղի հավասարումը, որը զուգահեռ է XOY կոորդինատական համակարգի երկրորդ քառորդի կիսորդին և անցնում է (2,0) կետով։
- 4. Գանել համախմբի լուծում չհանդիսացող ամբողջ թվերը՝ $\begin{bmatrix} 2y+4<4y-1\\ 2-5y\geq y+8 \end{bmatrix}$:
- 5. Լուծել հավասարումը. |1+(x-2)|+x=2:
- 6. Գտնել արտահայտության արժեքը. $\sqrt{7+4\sqrt{3}}+\sqrt{7-4\sqrt{3}}$:
- 7. Սի բնական թվից հանեցին 4, ստացված թիվը բաժանվեց 7-ի վրա առանց մնացորդի։ Գտնել այդ բնական թվի խորանարդը 7-ի վրա բաժանելուց ստացվող մնացորդը։
- 8. 35 հա մակերես ունեցող դաշտը կազմված է երկու հողակտորից։ Երկրորդ հողակտորի մակերեսը 4 անգամ մեծ է առաջինի մակերեսից։ Գտնել առաջին հողակտորի մակերեսը։
- 9. Լճում իրարից 800 մ հեռավորության վրա գտնվող երկու լողորդ միաժամանակ սկսեցին լողալ միմյանց ընդառաջ։ Որքա՞ն ժամանակ հետո կհանդիպեն նրանք, եթե յուրաքանչյուրը լողում է 6 կմ/ժ արագությամբ։
- 10. Շրջանագծի A կետով տարված են շոշափող և շառավոին հավասար լար։ Գտեք դրանց կազմած բութ անկյունը։
- 11. Շեղանկյան անկյունագծերը հավասար են 18 մ և 24 մ։ Գտեք շեղանկյան պարագիծը և զուգահեռ կողմերի միջև հեռավորությունը։
- 12. Ջուգահեռագծի փոքր կողմը 17սմ է։ Անկյունագծերի հատման կետից մեծ կողմին տարված ուղղահայացն այդ կողմը բաժանում է 14սմ և 6սմ երկարությամբ հատվածների։ Հաշվել զուգահեռագծի մակերեսը։

- 1. Երկու թվերի տարբերությունը հավասար է 648-ի։ Այդ թվերից մեկը վերջանում է զրոյով։ Եթե զրոն անտեսենք, ապա կստանանք մյուս թիվը։ Գտնել այդ թվերը։
- 2. 2-ից մինչև 11-ը եղած բնական թվերի արտադրյալին գումարել են 109։ Գտնել ստացված թիվը 84-ի վրա բաժանելուց ստացված մնացորդը։
- 3. Քանի՞ զրո կա 83-ից մինչև 127 բնական բոլոր թվերի արտադրյալի վերջում։
- 4. Հայերենի միջազգային օլիմպիադայի 35 մասնակիցներից 21-ը գիտեին արևմտահայերեն, 25-ը՝ դասական հայերեն, իսկ 4 հոգի տիրապետում էին միայն արևելահայերենին։ Քանի՞ հոգի էին տիրապետում և արևմտահայերենին, և դասական հայերենին։
- 5. Սևանից Երևան ուղևորված հեծանվորդներից մեկի արագությունը 400մ/ր է, իսկ մյուսինը՝ 22կմ/ժ, ընդ որում նրանք Երևան հասան միաժամանակ։ Գանել Երևան հասնելուց կես ժամ առաջ հեծանվորդների միջև եղած հեռավորությունը։
- 6. Qunûtı |x-3y|-2|x+y|, npuntın x=-2,2; y=9/7:
- 7. Երկու ծորակներից մեկը ավազանի 1/3 մասը լցնում է 6 ժամում, իսկ երկու ծորակները գործելով միաժամանակ ավազանը կարող են լցնել 12 ժամում։ Միայն երկրորդ ծորակը քանի՞ ժամում կլցնի ավազանը։
- 8. 611 և 586 թվերը նույն թվի վրա բաժանելիս ստացվում են համապատասխանաբար 5 և 4 մնացորդներ։ h° նչ թվի էին բաժանել։

8-րդ դասարան (երկրորդ փուլ)

1. Հաշվել.
$$\left(140\frac{7}{30} - 138\frac{5}{12}\right)$$
: $18\frac{1}{6}$: 0,002

- 2. Գտնել 21 հայտարարով բոլոր սովորական կոտորակները, որոնք գտնվում են 8/15 և 2/3 թվերի միջև։
- 3. Գտնել 52*2* տեսքի բոլոր այն հնգանիշ թվերը, որոնք բաժանվում են 36-ի:
- 4. Երկու աղջիկներից յուրաքանչյուրն ուներ դրամ։ Մեկ տուփ գունավոր մատիտներ գնելու համար աղջիկներից մեկին չէր բավարարում 7 դրամ, մյուսին` 2 դրամ։ Միացնելով ունեցած ողջ դրամը` աղջիկները նորից չկարողացան գնել այն։ Ի՞նչ արժե մեկ տուփ մատիտը։

- 5. Ապրանքի գինը բարձրացրին 70%-ով, այնուհետև նոր գինն իջեցրին p%-ով։ Արդյունքում ապրանքի գինը սկզբնականի նկատմամբ ավելացավ 19%-ով։ Գտնել p-ն։
- 6. Գտնել 1-ից 5-ը բնական թվերի արտադրյալի բաժանարարների քանակը։
- 7. Հավասարասրուն եռանկյան արտաքին անկյուններից մեկը 115⁰ է։ Գտեք եռանկյան անկյունները։
- 8. ABC հավասարասրուն եռանկյան մեջ BC սրունքին տարված AH բարձրությունը AC հիմքի հետ կազմում է 60^{0} -ի անկյուն։ Գտեք B գագաթից տարված միջնագիծը, եթե HB= $10\,\mathrm{ud}$:

1.Պարզեցնել արտահայտությունը.

$$\frac{y}{x-y} - \frac{x^3 - xy^2}{x^2 + y^2} \left(\frac{x}{(x-y)^2} - \frac{y}{x^2 - y^2} \right):$$

- 2. Գտնել $(5x-4)^4+4$ բազմանդամի գործակիցների գումարը, որը ստացվում է փակագծերը բացելուց և նման անդամները միացնելուց հետո։
- 3. Գտնել համակարգի ոչ բացասական ամբողջ լուծումները.

$$\begin{cases} 3(2x-1) < 7, 2-2(3-4x) \\ \frac{2x-3}{3} \ge x - \frac{5}{3} \end{cases}$$
:

- 4. Լուծել հավասարումը. $\sqrt{1-4x+4x^2}+2x-1=0$:
- 5. Ապացուցել, որ ցանկացած ամբողջ a թվի դեպքում $(a^2+3a+1)^2-1$ թիվը բաժանվում է 24-ի:
- 6. A-ից B և B-ից A միաժամանակ մեկնեցին երկու ավտոմեքենաներ և հանդիպեցին 3ժ անց։ Առաջին ավտոմեքենան B հասավ 1,1 ժամ ավելի ուշ, քան երկրորդը՝ A: Քանի՞ անգամ է երկրորդ ավտոմեքենայի արագությունը մեծ առաջինի արագությունից։
- 7. Հավասարասրուն սեղանի փոքր հիմքը հավասար է սրունքին։ Գտնել սեղանի անկյունները, եթե անկյունագիծն ուղղահայաց է սրունքին։

8. Շեղանկյան բութ անկյան գագաթից կողմերից մեկին տարված բարձրությունը մեծ անկյունագիծը բաժանում է 3,5 և 12,5 երկարությամբ հատվածների։ Գտնել շեղանկյան կողմի և փոքր անկյունագծի երկարությունները։

2004թ. 7-րդ դասարան (առաջին փուլ)

1. Կատարեք գործողությունները.

$$\left(7\frac{1}{2} - 12\frac{3}{8}\right) + 5\frac{3}{4}$$

- 2. Գտնել |5x| < 23 պայմանին բավարարող բոլոր ամբողջ x-երի բանակը:
- 3. Գտնել 540 և 900 թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։
- 4. Գտնել առաջին յոթ բնական թվերը, որոնք 4-ի վրա բաժանելիս ստացվում է 3 մնացորդ։
- 5. Քանի՞ հատ ութանիշ թվեր կան, որոնցից յուրաքանչյուրի թվանշանների գումարր հավասար է 2-ի։
- 6. 1 ժամում ներկարարների բրիգադը ներկեց տան պատերի կեսը։ Մնացած մասը մեկ մարդ ներկեց 4 ժամում։ Քանի՞ մարդ կար բրիգադում։
- 7. Գրատախտակին գրված է 5432154321 թիվը։ Ձնջել մեկ թվանշան այնպես, որ ստացվի 9-ի վրա բաժանվող ամենամեծ թիվը։ Գրել այդ թիվը։
- 8. Գիրքն ունի 240 էջ։ Աշակերտը առաջին օրը կարդաց գրքի 7,5%-ը, իսկ երկրորդ օրը՝ 12 էջ ավելի։ Քանի՞ էջ մնաց կարդալու։
- 9. Սեղանին դրված են ընկույզով լի հինգ փաթեթ։ Փաթեթներում կա ընդամենը 100 ընկույզ։ Առաջին և երկրորդ փաթեթներում միասին կա 52 ընկույզ, երկրորդ և երրորդ փաթեթներում՝ 43, երրորդ և չորրորդ փաթեթներում՝ 34, չորորդ և հինգերորդ փաթեթներում՝ 30։ Քանի՞ ընկյուզ կա փաթեթներից յուրաքանչյուրում։
- 10. Գանել a և b թվերի գումարը, եթե a= $11\frac{1}{3}-16\frac{3}{4}$, իսկ b= $7\frac{2}{3}-5\frac{3}{4}$:
- 11. Արմենը շարժվում է 2,5 կմ/ժ արագությամբ, իսկ Սուրենը՝ 20 մ/ր արագությամբ։ Նրանցից ո՞վ ավելի արագ կանցնի 8 կմ երկարությամբ ճանապարհը և քանի՞ րոպեով։
- 12. 15, 19, 21, 22, 37 թվերից որո՞նք կարող են լինել պարզ թիվը 30-ի բաժանելիս ստացված մնացորդ։

8-րդ դասարան (առաջին փուլ)

1.
$$4 \text{might}$$
 $\left(-1\frac{1}{2}\right) \cdot \left(-2\frac{3}{4}\right) - \frac{1}{2} - \left(-\frac{4}{3}\right) \cdot \left(-\frac{3}{2}\right)$

- 2. Գանել բոլոր x ամբողջ թվերը, եթե հայտնի է, որ A և B բազմությունների միավորման տարրերի թիվը հավասար չէ միավորվող բազմությունների տարրերի թվերի գումարին. $A=\{1;2;3;4;5\}, B=\{x;x+1\}:$
- 3. b-ի ո՞ր արժեքների դեպքում 2-ը 3x-4b<x անհավասարման լուծում է։
- 4. Գործարանի երեք արտադրամասերում կա 270 մարդ։ Երկրորդ արտադրամասում երկու անգամ քիչ մարդ կա, քան առաջինում, իսկ երրորդում՝ 20 մարդ ավելի, քան առաջինում։ Քանի՞ մարդ է աշխատում յուրաքանչյուր արտադրամասում։
- 5. Դասարանի բոլոր 15 աշակերտները ցանկություն հայտնեցին սովորել անգլերեն կամ ռուսերեն։ Նրանցից 10-ը ցանկություն հայտնեց սովորել անգլերեն, 8-ը՝ և՛ անգլերեն, և՛ ռուսերեն։ Քանի՞ աշակերտ ցանկություն հայտնեց սովորել ռուսերեն։
- 6. Գտնել $x \frac{1}{4} \ge \frac{7}{5}$ անհավասարման ամենափոքր բնական լուծումը։
- 7. Երկու հեծանվորդ հավասարաչափ շարժվում են շրջանագծով միևնույն ուղղությամբ և իրար են հանդիպում յուրաքանչյուր 8 րոպե հետո։ Որքա՞ն է շրջանագծի երկարությունը, եթե առաջինը րոպեում անցնում է 500 մ, իսկ երկրորդը՝ րոպեում 450 մ։
- 8. 20 կգ 15%-անոց սպիրտի լուծույթին ավելացրին 10 կգ թորած ջուր։ Քանի՞ տոկոսանոց սպիրտի լուծույթ ստացվեց։
- 9. Լուծել հավասարումը. $81\frac{3}{4} \left(5x + 1\frac{1}{2}\right) 24\frac{5}{8} = 0$:
- 10. Գտնել $\frac{2x}{3} \frac{x}{5} < 7$ անհավասարման այն բնական լուծումները,

որոնք փոխադարձաբար պարզ են 10-ի հետ։

11. Բութանկյուն հավասարասրուն եռանկյան պարագիծը 45 սմ է, իսկ նրա կողմերից մեկը մյուսից փոքր է 9 սմ-ով։ Գանել եռանկյան կողմերը։


12. ABC հավասարասրուն եռանկյան AC հիմքը 37 սմ է, իսկ B գագաթին հարակից արտաքին անկյունը՝ 60^{0} ։ Գտեք C գագաթի հեռավորությունը AB ուղղից։

9-րդ դասարան (առաջին փուլ)

- 1. Վերլուծել արտադրիչների. $x^2 + y^2 a^2 + 2xy$:
- 2. Արտադրիչը տարեք արմատանշանի տակ. $3x\sqrt{-2x}$:
- 3. Ձբոսաշրջիկները նավակով ուղևորվեցին գետի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ և հետ վերադարձան։ Գետի հոսանքի արագությունը 2կմ/ժ է, իսկ նավակի արագությունը կանգնած ջրում 20կմ/ժ։ Ամենաշատը որքա՞ն կարող են հեռանալ զբոսաշրջիկները, որպեսզի նրանց զբոսանքը տևի 4 ժամից ոչ ավելի։
- 4. Մի ձմերուկը 2 կգ-ով թեթև է քան մյուսը և 5 անգամ թեթև է քան երրորդը։ Առաջինը և երրորդը միասին 3 անգամ ծանր են քան երկրորդը։ Որքա՞ն է լուրաքանչյուր ձմերուկի զանգվածը։
- 5. Ապրանքի գինը երկու անգամ հաջորդաբար բարձրացրին 10-ական տոկոսով։ Արդյունքում քանի՞ տոկոսով բարձրացավ ապրանքի սկզբնական գինը։
- 6. Գտնել անհավասարման ամենափոքր դրական ամբողջ լուծումը. 4(2-2x)+2x<-8,5 :
- 7. Փոփոխականի որ՞ արժեքների դեպքում է 10x-7 արտահայտության 10%-ը փոքր 5x-0,5 արտահայտության 5%-ից։
- 8. Լուծել անհավասարումը. |3x+9|>18 :
- 9. Լուծել անհավասարումը. $\sqrt{10x+3} > 2\sqrt{x-1}$:
- 10. Շրջանից դուրս վերցված կետից այդ շրջանագծին տարված են երկու հատող, որոնց կազմած անկյունը 32^{0} է։ Շրջանագծի՝ այդ անկյան կողմերի միջև առնված աղեղներից մեծը հավասար է 100^{0} ։ Գտեք փոքր աղեղը։
- 11. Ուղղանկյուն սեղանի հիմքերն են 9սմ և 18սմ, իսկ մեծ սրունքը՝ 15սմ։ Գտեք սեղանի մակերեսը։
- 12. ABC եռանկյան AC կողմին զուգահեռ ուղիղը AB կողմը հատում է D, իսկ BC կողմը` E կետում։ Գտեք DE հատվածի երկարությունը, եթե AC=18դմ, AB=15դմ և AD=10դմ։

1.
$$\lim_{b \to a} |b - a| + |b|$$
, then $a = \frac{5}{6 + \frac{2}{3}}; b = \frac{1}{3 - 4\frac{1}{3}}$:

- 2. Գտնել 1848 և 990 թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարի այն բազմապատիկները, որոնք փոքր են 198-ից։
- 3. Չորս ընկերներով ֆուտբոլի գնդակ գնեցին։ Առաջինը տվեց դրա արժեքի 1/2-ը, երկրորդը՝ մնացածի 1/3-ը, երրորդը՝ մնացած 1/4-ը, չորրորդը՝ մնացած 51 դրամը։ Գնդակն ի՞նչ արժեր։
- 4. Մի ցիստեռում կար 32տ բենզին, իսկ մյուսում՝ 36տ։ Առաջինից րոպեում դատարկվում էր 0,2տ, իսկ երկրորդից՝ 0,3տ։ Քանի՞ րոպեից հետո ցիստեռներում կմնա հավասար քանակությամբ բենզին։
- 5. Որոշել պատկերի մակերեսը.



- 6. Երեք թվերի արտադրյալը 1000 է։ Առաջին երկու թվերը մեծացրին 10%-ով, իսկ երրորդը՝ փոքրացրին 20%-ով։ Ինչի՞ է հավասար ստացված թվերի արտադրյալը։
- 7. Դուրս գալով միևնույն կետից միաժամանակ, երկու վազորդ վազեցին 400մ շրջանագծով։ Այն պահին, երբ առաջին վազորդը վազել էր 2500մ, երկրորդը վազել էր 3100մ։ Որքա՞ն էր վազորդների միջև հեռավորությունը այդ պահին։
- 8. Տրակտորը մեկ օրում վարում է 12hա, իսկ ցանում է մեկ օրում 18hա։ Տրակտորը մեկ օրում որքա՞ն մակերես կարող է և՛ վարել և՛ ցանել։

8-րդ դասարան (երկրորդ փուլ)

1.
$$\angle \text{uight.}\left(\frac{5}{6} + \frac{3}{4}\right) : 1\frac{2}{3} + 1\frac{2}{5} \cdot \left(2\frac{1}{2} - \frac{2}{5}\right)$$

- 2. AB և AC անհավասար կողմերով սուրանկյուն եռանկյան մեջ տարված են AH բարձրությունը և AD կիսորդը։ Գտնել HAD անկյունը, եթե B անկյուն 40^{0} -ով մեծ է անկյուն C-ից։
- 3. 5 տրակտորներ 5 օրում հերկեցին 250հա։ Քանի՞ օրում 10 այդպիսի տրակտորները կհերկեն 300հա։
- 4. 2 տարբեր շրջանագծերը հատվում են P և Q կետերում, ընդ որում շրջանագծերի կենտրոնները գտնվում են PQ ուղղի միևնույն կողմում։ Ապացուցել, որ շրջանագծերի կենտրոններով անցնող ուղիղը կիսում է PQ հատվածը և ուղղահայաց է նրան։
- 6. A-ից դեպի B դուրս եկավ հետիոտնը 5,1կմ/ժ արագությամբ։ Նրա հետ միաժամանակ B-ից դեպի A շարժվեց հեծանվորդը 10,1կմ/ժ արագությամբ, որը հասավ A, անմիջապես հետ դարձավ, շարժվելով նույն արագությամբ։ Կհասնի՞ արդյոք հեծանվորդը հետիոտնին՝ նախքան B հասնելը։
- 7. Այսօր 40%-ով ավելի շատ գիրք եմ գնել և 50%-ով բարձր գներով, քան երեկ։ Այսօր երեկվանից քանի՞ անգամ շատ փող եմ ծախսել։
- 8. Ուղղանկյունը բաժանված է 4 փոքր ուղղանկյունների, որոնց պարագծերը նշված են գծագրում։ Գտնել մեծ ուղղանկյան պարագիծը։

4นน์	12uմ
6นน์	8นน์

1. Պարզեցնել արտահայտությունը.

$$\left(\frac{5(m-2)}{m^3-8}-\frac{m+2}{m^2+2m+4}\right)\cdot\frac{2m^2+4m+8}{m-3}$$
:

- 2. Quality $\frac{a^2 ab}{b^2 + a^2}$, then $\frac{a + b}{a b} = 3$:
- 3. Գտնել 2004** տեսքի վեցանիշ թվերը, որոնք բաժանվում են և՛ 9-ի և՛ 7-ի։
- 4. Քանվորը պետք է աշխատեր 4 ժամ։ Նա 2 ժամ աշխատելուց հետո ևս 3 ժամ աշխատեց, բայց 20% նվազ արտադրողականությամբ։ Քանի՞ տոկոսով նա կատարեց առաջադրանքը։
- 5. Lուծել հավասարումը. $3+\sqrt{x-3}=4-\sqrt{4x-12}$:

- 6. Խորանարդի ընդհանուր գագաթ ունեցող երեք նիստերի վրա գրված են 12, 24 և 39 թվերը։ Խորանարդի մյուս երեք նիստերի վրա գրել այնպիսի պարզ թվեր, որ հանդիպակաց երկու նիստերի վրա գրված թվերի գումարները լինեն իրար հավասար։
- 7. 6սմ և 10սմ հիմքերով սեղանին արտագծած շրջանագծի կենտրոնը գտնվում է մեծ հիմքի վրա։ Գտնել սեղանի մակերեսը։
- 8. ABC եռանկյան AD միջնագծի վրա գտնվող M կետով և B գագաթով անցնող ուղիղը K կետում հատում է AC կողմը։ Գտեք AK:KC հարաբերությունը, եթե AM:MD=1:2:

2005թ. 7-րդ դասարան (առաջին փուլ)

1.Գտնել արտահայտության արժեքը.

$$\left(2,125 \cdot 1\frac{15}{17} - 1\frac{7}{12}\right): 7,25$$
w. $\frac{1}{2}$ p. 3 q. $\frac{1}{3}$ q. 0,3

2. Հետևյալ թվերից ո՞րն է բաժանվում և՛ 3-ի, և՛ 5-ի.

ш. 2155 р. 2030 q. 1035 q. 2223

3.1; 2; 6; 17; 39; 51; 67 թվերից քանի՞սն են պարզ.

ш. 2-р р. 4-р q. 3-р л. 5-р

4. Ո՞րն է x-ը, եթե x:6=8 (մնացորդ 1)

ш. 47 р. 49 q. 48 n. 57

5. Գանել (c+c+c+c+c+b+b+b+b+b+b)-ը, եթե c=-2,3 , b=1,5:

ш. 4,8 р. -8,4 q. -4,8 η. -22,8

6. Արտահայտել տոննայով. 25ց 40կգ։

ш. 25,4m р. 2,54m q. 2,054m n. 20,54m

7. Արտահայտել դմ 2 -ով. 0,024մ 2

m. $2,4\eta \delta^2$ p. $0,24\eta \delta^2$ q. $24\eta \delta^2$ η. $2,04\eta \delta^2$

- 8. Ուղղանկյունաձև դաշտի երկարությունը 800մ է, իսկ լայնությունը 450մ։ Հաշվել դաշտի մակերեսը և այն արտահայտել հեկտարով։
 - ш. 3,6hш р. 36hш q. 360hш п. 0,36hш
- 9. Ուղղանկյունանիստի երկարությունը հավասար է 0,6մ-ի, լայնությունը՝ 3դմ, իսկ բարձրությունը 20սմ։

Գտնել ուղղանկյունանիստի ծավալը։

u. $36ud^3$ p. $3,6d^3$ q. $36\eta d^3$ η. $360ud^3$

10. Ջույգ թիվը 6-ի վրա բաժանելիս մնագորդը կարող է լինել.

ш. 1 р. 2 q. 3 п. 8

11. Ուղղանկյան լայնությունը 20սմ է, իսկ երկարությունը կազմում է լայնության 115%-ը։ Որքա՞ն կլինի ուղղանկյան պարագիծը։

ш. 43ud p. 23ud q. 86ud q. 460ud

12. 2+4+6+...+96+98+100 գումարր հավասար է.

w. 102·25 p. 102·50 q. 5050 n. 2525

- 13. 25-ր 30-ի ո՞ր մասն է։
- 14. 40մ/ը արտահայտել կմ/ժ-ով։
- 15. Գտնել 156 և 540 թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։
- 16. Ո°րն է -1,08; -2,5; 0,01 և - $\frac{7}{6}$ թվերից ամենափոքրը։
- 17. Ուղղի վրա նշված են 6 կետեր։ Այդ կետերում սկզբնակետ ունեցող քանի՞ ճառագայ \mathfrak{p} ներ կստացվի։
- 18. Չորս հաջորդական թվերի գումարը հավասար է 74-ի։ Գտնել այդ թվերից ամենամեծը։
- 19. Ո°ր թվի 12%-ն է hավասար 48-ի։
- 20. Գետի հոսանքի արագությունը 3կմ/ժ է։ Որքանո՞վ է հոսանքի ուղղությամբ նավակի ունեցած արագությունը մեծ հոսանքին հակառակ ուղղությամբ ունեցած նրա արագությունից։
- 21. Տղան 11 տարեկան է։ Քանի՞ տարեկան է հայրը, եթե 5 տարի առաջ տղան 6 անգամ փոքր էր հորից։
- 22. Քանի՞ երկնիշ զույգ թիվ կա։
- 23. Հաշվել | -11+7| +2-| 14-10,5 | ։
- 24. Գտնել ամենափոքր բաղադրյալ թվի և երկնիշ ամենամեծ պարզ թվի գումարը։

8-րդ դասարան (առաջին փուլ)

1. Գանել 1,25 և -2,3 թվերի գումարի հակադիր թիվը։

w. -3,55 p. -1,05 q. 3,55 n. 1,05

2. Գտնել միանիշ պարզ թվերի գումարը։

ш. 15 р. 18 q. 17 n. 19

3. Գտնել 2⁴⁹-ի բնական բաժանարարների քանակը։

ш. 40 р. 50 q. 49 n. 2

4. Գանել x-ի այն արժեքները, որոնց դեպքում |2x+4|+3 արտահայտությունը կընդունի ամենափոքր արժեքը:

ш. 0 р. -2; 2 q. 0; 1 η. -2

5. Գանել $\left(-1\frac{2}{3}\right) \cdot 0, 3 - \left(-\frac{3}{8}\right) \cdot \left(-0, 25\right)$ արտահայտության արժեքի

հակադարձը։

ш. -0,5 р. 0,5 q. 2 п. -0,2

- 6. Քանի՞ թիվ կա որոնց թվանշանների արտադրյալը հավասար է 132: ա. 2 թ. 1 գ. 0 դ. անվերջ շատ
- 7. Տրված են երկու թվեր։ Հայտնի է, որ առաջին թվի 36%-ը հավասար է 30,6-ի, իսկ երկրորդի 51%-ը հավասար է առաջին թվի 48%-ին։ Այդ թվերից ո՞րն է մեծ և որքանո՞վ։
 - ա. 2-րդր 5-ով . 1-ինր 15-ով գ. 1-ինր 5-ով դ. հավասար են
- 8. Գտնել 72; 120; 168 թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։

ш. 12 р. 48 q. 2520 п. 24

- 9. Գտնել հավասարասրուն եռանկյան պարագիծը, եթե նրա երկու կողմերը հավասար են 3սմ և 7սմ։
 - ա. 13ud p. 17ud q. 13ud կամ 17ud դ. 7ud
- 10. AB հատվածի երկարությունը 14սմ է, իսկ D կետը գտնվում է AB ուղղի վրա։ Գտեք AD հեռավորությունը, եթե AD=3DB։
 - ա. 21սմ բ. 10,5սմ գ. 10,5սմ կամ 21սմ դ. 10,5սմ կամ 20սմ
- 11. ABC եռանկյան AD միջնագիծը շարունակված է BC-ի մյուս կողմում DE հատվածով, որը հավասար է AD-ին։ Գտնել \angle ACE-ն, եթե \angle ACD= 56° , \angle ABD= 40° :
 - u. 100^{0} p. 16^{0} q. 120^{0} n. 96^{0}
- 12. Գտնել հավասարասրուն եռանկյան գագաթի անկյունը, եթե նրա անկյուններից մեկր հավասար է 40^{0} ։

 $\frac{1}{100}$ $\frac{1}{100}$

- 13. 5.4 հեկտարն արտահայտել արով։
- 14. C ուղիղ անկյունով ABC ուղղանկյուն եռանկյան A գագաթին հարակից արտաքին անկյունը 120^0 է և AC+AB=18սմ։ Գտեք AC և AB կողմերի երկարությունները։
- 15. Գանել x-ր, եթե 192:x=9(մն. 3)։
- 16. Գտնել 7 համարիչով ամենամեծ կոտորակը, որը $\frac{2}{3}$ -ից փոքր է:
- 17. Քանի՞ եռանիշ զույգ թիվ կա, որոնք կարելի է կազմել 1, 2, 6 թվանշաններով՝ յուրաքանչյուր թվանշանն օգտագործելով մեկ անգամ։
- 18. Գտնել z-ի արժեքը. z+(-(-z+3,3)+(-2,3+z))=3:

19. Պարզեցնել արտահայտությունը.
$$\frac{x \cdot x}{x \cdot y} : \frac{y}{x} \cdot \frac{x \cdot y}{y \cdot y}$$

20. Լուծել հավասարումը.
$$81\frac{3}{4} - (5x+1,5) - 24\frac{5}{8} = 0$$

21. Գտնել անհավասարման ամենափոքր ամբողջ լուծումը.

$$8 > \frac{3-2x}{1,5}$$
:

- 22. Հայրը որդուց մեծ է 7 անգամ։ 4 տարի հետո նա որդուց մեծ կլինի 4 անգամ։ Քանի՞ տարեկան է հայրը, և քանի՞ տարեկան է որդին։
- 23. Մի տրակտորը դաշտը կարող է վարել 12 օրում, իսկ մյուսը՝ 9 օրում։ Դաշտի ո՞ր մասը կվարեն երկու տրակտորները միասին, եթե առաջինն աշխատի 5 օր, իսկ երկրորդը՝ 4 օր։
- 24. Ծովի ջուրը պարունակում է 5% աղ։ Որքա $^\circ$ ն մաքուր ջուր պետք է ավելացնել 30գ ծովի ջրին, որպեսզի աղի պարունակությունը լինի 1,5%:

9-րդ դասարան (առաջին փուլ)

 $1.\ 0;\ 2;\ 5$ չկրկնվող թվանշաններով կազմված 5-ին բազմապատիկ քանի՞ եռանիշ թիվ կա:

2. 0; 1; 2; 3; 5; 10 թվերից քանի՞սն են
$$\begin{bmatrix} 2x-x^2=0 \\ x^2(x-1)-18=0 \end{bmatrix}$$
 համախմբի

լուծում։

3. abc-cba տեսքի ցանկացած թիվը առանց մնացորդի բաժանվում է. ա. 9-ի և 10-ի $\,$ p. 9-ի և 11-ի $\,$ q. 11-ի և 22-ի

դ. այլ պատասխան

4. Քանի՞ %-ով կմեծանա քառակուսու մակերեսը, եթե նրա պարագիծը մեծագնենք 10%-ով։

5. Գտնել $2^3 \cdot 3^2$ թվի բաժանարարների թիվը:

6. x-ի ո°ր արժեքների դեպքում (2x+1) արտահայտության արժեքները մեծ չեն (1-3x) արտահայտության արժեքներից։

w.
$$(-\infty;0)$$
 p. $[0;+\infty)$ q. $(-\infty;0]$ η. $(0;+\infty)$

7. Երեք հաջորդական զույգ թվերի գումարը հավասար է 240-ի։ Գտնել այդ թվերից մեծագույնը։

ш. 92 р. 78 **a.** 80 n. 82

8. Դիգուք f(x) բազմանդամն ունի իրարից տարբեր 5 արմատ։ Ի՞նչ աստիճան կարող է ունենալ f(x) բազմանդամը:

ա. 4 p. 3 q. 4-ից մեծ դ. 5-ից փոքր

9. Գանել |x-3|<4 անհավասարման ամբողջ լուծումների քանակը:

ш. 7 р. 9 q. 6 п. 10

10. A(a;2a) կետը ո°ր հավասարումով տրված ուղղի վրա է գտնվում.

u. y=-x p. y=2x q. y=-2x η. y=0.5x

11. Գտնել հետևյալ գծերով սահմանափակված պատկերի մակերեսը. y=2x, x=1, x=4, y=2:

w. 12 p. 9 q. 6

12. Գտնեւ $\sqrt{1+10x} > 4$ անհավասարման ամենափոքր բնական լուծումը:

- u. 2 p. 1 q. 10 η. 3

 13. $\angle u$ 2 με. $\left(\sqrt{7+\sqrt{13}}+\sqrt{7-\sqrt{13}}\right)^2$:
- 14. Լուծել հավասարումը. |3(x-2)+1|=4 ։ 15. Դասարանի $\frac{2}{5}$ -ը գնաց կինո, իսկ $\frac{3}{7}$ -ը՝ ցուցահանդես։ Քանի՞

աշակերտ կա դասարանում, եթե նրանց թիվը 40-ից քիչ է։

- 16. ո բնական թվի և 72-ի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը 36 է, իսկ ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը 216։ Գտնել ո-ը։
- 17. $\frac{3}{7}$ և $\frac{4}{7}$ թվերի միջև գտնել թիվ, որը ռացիոնալ թվի քառակուսի է։
- 18. Գտնել 17-ին բացմապատիկ և 7006 թվին ամենամոտ բնական phdn:
- 19. Աշակերտը գիրքը պետք է կարդար 3 օրում։ Նա 1-ին օրը կարդաց գրքի կեսը, 2-րդ օրը՝ մնացածի $\frac{1}{3}$ -ը, իսկ 3-րդ օրը արդեն կարդացածի

կեսը։ Արդլոք նա կարդա՞ց ամբողջ գիրքը։

- 20. Քակում եղած խոցերի և հավերի թիվը 10-ից պակաս չէր, իսկ նրանց ոտքերի թիվը 22 է։ Բակում քանի՞ հավ կար։
- 21. AB jupp δq ni δt 115^0 -h huduuun unth, hud AC jupp 43^0 -hաղեղ։ Գտեք BAC անկյունը։

- 22. Զուգահեռագծի մակերեսը 40սմ² է, իսկ կողմերը՝ 10սմ և 8սմ։ Գտեք զուգահեռագծի բութ անկյունը։
- 23. Գտեք շեղանկյան կողմը և մակերեսը, եթե նրա անկյունագծերը հավասար են 10սմ և 24սմ։
- 24. ABC եռանկյան AC կողմին զուգահեռ ուղիղը AB կողմը հատում է D, իսկ BC կողմը՝ E կետում։ Գտնել DE հատվածի երկարությունը, եթե AC=20սմ, AB=17սմ և BD=11,9սմ։

- 1. Ուղղանկյան պարագիծը 27,3սմ է, իսկ նրա երկարությունը պարագծի 4/13-րդ մասն է։ Հաշվել ուղղանկյան մակերեսը։
- 2. Հանդիսատեսները կինոդահլիճից կարող են դուրս գալ նեղ և լայն դռներով։ Եթե բացեն միայն նեղ դռները, ապա բոլոր հանդիսատեսները դուրս կգան 15ր-ում։ Եթե բացեն միայն լայն դռները, ապա բոլոր հանդիսատեսները դուրս կգան 10ր-ում։ Ինչքա՞ն ժամանակում դահլիճը կդատարկվի, եթե բացեն բոլոր դռները։
- 3. 18 հոգիանոց բրիգադը ճանապարհը կարող է ասֆալտապատել 10 օրում։ Քանի՞ բանվոր պետք է ավելացնել աշխատանքը մեկ օր շուտ ավարտելու համար։
- 4. Փոխեցին եռանիշ թվի վերջին երկու թվանշանների տեղերը և գումարեցին սկզբնական թվին, արդյունքում ստացվեց 1187։ Գտնել բոլոր այդպիսի եռանիշ թվերը։
- 5. Գրքի էջերը համարակալված են առաջին էջից։ Անգետիկը գրքի տարբեր տեղերից պոկեց 24 թերթ և գումարեց պոկված բոլոր 48 էջերի համարները, արդյունքում ստացավ 2005։ Երբ այդ մասին իմացավ գիտունիկը, նա հայտարարեց, որ Անգետիկը սխալվել է։ Հիմնավորել ինչու՞ էր գիտունիկը միշտ։
- 6. Գտնել բոլոր հնարավոր (a;b;c) բնական թվերի եռյակները, որոնք բավարարում են 18 < a < b < c < 24:
- 7. Արտահայտության ձախ մասում դնել փակագծեր այնպես, որ ստացվի ճիշտ հավասարություն.

$$2:3:4:5:6=5$$

8. Հաշվել մարմնի ծավալը. եթե

$$a = 5\frac{1}{3}; b = 3,75; c = 2\frac{2}{3}; x = 6\frac{1}{6}; y = 1\frac{1}{6}$$

- 1. Մոտորանավակը անցավ նախ 120կմ, ապա` դրա 25%-ը, որից հետո` արդեն անցածի 2/3-ը։ Մոտորանավակի անցած ամբողջ ճանապարհը 40կմ-ով ավելի է, քան մնացած ճանապարհի կեսը։ Ընդամենը որքա՞ն ճանապարհ պետք է անցներ մոտորանավակը։
- 2. Երկու ավտոմեքենաներ, որոնք գտնվում են իրարից 280կմ հեռավորության վրա, շարժվում են իրար հանդեպ։ Առաջինի արագությունը 60կմ/ժ է, իսկ երկրորդինը՝ 80կմ/ժ։ Դուրս գալուց որքա՞ն ժամանակ հետո նրանց միջև եղած հեռավորությունը նորից կլինի 280կմ։
- 3. Խանութ են բերել 96 կարմիր և կապույտ գնդակներ։ Այդ գնդակները դասավորել են խմբերով այնպես, որ յուրաքանչյուր 12 կապույտ գնդակի հետ դրվել է 4 կարմիր գնդակ։ Ընդամենը քանի՞ կարմիր և քանի՞ կապույտ գնդակ է բերվել խանութ։
- 4. CDE ուղղանկյուն ևռանկյան մեջ ($\angle E=90^{0}$) տարված է EF բարձրությունը։ Գտնել CF-ը և FD-ն, եթե CD=18սմ, իսկ $\angle DCE=30^{0}$ ։
- 5. Լուծել անհավասարումը. 1,6(3-2x)-1,7(-x-1)> $\frac{1}{2}$ x+ $\frac{1}{2}$:
- 6. Կարելի է արդյո՞ք 6x7 չափսերի ուղղանկյունաձև աղյուսակում թվերը դասավորել այնպես, որ թվերի գումարը յուրաքանչյուր տողով լինի դրական, իսկ յուրաքանչյուր սյունով՝ բացասական։ Պատասխանը հիմնավորել։
- 7. Ապացուցել, որ ցանկացած a,b,c բացասական թվերի դեպքում

$$a < b$$
 անհավասարությունից կհետևի, որ $\frac{a+c}{b+c} < \frac{a}{b}$:

8. D կետը ABC եռանկյան գագաթներից հավասարահեռ է, ընդ որում AC և BD հատվածները հատվում են P կետում։ Գտնել ABC եռանկյան անկյունները, եթե $\angle ADP = \frac{1}{2} \angle PDC$ և $\angle ADP = \frac{2}{3} \angle PAD$:

9-րդ դասարան (երկրորդ փուլ)

1. Կրճատել կոտորակը.
$$\frac{8a^3 + 27b^3}{2a^2 + ab - 3b^2}$$
:

- 2. Ապացուցել անհավասարությունը ցանկացած a,b իրական թվերի hամար. $\frac{4}{3}a^2+\frac{3}{2}b^2\geq 2ab$:
- 3. Պարզեցնել արտահայտությունը.

$$\sqrt{x^2-4x+4} + \sqrt{x^2-6x+9}$$
 , then $2 \le x \le 3$:

- **4.** Լուծել անհավասարումը. $\sqrt{10x+3} > 2\sqrt{x-1}$:
- **5.** 2³⁰; 3¹⁸ և 8⁹ թվերը դասավորել աճման կարգով։
- 6. Դասարանում բացակա աշակերտների թիվը կազմում է ներկաների $\frac{1}{6}$ մասը։ Երբ մեկ հոգի գնաց տուն, բացակաների թիվը եղավ այդ

պահին դասարանում գտնվող աշակերտների թվի $\frac{1}{5}$ մասը։ Քանի՞ աշակերտ ունի դասարանը։

- 7. Ապացուցել, որ եթե եռանկյան որևէ կողմին տարված միջնագիծը այդ կողմի կեսից փոքր է, ապա եռանկյունը բութանկյուն է։
- 8. ABC եռանկյան AB և BC կողմերի վրա համապատասխանաբար վերցվրած են M և N կետերն այնպես, որ AM:MB=BN:NC=1:2: Եռանկյան BCկողմին տարված միջնագիծը հավասար է 12սմ։ Գտնել MN հատվածի երկարությունը։

2006թ. 7-րդ դասարան (առաջին փուլ)

- 1. Արտահայտել կգ-ով. 25կգ 12գ։
- 2. Հետևյալ թվերից ո՞րն է բաժանվում 3-ի և չի բաժանվում 9-ի։
 - ш. 2024 р. 1015 q. 2352 q. 2009
- 3. Գտնել 12 և 48 թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը։
 - ш. 12 р. 1 q. 96 η. 48
- 4. Գտնել 8-ի բոլոր բնական բաժանարարների քանակը։
- ա. 1 բ. 2 գ. 4 դ. 3 5. Նշված թվերից ո՞րը կարող է լինել 2 հաջորդական բնական թվերի արտադրյալի վերջին թվանշան։
 - ш. 5 р. 9 q. 0 η. 3

6. 15մ-ր 2,5կմ-ի ո՞ր մասն է կազմում։

m.
$$\frac{500}{3}$$
 p. $\frac{3}{50}$ q. $\frac{3}{5}$ n. $\frac{3}{500}$

7. Քանի $^{\circ}$ պարզ թիվ կա, որոնք x-ի փոխարեն տեղադրելիս անհավասարությունը կլինի ճիշտ. x+6<23:

8. Գայանեն գրքի $\frac{3}{4}$ մասը կարդաց 4 ժամում։ Ինչքա $^\circ$ ն ժամանակում

նա կկարդա ամբողջ գիրքը։

u. 300p p. 5
$$d$$
 20p q. $\frac{3}{16}d$ q. 2 d 40p

9. Ավտոմեքենան անցավ ճանապարհի 40%-ը։ ճանապարհի ո՞ր մասը մնաց անցնելու։

u.
$$\frac{2}{3}$$
 p. $\frac{5}{3}$ q. $\frac{3}{5}$ η. 60

10. Գտնել 79-ից փոքր երկնիշ զույգ թվերի քանակը։

11. Գտնել 8-ի 25%-ր։

12. Հաշվել.
$$3\frac{4}{5} - 4.2$$

u.
$$-\frac{2}{5}$$
 p. 1,8 q. 8 η. 0,4

13. Հաշվել.
$$5\frac{3}{7} - \left(2\frac{1}{2} + 1\frac{1}{3}\right) : \frac{1}{6} :$$

14. Ուղղանկյան երկարության և լայնության գումարը նրա պարագծի ո՞ր %-ն է կազմում։

15. Գանել $-\frac{7}{8}$, $-\frac{6}{7}$, $-\frac{5}{6}$ թվերից ամենամեծի և ամենափոքրի գումարը։

16. Երեք տարբեր բնական թվերի գումարը հավասար է 8-ի։ Գտնել այդ թվերից ամենամեծը։

- 17. Հաղորդալարի մի կտորը 6 անգամ կարճ է երկրորդից, իսկ երկրորդ կտորը 125մ-ով երկար է առաջինից։ Գտնել երկրորդ կտորի երկարությունը։
- 18. Եռանիշ թվերը գրված են առանձին թերթիկների վրա։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ թերթիկ պետք է վերցնել, որպեսզի այդ թվերից գոնե մեկը բաժանվի 2-ի։
- 19. Գանել x-ի այն արժեքը, որի դեպքում -|x+1|+2 արտահայտությունը կընդունի ամենամեծ արժեքը։
- 20. Գտնել այն ամենափոքր եռանիշ թիվը, որի թվանշանների ցանկացած տեղափոխությունից այն չի փոխվում։

8-րդ դասարան (առաջին փուլ)


- 1. Տրված են $\frac{11}{23}$; $\frac{20}{28}$; $\frac{11}{14}$; $\frac{35}{49}$; $\frac{5}{20}$; $\frac{70}{80}$ թվերը։ Գտնել $\frac{5}{7}$ -ից մեծ թվերի քանակր։
 - ш. 1 р. 2 q. 3 п. 0
- 2. Նշված թվերից ո°րը կարող է լինել երկու հաջորդական բնական թվերի արտադրյալի վերջին թվանշանը։
 - ш. 5 р. 8 q. 9 л. 6
- 3. 200-ից մեծ և 300-ից փոքր քանի $^{\circ}$ թիվ կարելի է գրել օգտագործելով միայն 1,2,3 և 4 թվանշանները։
 - ш. 3 р. 12 q. 16 n. 8
- 4. Ուղղի վրա տրված են 4 կետեր։ Այդ դեպքում քանի $^{\circ}$ հատված կառաջանա։
 - ш. 6 р. 7 q. 5 п. 3
- 5. Գրքում կա 400 էջ։ Նրա էջերի 54%-ը քանի՞ անգամ է մեծ նրա էջերի 18%-ից։

w.
$$\frac{1}{3}$$
 p. 3 q. 2 n. 1.5

- 6. Ուղղի վրա նշված են 20 կետեր այնպես, որ ցանկացած երկու հարևան կետերի միջև հեռավորությունը միևնույնն է։ Գտնել այդ հեռավորությունը, եթե եզրային կետերի միջև հեռավորությունը 380սմ է։
 - ш. 19 ий р. 20 ий q. $\frac{190}{9}$ ий η . 21 ий

7. Պատկերի մակերեսի որ տոկոսն է ստվերագծված։

m.
$$\frac{3}{8}$$
 p. 50 q. 30 n. 37,5



8. Գտնել $|\mathbf{x}| - 3 < 2$ անհավասարման ամբողջ լուծումների քանակը։

9. Գանել $24 \cdot 75$ և $36 \cdot 105$ թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։

10. Տրված երկարությամբ հատվածների որ[®] եռյակով է որոշվում եռանկյուն։

u. 3ud, 3ud, 7ud p. 4d, 5d, 9d q. 3ud, 4ud, 5ud q. 2ud, 9ud, 5ud

11.
$$\angle \frac{1}{3} \cdot 3 - \frac{3}{8} \cdot \left(1 - \frac{1}{3} + 2 - \frac{2}{9}\right) :2 :$$

12. Թիվը 3-ի և 6-ի վրա բաժանելիս ստացված մնացորդների գումարը հավասար է 7-ի։ Գտնել այդ մնացորդների արտադրյալը։

13. Նկարում AC||BD և AC=AB,
$$\angle MAC = 40^{\circ}$$
 :
Գտնել $\angle CBD$ -ն։

- 14. ABC եռանկյան մեջ AB>BC>AC։ Գտնել \angle A-ն, եթե այդ եռանկյան անկյուններից մեկը 120^{0} է, մյուսը՝ 40^{0} ։
- 15. AH-ը ABC եռանկյան բարձրությունն է և $\angle B = 130^{0}$ ։ Գտնել $\angle BAH$ -ը։

Գտնել CD հատվածի երկարությունը։

- 17. Գտնել x-3<23 անհավասարման այն բնական լուծումների քանակը, որոնք փոխադարձ պարզ են 6-ի հետ։
- 18. Նավակը 24կմ-ը գետի հոսանքով անցնում է 1,5 ժամում, իսկ հոսանքին հակառակ ուղղությամբ՝ 3 ժամում։ Որոշեք գետի հոսանքի արագությունը։
- 19. Հոր քայլի երկարությունը 75սմ է, իսկ որդունը՝ 50սմ։ Ամենաքիչը ինչ հեռավորություն անցնելու դեպքում նրանք երկուսն էլ ամբողջ թվով քայլեր կանեն։

20. Տանձն ու բայր միասին կշռում են այնքան, որքան 2 խնձորը։ Չորս տանձր կշռում է այնքան, որքան 2 բալր և 5 խնձորը միասին։ 7 խնձորն է ծանր, թե[®] 5 տանձր։

9-րդ դասարան (առաջին փուլ)

x-h n°n undtpüthh ntupnið 2x+3 unmuhujunipjuü 1. արժեքը փոքր չէ 5-2x արտահայտության արժեքից։

w.
$$(0,5;+\infty)$$
 p. $(-\infty;2]$ q. $[0,5;+\infty)$ n. $(-\infty;2]$

2. Լուծել համախումբը. $\begin{bmatrix} 3y+1<4\\ -2y+2>-4 \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix}
3y+1 < 4 \\
-2y+2 > -4
\end{bmatrix}$$

w.
$$(-\infty;1)$$
 p. $(-\infty;3)$ q. $(1;3)$ n. $(3;+\infty)$

3. Լուծել անհավասարումը. $|x-2| \le 3$

w.
$$[-1;5]$$
 p. $(-1;5)$ q. $(-1;5]$ η. $(-\infty;5]$

4. y-ի n°p արժեքների դեպքում է 2y-1 երկանդամի արժեքը qunûվnι $(-∞;3) \cup (5;+∞)$ puqunı⇒ pınılınıω:

w.
$$(3;+\infty)$$
 p. $(2;3)$ q. $(-\infty;2)$ q. $(-\infty;2)\cup(3;+\infty)$

5. Բնական թիվը 11-ի բաժանելիս մնացորդում ստացվում է 4։ Գտնել այդ թվի քառակուսին 11-ի բաժանելիս ստացված մնացորդը։

ш. 16 р. 5 q. 6 п. 4

6. Նշված եռյակներից ո°րն է 1-xy=2+y+z հավասարման լուծում։ m. (1;2;3) p. (0;0;0) q. (-1;0;-1) η. (0,5;2;4)

7. 3-ի ո՞ր աստիճանն է հավասար $9^4 \cdot \left(3 \cdot 81\right)^5$ արտահայտության աոժեքին։

ш. 18 р. 29 q. 33 п. 28

8. Գտնել a-ի այն ամբողջ արժեքների քանակը, որոնց դեպքում $\frac{a+6}{a}$ կոտորակի արժեքը ամբողջ է։

w. 1 p. 2 q. 8 n. 4

9. Քանի՞ 10-անիշ բնական թիվ կա, որոնք բաժանվում են 9-ի և որոնց գրառման մեջ կա միայն 0 և 5 թվանշաններ։

ш. 0 р. 1 q. 9 n. 8


- 10. Նշված պայմաններից ո°րի դեպքում տեղի ունի $\sqrt{ab} = \sqrt{-a} \cdot \sqrt{-b}$ նույնությունը։
- u. a=0; b>0 p. a>0; b=0 q. a≤0; b≤0 q. a>0; b>0
- 11. Գտեք $egin{cases} A \\ B \end{cases}$ համակարգի լուծումների բազմությունը, եթե

հայտնի է, որ A բանաձևի լուծումները միանիշ պարզ թվերի բազմությունն է, իսկ B-ինը՝ միանիշ գույգ թվերի բազմությունը։

- 12. Ապրանքի գինը երկու անգամ հաջորդաբար բարձրացրեցին 20%-ով։ Քանի՞ տոկոսով բարձրացավ ապրանքի գինը սկզբնականի համեմատ։
- 13. Լաստը A-ից B անցնում է 40 ժամում, իսկ նավակը՝ 4 ժամում։ Ինչքա՞ն ժամանակում նավակը կանցնի B-ից A:
- 14. Նույն հզորությամբ երկու տրակտորներ դաշտը վարում են 10 օրում։ Քանի՞ օրում կվարեն նույն դաշտը, եթե տրակտորներից մեկը աշխատի 2 անգամ արագ, իսկ մյուսը 2 անգամ դանդաղ։
- 15. Արկղում կա 3 գույնի 100 հատ գնդակ։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ գնդակ պետք է վերցնել, որպեսզի նրանցից 30-ը լինի միևնույն գույնի։
- 16. ABC եռանկյան AB և BC կողմերի վրա համապատասխանաբար վերցրած են M և N կետերն այնպես, որ $MN \|AC$: Գտնել MN հատվածի երկարությունը, եթե AC=20սմ, AB=10սմ, AM=6սմ։
- 17. Գտեք ուռուցիկ հնգանկյան մեծ անկյունը, եթե նրա անկյունները համեմատական են 3,4,5,7,8 թվերին։
- 18. Շրջանից դուրս վերցված կետերից այդ շրջանագծին տարված են 2 հատող, որոնց կազմած անկյունը 24^0 է։ Այդ անկյան կողմերի միջև առնված շրջանագծի աղեղներից մեծը 80^0 է։ Գտեք փոքր աղեղի աստիճանային չափը։
- 19. ABCD զուգահեռագծի B անկյունը 150^{0} է։ A անկյան կիսորդը BC կողմը հատում է K կետում։ Գտնել զուգահեռագծի մակերեսը, եթե BK= 6սմ, KC=4սմ։
- 20. AB ուղղից դուրս տրված է M կետը, ընդ որում MA=1սմ, MB=9սմ։ Գտնել AB հատվածի երկարությունը, եթե հայտնի է, որ այն արտահայտվում է ամբողջ թվով։

1.
$$\left| 2\frac{1}{2} \cdot 0.8 - 5\frac{2}{3} : 5.1 \right| : \frac{2}{3} - \frac{1}{3}$$

- 2. Գործարանում աշխատողների 35%-ը կին է։ Գտնել գործարանում աշխատող մարդկանց քանակը, եթե գործարանում աշխատող տղամարդիկ 540-ով ավել են կին աշխատողներից։
- 3. Ուղղի մի կետից դուրս եկան երկու ավտոմեքենա 30կմ/ժ և 50կմ/ժ արագությամբ և շարժվեցին այդ ուղղի վրայով։ Քանի՞ ժամ հետո նրանց միջև հեռավորությունը կլինի 160կմ (դիտարկել բոլոր հնարավոր դեպքերը)։
- 4. Քանի՞ երկնիշ թիվ կա, որի առաջին թվանշանը մեծ է երկրորդից։
- 5. Նկար 2-ում պատկերված է նկար 1 խորանարդի փովածքը։ Պարզել նկար 1-ում ո՞ր թվերն են գրված 4, 3 և 1 թվերի դիմացի նիստերի վրա։



- 6. Երեք դասարանի աշակերտներին տրվել է 574 դասագիրք։ Յուրաքանչյուր աշակերտ ստացել է հավասար քանակությամբ գիրք։ Հայտնի է, որ յուրաքանչյուր դասարանում աշակերտների քանակը 25-ից շատ է և 30-ից քիչ։ Քանի՞ դասագիրք է ստացել յուրաքանչյուր աշակերտը։
- 7. Քառանիշ թիվը, որի գրառման մեջ չկա 0 թվանշանը բաժանվում է 54-ի։ Երբ ջնջեցին նրա թվանշաններից մեկը, ստացված եռանիշ թիվը նույնպես բաժանվեց 54-ի։ Որից հետո ջնջելով եռանիշ թվի թվանշաններից մեկը ստացվեց 54։ Գտնել այդ քառանիշ թիվը։
- 8. Գտնել 36-ի բաժանվող ամենափոքր բնական թիվը, որի գրառման մեջ մասնակցել են 1-ից 9 բոլոր թվանշանները։

8-րդ դասարան (երկրորդ փուլ)

1. Գտեք $2\frac{2}{5} + |x-1| < -1\frac{3}{10} + 5,6$ անհավասարման ամբողջ լուծումները։

նկ.2

- 2. A և B վայրերից միաժամանակ, իրար հանդեպ շարժվեցին երկու մեքենա։ Քանի՞ ժամ հետո նրանք կհանդիպեն, եթե նրանցից մեկը AB ճանապարհի կեսը անցնում է 7,5 ժ-ում, իսկ մյուսը՝ 5 ժ-ում։
- 3. Գրված են 2, 2, 2, 1 թվերը։ Յուրաքաչյուր քայլում թույլատրվում է թվերից երկուսին ավելացնեն 1։ Հնարավո՞ր է որոշակի քայլերից հետո ստանալ չորս հավասար թվեր։
- 4.10-ին ձախից և աջից կցագրել մեկական թվանշան այնպես, որ ստացված քառանիշ թիվը բաժանվի 72-ի (պատասխանը հիմնավորել)։
- 5. Ապրանքի գինը բարձրացրին 25%-ով։ Քանի՞ տոկոսով պետք է իջեցնել նոր գինը, որպեսզի ստացված գինը հավասար լինի սկզբնական գնին։
- 6. Արկղում կա 5 գույնի 100 գնդակ։ Առաջին գույնից կա 32 գնդակ, երկրորդից՝ 24, երրորդից՝ 10, չորրորդից 12, իսկ հինգերորդից՝ 22 գնդակ։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ գնդակ պետք է հանել արկղից, որպեսզի նրանց մեջ լինի որևէ գույնի 15 գնդակ։
- 7. ABC եռանկյան մեջ CH -ը բարձրություն է։ Գտնել AB –ն, եթե $\angle C = 90^{\circ}$, AH = 10 սմ, AC = 20 սմ։
- 8. ABC եռանկյան մեջ BD կիսորդն է, իսկ AB=2 սմ, BC=4 սմ ։ Ապացուցել, որ $\angle BDC>\angle BDA$ ։

- 1. Giving p-4, thus $(3^2)^5 \cdot 3^p = 3^{24} : 3^6 :$
- 2. Պարզեցնել $\frac{x\sqrt{x}-8}{x-4\sqrt{x}+4}$: $\frac{x+2\sqrt{x}+4}{x\sqrt{x}-2x}$ արտահայտությունը և

hաշվել նրա արժեքը, եթե x=2:

- 3. Դիցուք a,b,c և d-ն կենտ բնական թվեր են։ Հնարավո՞ր է արդյոք, որ $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \frac{1}{c} + \frac{1}{d} = 1$:
- 4. Զբոսաշրջիկները նավակով ուղևորվեցին գետի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ և հետ վերադարձան։ Գետի հոսանքի արագությունը շկմ/ժ է, իսկ նավակի արագությունը կանգնած ջրում՝ 20կմ/ժ։ Ամենաշատը որքա՞ն կարող են հեռանալ զբոսաշրջիկները, որպեսզի նրանց զբոսանքը տևի 4 ժամից ոչ ավելի։

- 5. Հարությունը Վարդանից 25%-ով ավելի գումար ուներ և 25%-ով պակաս գումար ուներ քան Աշոտը։ Վարդանը Աշոտից քանի՞ տոկոսով պակաս գումար ուներ։
- 6. Ապացուցել $a^2-4a+5 \ge 2|a-2|$ անհավասարությունը։
- 7. Հավասարասրուն եռանկյան գագաթի անկյունը 36^0 է։ Գտնել այդ եռանկյան հիմքին առնթեր անկյան կիսորդի երկարությունը, եթե հիմքի երկարությունը 5ամ։
- 8. Գտնել հավասարասրուն սեղանի ներգծած շրջանագծի շառավիղը, եթե նրա պարագիծը 64սմ է, իսկ անկյուններից մեկը` 150° :

2007թ. 7-րդ դասարան (առաջին փուլ)

1. Հաշվել $3\frac{2}{7}-1\frac{1}{7}:\left(0,5-\frac{3}{14}\right)$ արտահայտության արժեքը։

$$\text{ui)} \ -\frac{5}{7} \ \text{pi} \ \frac{5}{7} \ \text{qi} \ \text{-7,5 q)} \ 7,5 \ \text{ti}) \ \frac{145}{49} \ :$$

- **2.** Գտնել 19-ից փոքր պարզ թվերի գումարը։ ա) 59 p) 56 q) 78 n) 77 b) 58 :
- **4.** Գանել 50.48 և 75.36 թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։

u) 60 p) 25 q) 21600 η) 600 b) 300 :

5. Տրված թվերից գտնել մեծագույնը ։

u)
$$100:0,01$$
 p) $10\cdot0,001\cdot100$ q) $0,01:100$ η) $0,1\cdot0,01\cdot10000$ t) $10000\cdot100:10$:

- **6.** Գրված 1991; 2323; 2112; 2222; 3131; 2332; 5252 թվերից բանիսր[°] կփոքրանան, եթե կարդանք աջից ձախ։
 - u(1) = u(1) =
- 7. 2007 բնական թվերի գումարը հավասար է 2008-ի։ Գտնել այդ թվերի արտադրյալը։
 - ա) 2 p) 2007 q) 1 դ) 2008 ե) հնարավոր չէ պարզել ։
- 8. Գտնել մեկի հարյուրերորդ մասի կեսը։
 - u) 0,005 p) 0,002 q) 0,02 η) 0,05 \mathfrak{b}) 0,5 :

- 9. 1-ից 9 թվերի բազմապատկման աղյուսակում ո՞ր թիվն է առավել հաճախ հանդիպում։
 - w) 56 p) 42 q) 27 η) 64 t) 36:
- 10. Ամենամեծ թիվը, որը հնարավոր է ստանալ, կողք կողքի

քարտերը հավասար է.

- u) 6 875 413 092 p) 7 685 413 902 q) 5 768 412 309
- 11. Եռանիշ թվերից ընտրել են տարբեր թվանշաններով գրվող թվերից մեծագույնը և փոքրագույնը։ Ինչի՞ է հավասար այդ թվերի տարբերությունը։
 - ա) 899 p) 660 q) 864 դ) 885 t) այլ պատասխան ։

12.
$$\frac{2007 + 2007 + 2007 + 2007 + 2007}{2007 + 2007} = ?$$

u)
$$\frac{5}{2}$$
 p) 2007 q) 3 n) $\frac{2}{5}$ t) 6021:


- 13. Եթե կարմիր վիշապը ունենա 6 գլուխ ավելի, քան կանաչը, ապա նրանք միասին կունենան 34 գլուխ։ Սակայն կարմիր վիշապը ունի 6 գլուխ պակաս, քան կանաչը։ Քանի՞ գյուխ ունի կարմիր վիշապը։
 - w) 6 p) 12 q) 8 η) 14 t) 16:
- **14.** Քանի՞ եռանիշ թիվ կա, որոնց թվանշանները ձախից աջ մեծանում են, իսկ թվանշանների արտադրյալը բաժանվում է 81-ի։ ա) 3 p) 2 q) 1 դ) 4 t) 5 :
- 15. Եթե տրված թվին գումարենք 2, ապա դա նույնն է, որ այդ թիվը բազմապատկենք 3-ով։ Եթե այդ թիվը բազմապատկենք 6-ով, դա նույնն է, որ այդ թվին գումարենք.
 - $u) 3 p) 4 q) 7 \eta) 6 b) 5:$
- 16. 100 ճագարներից մի քանիսը սպիտակ են, իսկ մի մասը՝ սև։ Հայտնի է, որ ճագարներից գոնե մեկը սև է, իսկ կամայական երկու ճագարներից գոնե մեկը սպիտակ։ Գտնել սև ճագարների քանակը։
 - ա) 50 p) 49 q) 99 դ) 1 ե) հնարավոր չէ պարզել :
- 17. Քանի $^{\circ}$ տարբեր գումարներ կարելի է ստանալ, գումարելով 1, 2, 3, 4 և 5 թվերից որևէ երկուսը :
 - $u(0) 7 p(0) 6 q(0) 5 \eta(0) 8 t(0) 9$:

- 18. Նշված արագություններից ընտրել այն, որը երկու անգամ փոքր է մյուս արագություններից որևէ մեկից։
 - ա) 1կմ/ր p) 20մ/վ q) 30կմ/ժ դ) 150 η մ/վ t) 300մ/ր :
- 19. Նկարում AC = 10uմ, BD = 15uմ, AD = 22uմ ։ Ինչի՞ է հավասար BC-ն։

A B C D

w) 3ud p) 5ud q) 7ud η) 9ud t) 12ud:

20. P, Q, R, S պատկերները քառակուսիներ են։ P-ի պարագիծը 16 սմ է, իսկ Q-ի պարագիծը՝ 24 սմ ։ Գտնել S-ի պարագիծը։




ա) 64uմ բ) 80uմ գ) 72uմ դ) 56uմ ե) 60uմ

8-րդ դասարան (առաջին փուլ)

- 1. Քանվորների բրիգադը պետք է խանութ տեղափոխեր 108 պարկ ալյուր։ Նրանք բաժանվեցին զույգերի և յուրաքանչյուր զույգը տեղափոխեց երեքական պարկ։ Քանի՞ բանվոր կար։ ա) 108 p) 96 q) 72 n) 36 t) 27:
- 2. 31սմ պարագծով քառանկյունը անկյունագծով բաժանվել է 21սմ և 30սմ պարագծերով եռանկյունների։ Գտնել այդ անկյունագծի երկարությունը։
- ա) 5 uմ p) 10 uմ q) 15 uմ դ) 20 uմ ե) հնարավոր չէ պարզել :
- 3. $45 \times *3 = 3 ***$ գրառման մեջ աստղանիշերը փոխարինվել են թվանշաններով այնպես, որ ստացվել է ճիշտ հավասարություն։ Գտնել աստղանիշի փոխարեն գրված թվանշանների գումարը։
- ա) հավասար է 20 p) հավասար է 21 q) հավասար է 17
- դ) մեծ է 21-ից ե) փոքր է 17-ից։
- 4. Աղցան պատրաստելու համար հարկավոր է 1,5 կգ կաղամբ, 100 գ ձեթ, 100 գ թթվասեր և 300 գ գազար։ Աղցանի ո՞ր տոկոսն է կազմում գազարը։
- w) 20% p) 17% q) 16% η) 15% t) 6%:
- **5.** 8-ր 40-ի ո°ր տոկոսն է։
 - w) 5% p) 15% q) 20% η) 25% t) 28%:
- **6.** Եռանիշ թվի թվանշանների գումարը a է, իսկ a թվի թվանշանների գումարը՝ b ։ Գտնել b թվի հնարավոր ամենամեծ արժեքը։
- $\mathfrak{w}) \ 9 \ \mathfrak{p}) \ 10 \ \mathfrak{q}) \ 11 \ \mathfrak{q}) \ 12 \ \mathfrak{t}) \ 18 :$

- 7. Գտնել 2-ի և 3-ի բաժանվող ամենափոքր բնական թվի և 2, 3, 4-ի բաժանվող ամենափոքր բնական թվի գումարը։ ա) 9 p) 32 q) 20 դ) 24 b) 18:
- 8. 1,2,...,17 թվերի հավաքածուից ջնջել են բոլոր զույգ թվերը և այն x թվերը, որ (17-x)-ը բաժանվում է 3-ի։ Քանի՞ թիվ մնաց։ ա) 4 p) 5 q) 6 դ) 7 ե) 8 :
- 9. B թիվը ունի 2007 հատ թվանշան, որոնք բոլորն էլ մեկ են։ Քանի՞ թվանշան կպարունակի B-ի և 2007-ի արտադրյալը։ ա) 2007 p) 2008 գ) 2010 դ) 4014 ե) 2007^2 :
- 10. Գանել 10-ի վրա չբաժանվող երկնիշ թվի և նրա հակառակ կարգով գրված երկնիշ թվի տարբերության մեծագույն արժեքը։ ա) 90 p) 81 q) 75 դ) 72 b) 45 :
- 11. Ունենք 1 սմ, 2 սմ, 3սմ, 2005 սմ, 2006 սմ, 2007սմ երկարություն ունեցող 6 հատվածներ։ Քանի՞ ձևով է հնարավոր եռանկյուն պատրաստել օգտագործելով այդ հատվածները։
- ա) 6 p) 1 q) 5 դ) 3 t) 50-ից ավելի :
- 12. Հայտնի է, որ ABCD-ն քառակուսի է և $\angle OND = 60^\circ$ ։ Գտնել $\angle COM$ -ը։
- u) 20^{0} p) 10^{0} q) 15^{0} η) 35^{0} t) 30^{0} :



- 13. Քանի $^\circ$ տարբեր ճանապարհով կարելի է գնալ A-ից B, եթե յուրաքանչյուր անգամ A-ից B գնալիս միևնույն կետով երկու անգամ անցնել չի կարելի։
- $u) 10 p) 8 q) 7 \eta) 6 b) 3:$
- 14. Գումարման օրինակում □+□+ ○○= △△△ տարբեր պատկերները փոխարինվում են տարբեր թվանշաններով։ Ո՞ր թվանշանն է փոխարինում քառակուսուն։
- u) 5 p) 9 q) 8 n) 7 b) 6:
- **15.** Հավասարասրուն եռանկյան անկյուններից մեկը 120^{0} է։ Գտնել եռանկյան հիմքին տարված բարձրության երկարությունը, եթե սրունքի երկարությունը 6սմ է։
- ա) 6 p) 1,5 q) 3 դ) հնարավոր չէ գտնել b) 12 :
- **16.** 2003, 2005, 2007, 2009, 2011 թվերից ընտրել $(2007^2 4)$ թվի ամենամեծ բաժանարարը։
- u) 2003 p) 2009 q) 2007 q) 2005 b) 2011 :

17. Սկյուռներից մեկը ընկույցը կարող է ուտել 6 րոպեում, երկրորդը՝ 15 րոպեում, իսկ երրորդը՝ 10 րոպեում։ Նույն ընկույցը երեքը միասին քանի՞ րոպեում կուտեն։

$$(m) \frac{1}{3}$$
 $(p) 3$ $(q) 31$ $(q) \frac{31}{3}$ $(b) 1:$

- 18. Հոսանքի ուղղությամբ նավակի արագությունը 7կմ/ժ է, իսկ հոսանքին հակառակ՝ 50մ/ը։ Գտնել նավակի սեփական արագությունը:
- u) 5μ(d p) 10μ(d q) 4μ(d η) 43μ(η t) 57μ(η :
- 19. Հաշվել $3,4-5\frac{1}{3}:\frac{2}{3}-0,6$ արտահայտության արժեքը։
- գումարը։
- p) 17 q) 11 n) 10 b) 18 : **w**) 15


9-րդ դասարան (առաջին փուլ)

- 1. Եթե 50^{50} -ը բաժանենք 25^{25} -ի, ապա կստանանք. ա) 2 p) 25^{25} q) 2^{25} η) 100^{25} b) 50^{25} :
- Գանել |1-2x| < 21 անհավասարմանը բավարարող պարզ 2. թվերի քանակը։
- w) 5 p) 6 q) 4 η) 8 t) 10:
- 3. -1, 1, 0, 2 թվերից $\begin{bmatrix} x^2 1 = 0 \\ x^3 + x 2 = 0 \end{bmatrix}$ համախմբի լուծումներն են.
- u) 1 u 0 p) 1 q) 1 u 2 q) -1 u 1:
- A երկնիշ թվի տասնավորների թվանշանը 2 անգամ մեծ է միավորների թվանշանից։ Այդ դեպքում A թիվը պարտադիր ա) գույգ է բ) կենտ է գ) 20-ից փոքր է դ) բաժանվում է 3-ի ե) բաժանվում է 6-ի։
- Ըստ մեծության քանի՞ տարբեր անկյուններ կարելի է տեսնել այս նկարում։
- u(1) 4 p(1) 6 q(1) 8 n(1) 10 t(1) 11:
- 6. Ուղղանկյան կողմը մեծագրին

25%-ով։ Քանի՞ տոկոսով պետք է փոքրացնել մյուս կողմը, որպեսզի ուղղանկյան մակերեսը չփոխվի։

u) 30% p) 25% q) 20% η) 15% t) 10%:

- 7. Շարքով գրված են 11 հատ բնական թվեր, այնպես որ ցանկացած 3 հարևան թվերի գումարը 21 է։ Առաջին տեղում գրված է 7, իսկ 9-րդ տեղում՝ 6։ Ի՞նչ թիվ է գրված երկրորդ տեղում։ ա) 7 p) 8 q) 6 η) 10 b) 21 :
- 8. Բնական թվերից, որոնց քառակուսին բաժանվում է 24-ի, ընտրել են փոքրագույնը։ Գտնել այդ թվի թվանշանների գումարը։ ա) 2 p) 3 q) 6 դ) 9 b) 10 :
- 9. 1, 2, 3, 4 թվանշաններով քանի՞ քառանիշ թիվ կարելի է կազմել, որոնց թվանշանները տարբեր են և նրանց գրառման մեջ 1-ր 2-ից առաջ է։
- u) 4 p) 6 q) 8 n) 12 b) 24:
- 10. Նկարում պատկերված է հողամասի հատակագիծը, որի չափերը արտահայտված են մետրերով։ 100 մ²-ու վրա ցանում են 2 կգ ցորեն։ Քան՞ի կգ ցորեն է անհրաժեշտ հողամասը ցանելու համար։
- u) 15 p) 20 q) 18 q) 22,5 q) 25 :
- 11. Խորանարդը դրված է վանդակավոր թղթի վրա, ինչպես ցույց է տրված նկարում։ Այն գլորվում է նշված ուղղություններով։ Քանի՞ կետ կերևա վերևի նիստում, երբ խորանարդը գտնվի (*)-ով վանդակի վրա։
- (*)-ով վանդակի վրա։ ա) 1 p) 2 q) 3 դ) 4 ե) ուրիշ պատասխան ։
- $(u) \ 0 \ p) \ 1 \ q) \ 10 \ \eta) \ 20 \ b) \ 100 :$
- 13. Նկարում ABCD սեղանի A և B անկյունները ուղիղ են, իսկ մակերեսը 3 անգամ մեծ է ABC եռանկյան մակերեսից։ Քանի՞ անգամ է ADB եռանկյան մակերեսը մեծ ABC եռանկյան մակերեսից։








$$(m) 2 p) \frac{3}{2} q) 1 \eta) \frac{5}{2} b) \sqrt{2}$$
:

- **14.** 1;2;...;100 թվերից ջնջել են բոլոր զույգ և 11-ին բազմապատիկ թվերը։ Քանի՞ թիվ մնաց։
- ա) 40 p) 41 q) 55 դ) 45 t) ուրիշ պատասխան :
- 15. Եթե a:b=9:4 և b:c=5:4, ապա (a-b):(b-c) հավասար է.
- ա) 7:12 p) 25:4 q) 4:1 դ) 5:2 t) հնարավոր չէ գտնել :
- 16. Չորս կատուներ զույգ առ զույգ կշռել են բոլոր հնարավոր եղանակներով և ստացել են հետևյալ քաշերը. 7կգ, 8կգ, 9կգ, 10կգ, 11կգ և 12կգ։ Այդ դեպքում կատուների ընդհանուր քաշը հավասար է. ա) 16 կգ թ) 18 կգ գ) 19 կգ դ) 57 կգ ե) հնարավոր չէ որոշել ։
- 17. a < b < 0։ Գանել -5a; 3a; 5b; -3b թվերից մեծագույնը.
- ա) -5a p) 3a q) 5b դ) -3b ե) պատասխանը կախված է a -ից ե b -ից :
- **18.** Հայտնի է, որ $x^2 + y^2 = 2xy$ և $y \ne 0$ ։ Գանել $\frac{x}{y}$ -ը։
- $u(1) (4 p) (2 q) (1 \eta) -1 t) -2$:
- 19. Հետևյալ հավասարություններից, որու $^{\circ}$ մ է m-ը k-ի 30%-ը.
- u) 10m-7k=0 p) 10m-3k=0 q) 3m-10k=0 η) 7m-10k=0 t) 7m-3k=0:
- **20.** Շրջանից դուրս վերցված կետից տարված են երկու հատող, որոնց կազմած անկյունը 40^{0} է։ Շրջանագծի` այդ անկյան կողմերի միջև առնված աղեղներից փոքրը հավասար է 40^{0} ։ Գտնել մեծ աղեղը։
- u) 120^{0} p) 80^{0} q) 240^{0} η) 60^{0} t) 160^{0} :

- **1.** Համեմատել a և b թվերը, եթե $a = 1\frac{1}{3} + 4 : 9\frac{3}{5}$ և $b = \left| 2, 5 4\frac{1}{3} \right|$:
- 2. Խոտի պաշարը ֆերմայի կովերին կբավականացնի 60 օր։ Այն բանից հետո, երբ կովերի քանակը ավելացրին 30-ով, խոտի պաշարը բավականացրեց 50 օր։ Քանի՞ կով կար ֆերմայում։
- **3.** Նապաստակը մրցում է կրիայի հետ 100 մ վազքուղով։ Երբ նապաստակը հասավ վերջնագծին, կրիային մնում էր անցնելու

90մ։ Քանի՞ մետր պետք է հետ տանել մեկնարկի գիծը նապաստակի փորձի ժամանակ hամաn, nnwtugh Gnn նոանք հասնեն վերջնագծին միաժամանակ։


- 4. Ծարավ ուղտի քաշի 84%-ը ջուր է։ Ջուր խմելուց հետո նրա քաշր դարձավ 800 կգ, որի 85%-ը ջուր է։ Որքան էր ուղտի քաշր մինչև ջուր խմելը։
- 5. Բնական թիվն ունի 3 հատ պարց բաժանարար։ Եթե այդ թիվո բազմապատկենք 6-ով կամ 11-ով, шщш ստացված նույնաես կունենան 3 պարց բաժանարար։ Գանել ամենափոքը թիվը։
- 6. 125 թիվն ունի հետևյալ հատկությունը, կամայական թվանշան իր նախորդից մեծ է ամենաքիչը երկու անգամ։ Քանի՞ եռանիշ թիվ կա, օժտված այդ հատկությունով և որո՞նք են այդ թվերը։
- 7. 2007 բնական թվերի արտադրյալը 105 է, իսկ նրանց գումարը հավասար է 2027։ Գտնել այդ թվերից մեծագույնը։
- 8. Ուղղանկյունը բաժանված է 7 քառակուսիների, ինչպես ցույց է տրված նկարում։ Ներկած փոքր քառակուսու կողմը 1միավոր է, իսկ մյուսինը՝ 2 միավոր։



8-րդ դասարան (երկրորդ փուլ)

- Գանել |x-1|+|x-2| արտահայտության արժեքը, եթե 1. $x = 3\frac{3}{7} - \frac{2}{5} : 0.2 :$
- Արամն ունի 20 հատ տարբեր գույնի մատիտներ՝ դեղին, 2. կանաչ, սև, կապուլտ։ Մատիտներից 17-ր կանաչ չէ, 12-ր դեղին չէ, 5-ր սև է։ Արամը քանի՞ կապույտ մատիտ ունի։
- Ոչ գրոյական թվանշաններով A երկնիշ թվիզ ջնջել են 3. թվանշաններից որևէ մեկը և ստացել B թիվը։ Գտնել $\frac{A}{B}$ -ի հնարավոր մեծագույն արժեքը։

4. ABC եռանկյան մեջ AB = AC (նկ.3)։ D և E կետերը այնպիսին են, որ AE = AD և $\angle BAD = 30^{\circ}$ ։ Գտնել $\angle CDE$ -ն։



- 5. ab+2, a^2+b^3 , (a+1)(b+1), $(a+b)^2$, a(b+1) hhúq pylhphg, nրտեղ a և b pylhph půwluú bů, шմենաշատը քանի $^{\circ}$ զույգ phylhunnn է jhůh:
- 6. Քառանկյան երկու կողմերը 1 սմ և 4 սմ են (նկ.1)։ 2 սմ երկարությամբ AC հատվածը քառանկյունը բաժանում է երկու հավասարասրուն եռանկյունների։ Գտնել քառանկյան պարագիծը։
- 7. Ուղղանկյունը բաժանված է 7 քառակուսիների ինչպես պատկերված է նկար 2-ում։ Ներկված քառակուսիների կողմը 8 սմ է։ Գտնել ուղղանկյան մակերեսը։
- 8. Մեքենան դուրս եկավ A վայրից և B վայր հասավ ժամը 16^{00} –ին։ Եթե նրա արագությունը լիներ 25%-ով ավելի, ապա B կհասներ 14^{30} -ին։ Ժամը քանիսի՞ն էր դուրս եկել մեքենան A -ից։

9-րդ դասարան (երկրորդ փուլ)

- 1. Արտադրիչը տանել արմատանշանի տակ $(2-a)\sqrt{\frac{3}{a^2-4}}$, երբ
- a > 2:
- 2. Պարզեցնել արտահայտությունը.

$$\left(\frac{a-3}{a^2+3a}-\frac{1}{a^2-9}:\frac{a+3}{(3-a)^2}\right)\cdot\frac{(a+3)^3}{a}:$$

3. Ուռուցիկ բազմանկյան մի գագաթից ելնող անկյունագծերի քանակը 25%-ով փոքր է կողմերի թվից։ Գտնել բազմանկյան կողմերի քանակը։

- **4.** Դատարկ ավազանը առաջին ծորակով լցվում է 15 ժամում, իսկ լիքը ավազանը երկրորդ ծորակով դատարկվում 10 ժամում։ Լիքը ավազանի, ո՞ր մասը կդատարկվի 2 ժամում, եթե երկու ծորակները բացենք միաժամանակ։
- 5. Գտնել երկնիշ թվի և նույն թվանշաններով, բայց հակառակ կարգով գրված թվի տարբերության հնարավոր մեծագույն արժեքը։
- **6.** 18 հաջորդական բնական թվերից ընտրել են որևէ 10-ը, որոնց գումարը ստացվել է պարզ թիվ։ Ապացուցել, որ մնացած 8 թվերի գումարը պարզ թիվ լինել չի կարող։
- 7. 0-ն շրջանագծի կենտրոնն է,

$$OR = QP$$
 Let $\angle AOR = 60^{\circ}$: Pentite $\angle RPO$ -G:

8. ABCD սեղանի CD սրունքին առընթեր անկյունների կիսորդները հատվում են P կետում, իսկ CP ուղիդը AD հիմքի հետ հավում է K կետում։ Գտնել P կետի հեռավորությունը CD սրունքի միջնակետից, եթե $CD = 10u\mathcal{G}$:

2008 p.

7-րդ դասարան (առաջին փուլ)

1. Հաշվել $\left| 6\frac{2}{7} - 3\frac{5}{7} \right| - \left| 1\frac{4}{7} - 2\frac{1}{7} \right|$ արտահայտության արժեքը։

$$u_1 - 2 p_1 = \frac{22}{7} q_1 2 q_1 - \frac{22}{7} :$$

2. $\lim_{y \to 0} \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{5}\right) + \left(-1\frac{2}{3}\right) \cdot \left(-\frac{9}{10}\right) - 1\frac{1}{2}$

արտահայտության արժեքը։

$$u) \frac{3}{2} p) -\frac{3}{2} q) -\frac{9}{2} \eta) \frac{9}{2}$$
:

- 3. $35\eta d^3$ -ը արտահայտել խորանարդ սանտիմետրերով: ա) $350 \text{ ud}^3 \text{ p}$) $0.35 \text{ ud}^3 \text{ q}$) $3500 \text{ ud}^3 \text{ n}$) 35000 ud^3 :
- **4.** Գւոնել $\frac{14}{3}$; |-4,5|; |-3,2|; -2,7 թվերից ամենամեծի և ամենափոքրի գումարը։

u) 1,3 p)
$$\frac{59}{30}$$
 q) 7,7 p) $\frac{22}{15}$:

5. Կոորդինատային առանցքի վրա տրված են A(-2), B(3), C(2) և D(-1) կետերը։ Գտնել AB և CD հատվածների միջնակետերի հեռավորությունը։

$$(m) \ 0 \ p) \ 3 \ q) \ \frac{1}{3} \ n) \ \frac{1}{6} :$$

- 6. Նշվածներից գտնել ամենամեծ արագությունը։
 - u) 20 $\sqrt[6]{4}$ p) 1 $\sqrt[6]{4}$ q) 50 $\sqrt[6]{4}$ η) 200 $\sqrt[6]{4}$:
- 7. Ընդհանուր քանակով 17 եռանկյունը և քառանկյունը միասին ունեն 60 կող։ Դրանցից քանի՞սն են եռանկյան կողեր։
 - u_1) 36 p_1) 24 q_1) 8 q_1) 9:
- 8. 2a-3b արտահայտությունն ընդունում է ավելի մեծ արժեք, երբ՝ ա) a=2; b=-1 p) a=1; b=-2 q) a=-1; b=-2 n) a=4; b=1 :
- 9. Երկու թվերի գումարը 48 է, իսկ տարբերությունը՝12։ Գտնել այդ թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։
 - u) 3 p) 12 q) 540 η) 6:
- **10.** Ուղղանկյունաձև սենյակի պարագիծը 32մ է։ Սենյակը միջնապատով բաժանեցին երկու սենյակների, որոնց պարագծերը 16մ և 24մ են։ Գտնել միջնապատի երկարությունը։
 - u) 8\dd p) 4\dd q) 6\dd n) 12\dd:
- 11. Ավազանի երկարությունը 4մ է, լայնությունը՝ 2մ, իսկ բարձրությունը 180սմ։ Որքա՞ն է ավազանի ծավալը։
 - u) $14.4 \, \text{u}^3 \, \text{p}$) $14.4 \, \text{u}\text{u}^3 \, \text{q}$) $1440 \, \text{u}^3 \, \text{n}$) $1440 \, \text{u}\text{u}^3 \, \text{:}$
- **12.** Խաղողը չորացնելիս կորցնում է իր քաշի 85%-ը։ Որքա՞ն չիր կստացվի 300 կգ խաղողը չորացնելիս։
 - ա) 255կգ բ) 15կգ գ) 45կգ դ) 60կգ:
- 13. 400գ տորթը բաժանեցին երեք երեխաների միջև այնպես, որ առաջինը ստացավ տորթի 3/8 մասը, իսկ երկրորդը՝ 1/4 մասը։ Որքա՞ն տորթ ստացավ երրորդ երեխան։
- 14. Գետի հոսանքի արագությունը 3կմ/ժ է, իսկ նավակի սեփական արագությունը` 8կմ/ժ։ Քանի՞ ժամում նավակը հոսանքի հակառակ ուղղությամբ կանցնի 24կմ։
 - (u) 3 (p) 8 (q) 24/11 (p) 4.8 :
- 15. Ինչպե՞ս կփոխվի կոտորակը, եթե նրա համարիչը եռապատկվի, իսկ հայտարարը՝ կրկնապատկվի։
 - ա) կմեծանա 6 անգամ 💮 բ) կփոքրանա 3/2 անգամ
 - գ) կմեծանա 3/2 անգամ դ) կփոքրանա 6 անգամ։

- **16.** 20 և 30 թվերից առաջինը մեծացրին 15%-ով, իսկ երկրորդը փոքրացրին իր 3/10-րդ մասով։ Գանել ստացված թվերի գումարը։ ա) 12 p) 32 q) 44 դ) 62 :
- **17.** 6 ժամ կարդալուց հետո մնաց կարդալու գրքի 2/5 մասը։ Քանի՞ ժամ է անհրաժեշտ գրքի մնացած մասը կարդալու համար։

uu) 4 p) 2 q) 3 n) 5:

18. Քանի՞ երկնիշ թիվ կա, որոնց տասնավորների թվանշանը փոքր է միավորների թվանշանից, իսկ այդ թվանշանների գումարը բաժանվում է 11-ի։

u) 8 p) 5 q) 6 η) 4:

19. Ի՞նչ հեռավորություն կանցնի ավտոմեքենան 15 վայրկյանում, եթե նրա արագությունը 72կմ/ժ է։

ա) 20մ p) 300մ q) 2կմ դ) 18կմ։

20. 20-ից մեծ և 50-ից փոքր քանի՞ բնական թիվ կա, որոնք 7-ի բաժանելիս տալիս են 3 մնացորդ։

u) 5 p) 4 q) 3 η) 2:

8-րդ դասարան (առաջին փուլ)

- 1. Գումարելիներից մեկը մեծացրել են 11-ով։ Ինչպե՞ս պետք է փոխել մյուս գումարելին, որպեսզի գումարր փոքրանա 3-ով։
 - ա) փոքրքցնել 8-ով բ) փոքրացնել 14-ով
 - գ) մեծացնել 8-ով դ) մեծացնել 14-ով։
- 2. Քանի՞ միանիշ պարզ թիվ կա։
 - w) 3 p) 4 q) 5 η) 6:
- 3. Գանել $\frac{107}{21}$ –ից մեծ ամենափոքր ամբողջ թիվը։

w) 107 p) 21 q) 5 η) 6:

4. Աստղանիշը փոխարինել գործողության նշանով այնպես, որ ստացվի ճիշտ հավասարություն. $1\frac{5}{16} * 1\frac{11}{24} = \frac{9}{10}$:

(u) + (p) - (q) : (n) x :

5. Հաշվել արտահայտության արժեքը. $1\frac{6}{7}-3,6:4,2:$

$$\mathfrak{w}$$
) $-1\frac{26}{35}$, \mathfrak{p}) $-2\frac{9}{35}$, \mathfrak{q}) 1, \mathfrak{q}) $2\frac{5}{9}$:

- **6.** Առաջին գնորդը գնեց 50 մ կտորի 20%-ը, երկրորդը՝ մնացածի 30%-ը։ Երկրորդ գնորդը ամբողջ կտորի ո՞ր տոկոսը գնեց։
 - **w**) 30 **p**) 12 **q**) 24 **η**) 80:
- 7. Գանել $\left|-1-2a\right|+\left|a\right|$ արտահայտության արժեքը, եթե $a=-1\frac{1}{3}$:
 - $u_1 3 \quad p_1 \quad 3 \quad q_1 \quad 1 \quad q_1 \quad 5 :$
- 8. Ի՞նչ թվանշանով է վերջանում $11 \cdot 13 \cdot 15 \cdot 17 \cdot ... \cdot 27 \cdot 29$ արտադրյալը։
 - $u_1 1 p_1 3 q_1 5 \eta_1 6$:
- 9. b -ի ի՞նչ արժեքի դեպքում -x+8=a+b+1 հավասարման արմատր a -ի հակադիրն է։
 - u) 7 p) -7 q) 7-2a η) -7-2a :
- **10.** Գտնել -x+3>-11,4 անհավասարման ամենափոքր բնական յուծումը:
 - ա) 15 p) 9 q) 1 դ) չունի :
- 11. a -ի ի՞նչ արժեքների դեպքում |x|-2=1-a հավասարումն ունի արմատ։
 - u) a > 3 p) a ≥ 3 q) a ≥ -1 η) a ≤ 3:
- **12.** ABC հավասարասրուն եռանկյան $\angle A=120^{0}$ ։ Գտնել այդ եռանկյան BE բարձրությունը, եթե BC=8:
 - u) 16 p) 4 q) 3 η) 6:
- 13. Տրված է չորս թիվ. 25, 40, 12 և 18։ Գտնել այդ թվերից ամենամեծի և ամենափոքրի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։
 - $u) 120 \quad p) 4 \quad q) 2 \quad p) 5$:
- **14.** ABC եռանկյան A և B անկյունների կիսորդները հատվում են M կետում։ Գտնել \angle AMB-ն, եթե \angle C=90 0 :
 - u) 90^{0} p) 120^{0} q) 135^{0} h) 45^{0} :
- **15.** Գանել –x+3>-11,4 անհավասարման ամենամեծ բնական լուծումը։
 - ա) չունի p) 8 q) 1 դ) 14 :
- 16. a -ի ինչպիսի՞ արժեքների դեպքում |x|-2=1-a հավասարումն ունի երկու արմատ։
 - u) a > 3 p) $a \ge 3$ q) a < 3 n) $a \le 3$:
- 17. b -ի ի°նչ արժեքի դեպքում -x+8=a+b+1 հավասարման արմատը (-a-7)–ն է։

- u) 14 p) 0 q) 2a η) 2a+14:
- 18. ABC եռանկյան AB կողմի վրա տրված է M կետը։ Հայտնի է, որ ACM և BCM եռանկյունների պարագծերի գումարը 84 է, իսկ ABC եռանկյան պարագիծը հավասար է 60-ի։ Գտնել CM հատվածի երկարությունը։
 - ա) 24 p) 12 գ) հնարավոր չէ դ) 144 :
- 19. a -ի ինչպիսի՞ արժեքների դեպքում |x|-2=1-a հավասարումն ունի մեկ արմատ։
 - u) a > 3 p) $a \ge 3$ q) a < 3 n) a = 3:
- **20.** ABC եռանկյան AB կողմի վրա տրված է M կետը։ Հայտնի է, որ AM=BM=CM: Գտնել (\angle A+ \angle B)-ն:
 - ա) հնարավոր չէ \vec{p}) 60^{0} \vec{q}) 90^{0} $\vec{\eta}$) 120^{0} :

9-րդ դասարան (առաջին փուլ)

- 1. Դիցուք x<4: Կարո՞ղ ենք պնդել, որ՝ ա) $x^2 < 10$ p) $x^2 > 0$ q) $x^2 \ge 0$ դ) $x^2 < 20$:
- 2. Ո՞ր թիվն է ավելի մեծ՝

u)
$$5^{-6}:5^{-8}$$
 p) $6^{-3}:6^{-4}$ q) $\left(\frac{1}{3}\right)^{-4}\cdot\left(\frac{1}{3}\right)^{3}$ η) $\left(2,1\right)^{0}-\left(-0,2\right)^{-3}:$

3. Հաշվել $\sqrt{3-\left(2\sqrt{21}-7\right)}$ արտահայտության արժեքը։

u)
$$\sqrt{3} - \sqrt{7}$$
 p) 4 q) $\sqrt{7} - \sqrt{3}$ η) $\sqrt{-4 - 2\sqrt{21}}$:

4. Կատարել գործողությունը. $\left[2;\frac{17}{3}\right] \cap \left[1;\frac{26}{5}\right]$:

$$\mathfrak{w})\left[2;\frac{26}{5}\right] \mathfrak{p})\left[2;\frac{17}{3}\right] \mathfrak{q})\left[1;\frac{17}{3}\right] \mathfrak{q})\left[1;\frac{26}{5}\right]:$$

5. And $\int (2x+6) \cdot x = 0$ has a hamiltonian $x \cdot (x^2-9) = 0$

$$u_1$$
) -3;0 p_2) -3;0;3 q_2) -3;3 q_3) 0:

6. Տուրիստն, օրական 8 ժամ ճամփորդելով, 5 օրում անցավ 160կմ։ Օրական քանի՞ ժամ նա պետք է գնա, որպեսզի 10 օրում անցնի 280կմ։

$$u$$
) 8 p) 6 q) 5 η) 7:

- 7. Թղթի 200 թերթից պատրաստեցին 7 թերթից կազմված տողանի և 11 թերթից կազմված վանդակավոր տետրեր՝ ընդամենը 24 հատ։ Քանի՞ թերթ ավել օգտագործվեց տետրերի մի տեսակը պատրաստելու համար քան մյուսի։
 - $u) 24 p) 7 q) 11 <math>\eta) 200$:
- 8. Ո՞ր ուղղի վրա է գտնվում A(2;-1) կետր.

u)
$$y=x+3$$
 p) $x+y=1$ q) $y-x=1$ n) $y=3-x$:

9. Գտնել $5x+2-5x^6-5x^3-x+x^6+4x^3+2x^6+1$ բազմանդամի ավագ անդամի գործակցի և ազատ անդամի գումարը:

$$u(1) 1 p(1) - 4 q(1) 3 q(1) - 1$$
:

10. Ուղղանկյան երկարությունը և լայնությունը մեծացրին 10%։ Քանի՞ %-ով մեծացավ ուղղանկյան մակերեսը։

11. Ավազանի երկարությունը 3մ է, լայնությունը՝ 2մ, իսկ բարձրությունը՝ 170սմ։ Որքա՞ն ջուր է անհրաժեշտ ավազանը լցնելու համար։

u)
$$10.2 \text{ ud}^3 \text{ p}$$
) 1020 p q) $1020 \text{ d}^3 \text{ p}$) 10200 p :

12. Ամենաշատը քանի՞ հատման կետեր կարող են առաջանալ 5 ուղիդների հատումից։

13. 2008 թիվը տարբեր բնական թվերի բաժանելիս ի՞նչ ամենամեծ մնացորդ կարող է ստացվել։

u) 2008 p) 41 q) 34
$$\eta$$
) 42:

14. 3 սեխը և 4 ձմերուկը միասին կշռում են 12կգ 500գ, իսկ 4 սեխը և 3 ձմերուկը՝ 12կգ։ Որքա՞ն կկշռեն 5 սեխը և 6 ձմերուկը միասին։

15. Ո՞ր խմբում են թվերը դասավորված աճման կարգով.

u)
$$4\sqrt{2}; 3\sqrt{3}; 2\sqrt{6}$$
 p) $5\sqrt{4}; 7\sqrt{3}; 9\sqrt{2}$
a) $-5\sqrt{3}; -6\sqrt{2}; -7\sqrt{4}$ n) $3\sqrt{5}; 4\sqrt{4}; 5\sqrt{2};$

16. Ուղղանկյուն եռանկյան էջերի գումարը 7 է, իսկ պարագիծը՝ 12։ Գտնել եռանկյան մակերեսը։

17. $x^2 \le 4$ անհավասարման լուծումն է.

u)
$$x < 4$$
 p) $x \le 2$
q) $x \in [-2; 2]$ q) $x \in (-\infty; -2] \cup [2; +\infty)$:

18. Գտնել $|6x+9| \le 12$ անհավասարման ամբողջ լուծումների քանակը:

$$u(3 p) 5 q) 6 \eta) 4$$
:

- **19.** Ինչի՞ է հավասար եռանկյան անկյան մեծությունը, եթե նրա մյուս երկու անկյունների կիսորդների հատումից առաջացած անկյունը 80° t:

7-րդ դասարան (երկրորդ փուլ)

- Գանել $\left|5x-\left(2x-3\left(1-3x\right)\right)\right|$ արտահայտության արժեքը, եթե $x = 3\frac{1}{6}$:
- Թարմ ծիրանր պարունակում է 80% ջուր։ Չորագնելիս ծիրանր կորգնում է իր քաշի 2/3-ր։ Քանի՞ % ջուր է պարունակում չորացրած ծիրանը։
- երևանից Ստեփանակերտ 410կմ է։ Ավտոբուսը գնում էր 60կմ/ժ 3. արագությամբ և 5 անգամ կանգառ կատարեց 14-ական րոպե տևողությամբ։ Քանի՞ ժամ տևեց երթուղին։
- Գանել 2, -3, 4, -7 թվերի միջին թվաբանականի և $4,3x + \frac{1}{2} = -1,2x-5$ 4. հավասարման լուծման գումարը։
- Երկու բանվորներ միասին կարող են աշխատանքը կատարել $2\frac{2}{5}$ 5. օրում։ Առաջինը կարող է այդ աշխատանքը կատարել 4 օրում։ Քանի՞ օրում այդ աշխատանքը կարող է կատարել երկրորդ բանվորը։
- 6. hnun ետևից գրված են 1-ից 1000 բնական թվերը (123456789101112131415...): N°n phulipulli t anhud 2008-nn տեղում:
- Մեկ ժամում բանվորների խումբը կատարեց աշխատանքի կեսը։ 7. Աշխատանքի մնացած մասը կատարեց մեկ բանվորը չորս ժամում։ Գտնել խմբում եղած բանվորների քանակը։
- Ուղղանկյան պարագիծը 24սմ է։ Գտնել ուղղանկյան մակերեսը, 8. եթե նրա երկարությունը երկու անգամ մեծ է լայնությունից։

8-րդ դասարան (երկրորդ փուլ)

- 1. Վերլուծել արտադրիչների. $(a+3b)(3b-a)-(3b-2a)^2$:
- 2. Նավակը 1 ժամում գետի հոսանքի ուղղությամբ անցավ 15կմ, իսկ հակառակ ուղղությամբ նույնպես 1 ժամում նավակն անցավ 7կմ։ Որոշել նավակի սեփական արագությունը։
- 3. Գտնել բոլոր \overline{ab} երկնիշ թվերը, եթե հայտնի է, որ $\overline{ab} = 4(a+b)$:
- 4. Դիցուք AD-ն ABC եռանկյան կիսորդն է։ Գտնել BC:AD, եթե հայտնի է, որ \angle C=3 \angle B, \angle A=2 \angle B:
- 5. Հոր տարիքը 5–ով մեծ է իր երեք որդիների տարիքների գումարից։ Հայրը երկու անգամ մեծ կլինի իր մեծ տղայից 10 տարի հետո, միջնեկ տղայից` 20 տարի հետո, իսկ փոքր տղայից` 30 տարի հետո։ Քանի՞ տարեկան է այժմ միջնեկ տղան։
- 6. Գտնել չկրկնվող կենտ թվանշաններ ունեցող բոլոր եռանիշ թվերի ա) քանակը, բ) գումարը։
- 7. AB=BC կողմերով ABC հավասարասրուն եռանկյան ներսում տրված է M կետը։ Ապացուցել, որ 2MB+MA>MC։

9-րդ դասարան (երկրորդ փուլ)

- 1. Հաշվել $\left(\sqrt{3}+\sqrt{5}\right)^2+\left(\sqrt{15}-1\right)^2$ արտահայտության արժեքը։
- A, B և C կետերը գտնվում են O կենտրոնով շրջանագծի վրա։
 Գտնել ABC անկյունը, եթե ∠AOC=164⁰, իսկ B և O կետերը գտնվում են AC ուղղի տարբեր կողմում։
- 3. Գանել $\frac{b+a}{b-a}$ արտահայտության արժեքը, եթե $4a^2+b^2=4ab$ և $a\neq b$:
- **4.** Եղբայրը 16 տարեկան է, իսկ քույրը՝ 10։ Ամենաքիչը քանի՞ տարի հետո նրանց տարիքների գումարը 5-ի բաժանելիս մնագորդում կստացվի 1, իսկ 6-ի բաժանելիս՝ 4։
- **5.** Ապացուցել, որ 2-ի երկու հաջորդական բնական աստիճանների գումարը բաժանվում է 6-ի։
- 6. Գտնել համակարգի ամենափոքր և ամենամեծ ամբողջ լուծումները.

$$\begin{cases} |x| \ge 4 \\ \sqrt{x-1} \le 3 \end{cases}$$
:

7. Առաջին տեսակի ապրանքը արժե 50 դրամ, իսկ երկրորդ տեսակը՝ 70 դրամ։ Ամենաշատը քանի՞ ապրանք կարելի է գնել՝

- վճարելով 8800 դրամ՝ պարտադիր գնելով և առաջին, և երկրորդ տեսակների ապրանքներից։
- 8. Տրված է ABCD ուղղանկյունը։ M կետը վերցված է այնպես, որ CM-ը գուգահեռ է BD-ին և BM=DM։ Ապագուցել, որ ∠BMD>90°:

2009 թ. 7-րդ դասարան (առաջին փուլ)

- 1. Ուղղանկյունաձև այգու երկարությունը և լայնությունը համապատասխանաբար հավասար են 480 մ և 125 մ։ Քանի՞ հեկտար է այգու մակերեսը։
- 2. $\frac{1}{7}$ և $\frac{2}{7}$ կոտորակների միջև գտնել 9 հայտարար ունեցող կոտորակ։
- 3. Տղան կարդաց 15 էջ, որը կազմում էամբողջ գրքի էջերի 20%-ը։ Քանի՞ էջ ունի գիրքը։
- 4. Երկու թվերի գումարը 160 է։ Մի թիվը կազմում է գումարի 25%-ը։ Գանել մյուս թիվը։
- 5. Գնեցին վերնաշապիկ և փողկապ։ Վերնաշապիկի համար վճարեցին 9000 դրամ, որը կազմում է ամբողջ վճարած գումարի $\frac{3}{4}$ -ը։ Որքա $^{\circ}$ ն արժե փողկապը։
- 6. Թիվը փոքրացրեցին իր $\frac{3}{10}$ մասով ստացվեց 280։ Գտնել այդ թիվը։
- 7. 0,1,2,3 թվանշաններով գրել ամենափոքր վեցանիշ թիվը՝ յուրաքանչյուր թվանշան օգտագործելով ամենաքիչը մեկ անգամ։
- 8. Գտնել 45 և 60 թվերի բոլոր ընդհանուր բաժանարարների քանակր։
- 9. Դիցուք a–ն 2, 3, 4–ի վրա բաժանվող ամենափոքր բնական թիվն է, իսկ b–ն 2,5,25–ի վրա բաժանվող ամենափոքր բնական թիվն է։ Գտնել a+b :
- 10. Գտնել 1 և 0 թվանշաններով գրվող, 15-ին բազմապատիկ ամենափոքր բնական թիվը։
- 11. Իրար հետևից գրված են 1-ից 99 բոլոր բնական թվերը։ Քանի՞ անգամ է գրված 2 թվանշանը։

$$u'/20$$
 p/10 q/21 $\eta/9$

12. Գտնել բաժանելին, եթե քանորդը հավասար է 16-ի, բաժանարարը 19-ի, իսկ մնացորդը 13-ի։

13. Հաշվել 250-ի 1/5 մասի 20 տոկոսի 20 տոկոսը։

$$u$$
/ 20 p / 2 q / 10 q / 4

14. Նավակի արագությունը հոսանքի ուղղությամբ 24,6 կմ/ժ է, իսկ հոսանքին հակառակ՝ 18,4 կմ/ժ։ Գտնել նավակի սեփական արագությունը։

$$u'$$
 3,1 $y d/d$ p/ 21,5 $y d/d$ q/ 3,4 $y d/d$ n/ 21,6 $y d/d$

15.
$$\leq \text{min} = \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{2}}}$$
:
$$\frac{1}{1 + \frac{1}{2}} = \frac{1}{1 + \frac{1}{2}}$$

16. Գանել հետիոտնի արագությունը, եթե նա 2,4 ժամում անցել է 10,8 կմ։

$$u/7,5 \, d/p \, p/4,5 \, d/p \, q/75 d/p \, n/80 d/p$$

17. Ընդհանուր քանակով18 եռանկյուն ու քառանկյուն միասին ունեն 62 կողմ։ Գանել եռանկյունների քանակը։

$$u/ 8 p/ 12 q/ 10 \eta/ 14$$

18. Տրված են A կետի L AB հատվածի C միջնակետի կոորդինատները՝ A(-0,5) և C(5) : Գտնել B կետի կոորդինատը:

$$u/ 9,5 p/ 10,5 q/ 10 \eta/ -6$$

19. Առաջին հողափոր մեքենան կարող է ջրատարը փորել 30, իսկ երկրորդը՝ 20 ժամում։ Սկզբում առաջինը մենակ աշխատեց 9 ժամ, այնուհետև մնացած աշխատանքը կատարեց միայն երկրորդը։ Քանի՞ ժամում կատարվեց աշխատանքը։

$$u/$$
 14 $p/$ 50 $q/$ 9 $\eta/$ 23

20. Z աշվել (4,28+3,6(-0,85))։(-0,4) արտահայտության արժեքը։

$$m/ -16,745$$
 $p/ -3,05$ $q/ 7,65$ $\eta/ 3,05$

8-րդ դասարան (առաջին փուլ)

- 1. Ամռանը հանգստանալու գնացին դպրոցի աշխատակիցների 15%-ը։ Քանի՞ աշխատակից ունի դպրոցը, եթե հանգստացողների թիվը 9 էր։
- 2. Ուղղանկյունաձև հողամասի երկարությունը և լայնությունը հավասար են 30 մ և 25 մ։ Արտահայտել հողամասի մակերեսը ար-ով։

- 3. Լողավազանի հատակը ուղղանկյունաձև է, որի կողմերն են 3մ և 4մ։ Քառաուսու ձև ունեցող 50սմ կողմով քանի՞ սալիկ է անհրաժեշտ հատակը սալիկապատելու համար։
- 4. Մարիամը առաջին օրը կարդաց գրքի $\frac{2}{5}$ մասը, երկրորդ օրը՝ $\frac{1}{5}$

մասը, իսկ մնացածը նա կարդաց երրորդ օրը։ Մարիամը գրքի ո՞ր մասր կարդաց երրորդ օրը։

- 5. Արամը գնեց 0,25 մ ժապավեն, իսկ Անուշը՝ 0,2 մ։ Նրանք միասին վճարեցին 180 դրամ։ Որքա՞ն արժե 1 մ ժապավենը։
- 6. Առաջին օրը տուրիստն անցավ ճանապարհի $\frac{2}{5}$ մասը, իսկ երկրորդ

օրը՝ մնացած 15 կմ-ը։ Որքա՞ն էր ամբողջ ճանապարհը։

- 7. Գտնել հավասարասրուն եռանկյան հնարավոր ամենամեծ պարագիծը, եթե սրունքը 7 է, իսկ հիմքի երկարությունը արտահայտվում է ամբողջ թվով։
- 8. Արամը հաշվում է էլեկտրոնային ժամացույցի էկարնի վրա գրված թվանշանների գումարը։ Ի՞նչ մեծագույն թիվ նա կարող է ստանալ (օրինակ 23:41-ի դեպքում թվանշանների գումարը հավասար է 10)։
- 9. 59876 թվի գրառման մեջ օգտագործվել է 5 հաջորդական թվանշաններ։ Գտնել նման հատկությամբ օժտված հաջորդ բնական թիվը։
- 10. Գանել (m-3n)(m+2n)-m(m-n) արտահայտության արժեքը, եթե m=-124,5 և n=-3:
- 11. Քանի՞ ձևով 2009 թիվը կարելի է ներկայացնել երկու պարզ թվերի գումարի տեսքով։

ա/ 0 p/1 q/2 $\eta/3-hg$ ավելի

12. Գանել անհավասարման բնական լուծումների քանակը.

$$\frac{x}{2} - \frac{x}{4} < 10$$

w/ 1 p/ 40 q/ 39 n/ 9

13. Գանել $\frac{a^2-1}{a-b} \cdot \frac{8a-8b}{a^2+a}$ արտահայտության արժեքը, երբ a=4:

ખ/ 8 p/ 4 - b q/ 3 n/ 6
14. Հաշվել.
$$(-1)^2 + (-2)^3 + (-3)^2 + (-4)^3 + (-5)^2 + (-6)^3$$
 w/ -1 p/ 1 q/ -253 n/ 323
15. Հաշվել. $||-1-6|+3|-4\cdot|-3|-|8|$

$$u/$$
 11 $p/$ -10 $q/$ 14 $\eta/$ 10

16. Դիցուք a+b>0 և a-b>0։ Այդ դեպքում՝

$$\mathbf{u}/a > 0$$
 $\mathbf{p}/b > 0$ $\mathbf{q}/b < 0$ \mathbf{n}/\mathbf{u} \mathbf{u} \mathbf{u} \mathbf{u}

17. Lπιδτι
$$\left| \frac{x}{2} - \frac{x}{3} \right| = 1$$
 hավասարումը:

$$u/ 6 p/ -6 q/ -6; 6 \eta/ -1; 1$$

18. ABC եռանկյան A անկյունը 2 անգամ մեծ է B անկյունից, իսկ C անկյունը 3 անգամ մեծ է A անկյունից։ Գտնել ABC եռանկյան ամենամեծ անկյունը։

$$m/80^{0}$$
 $p/100^{0}$ $q/140^{0}$ $\eta/120^{0}$

19. Ուղղանկյուն եռանկյան փոքր էջը հավասար է 4-ի, իսկ սուր անկյուններից մեկը՝ 30⁰-ի։Գտնել ուղիղ անկյան գագաթից տարված միջնագծի երկարությունը։

$$m/$$
 8 $p/$ 12 $q/$ 4 $\eta/$ 2

20. ABC հավասարասրուն եռանկյան CD կիսորդը հավասար է BC հիմքին։ Գանել CDA անկյան մեծությունը։

9-րդ դասարան (առաջին փուլ)

- 1. Թարմ խոտը չորացնելիս կորցնում է իր քաշի 80%-ը։ Ինչքա $^\circ$ ն թարմ խոտ է պետք հնձել 8 տ չոր խոտ ստանալու համար։
- 2. Ակվարիումի երկարությունը, լայնությունը և բարձրությունը համապատասխանաբար հավասար են 50 սմ, 20 սմ և 24 սմ։ Ակվարիումի ծավալն արտահայտել լիտրերով։
- 3. 0,5 և 0,6 թվերի միջև գտնել 7 հայտարարով կոտորակ։
- 4. Առաջին տրակտորիստը վարեց դաշտի $\frac{2}{7}$ մասը, երկրորդը՝ $\frac{3}{7}$

մասը։ Նրանք միասին վարեցին 10հա։ Քանի՞ հա է դաշտը։

5.
$$\Omega^{\circ}$$
րն է մեծ 45 րոպեի $\frac{3}{5}$ -ը, թե 1 ժ 30 րոպեի $\frac{4}{15}$ -ը։

6. Հաշվել
$$\left(\frac{a^{-3}b^2}{9}\right)^{\!-2}\cdot \left(\frac{3}{a^{-2}b^3}\right)^{\!-3}$$
 արտահայտության արժեքը, երք

7. Լուծել $|6x+9| \le 12$ անհավասարումը։

8. Հաշվել.
$$\left(\sqrt{7+\sqrt{13}}+\sqrt{7-\sqrt{13}}\right)^2$$
:

- 9. 1 օրվա ընթացքում քանի՞ անգամ է էլեկտրոնային ժամացույցի էկրանի վրա գրված ժամերի և րոպեների թվանշանների գումարը հավասար 23:
- 10. Գտնել 2009 անկյուն ուռուցիկ բազմանկյան բոլոր անկյունագծերի բանակը:
- 11. Գնել 1–ով և 0-ով գրվող, 225-ին բազմապատիկ փոքրագույն բնական թվի թվանշանների քանակը։

$$u$$
/ 10 p / 11 q / 12 q / 13

12. Դասարանում կա 9 տղա և 13 աղջիկ։ Այդ դասարանի աշակերտների կեսը լավ է սովորում։ Աղջիկներից առնվազն քանի՞սն են լավ սովորում։

$$u/0$$
 $p/1$ $q/3$ $n/2$

13. Գտնել համակարգի լուծումների քանակը.

$$\begin{cases} x \le 7 \\ x \in \{2,3,4,5,6,7,8\} \\ \text{ut} & 6 \text{ pt} & 1 \text{ qt} & 7 \text{ rs} \end{cases}$$

$$\mathfrak{w}/$$
 1 $\mathfrak{p}/$ 5 $\mathfrak{q}/$ 4 $\mathfrak{n}/$ 3

15. Գանել համախմբի ամենամեծ ամբողջ լուծումը.

$$\begin{bmatrix} x = 7 \\ x \in (7;10) \\ x \in [10;12) \end{bmatrix}$$

16. Գտնել (1;2) կետին համաչափ կետը x=2 ուղղի նկատմամբ։

$$u'$$
 (1;-2) p' (2;2) q' (2;3) η' (3;2)

17. a > 9 բնական թվի վերջին թվանշանը ջնջել են և ստացել b թիվը:

Գանել $\frac{a}{b}$ –ի մեծագույն արժեքը։

$$m/9$$
 $p/10$ $q/19$ $\eta/20$

18. Ուղղանկյուն սեղանի մեծ անկյունագիծը $\sqrt{185}\,$ է, իսկ հիմքերը $5\,$ և 11։ Գտնել սեղանի մակերեսը։

19. Զուգահեռագծի պարագիծը 84 է, իսկ բարձրությունները հարաբերում են ինչպես 3:4։ Գտնել զուգահեռագծի մեծ կողմը։

20. Եռանկյան կողմը 60 սմ է, իսկ նրան տարված բարձրությունը և միջնագիծը համապատասխանաբար հավասար են 12 սմ և 13 սմ։ Գտնել եռանկյան փոքր կողմը։

ա/
$$\sqrt{751}$$
 սմ p/ 27 սմ q/ 28 սմ η / $\sqrt{769}$ սմ 7-րդ դասարան (երկրորդ փուլ)

1. Գանել թվային արտահայտության արժեքը.

$$5\frac{4}{7}:1\frac{5}{21}-\left(5\frac{2}{15}\cdot\frac{3}{22}+1\frac{14}{15}\right)$$

- 2. Կոտորակի համարիչի ու հայտարարի գումարը 32 է։ Համարիչը 2-ով փոքր է հատարարից։ Գտեք այդ կոտորակը։
- 3. Լուծել հավասարումը.

$$2(x+2)-3(x-2)=5-4(3x-1)$$

- 4. Երկու թվերի տարբերությունը 20 է։ Նրանցից մեկը մյուսից 40%-ով մեծ է։ Գտեք փոքր թիվը։
- 5. Գյուղից դեպի քաղաք դուրս եկավ հետիոտնը։ Միաժամանակ քաղաքից դեպի գյուղ մեկնեց հեծանվորդը։ Հետիոտնը քաղաք հասավ 6, իսկ հեծանվորդը գյուղ՝ 3 ժամում։ Շարժման սկզբից քանի՞ ժամ հետո են նրանք հանդիպել։
- 6. 2 տարի առաջ Արմենը 20%-ով փոքր էր, քան այժմ։ Քանի՞ տարեկան է այժմ Արմենը։
- 7. Կոնֆետի մեծ տուփը երկու անգամ թանկ է փոքրից։ Ցանկանում են գնել 3 մեծ և 2 փոքր տուփ, բայց եթե գնեն 2 մեծ և 3 փոքր տուփ, ապա գնումը 1500 դրամով էժան կլինի։ Որքա՞ն արժե մեծ տուփը։
- 8. Կոորդինատային հարթության վրա պատկերեք A(5;3), B(-2;3), C(-2;-2), D(5;-2) գագաթներով ABCD ուղղանկյունը։ Հաշվել այդ ուղղանկյան պարագիծն ու մակերեսը։

8-րդ դասարան (երկրորդ փույ)

1. Արշավի ժամանակ 4 օրում օգտագործվեց նախատեսված սննդամթերքի $\frac{2}{5}$ մասը։ Քանի $^\circ$ օրվա համար էր նախատեսված ամբողջ սնունդը։

2. Կատարել գործողությունները.

$$\frac{x^2 + 2xb + b^2}{4 - y^2} : \frac{b + x}{2 + y} :$$

- 3. Եղբոր տարիքը 2 տարի առաջ 2 անգամ փոքր էր, քան նա կդառնա 2 տարի հետո։ Քույրը 3 տարի հետո 3 անգամ մեծ կլինի քան նա 2 տարի առաջ էր։ Ո՞վ է նրանցից մեծը։
- 4. Գտնել 3–ին բազմապատիկ քառանիշ թվերը, որոնք ստացվում են 23-ին միևնույն թվանշանը աջից և ձախից կցագրելով։
- 5. y-ի n°ր արժեքների դեպքում 2-3y երկանդամի արժեքները գտնվում են [-7;-1) բազմությունում։
- 6. Գտնել անհավասարման բնական լուծումները.

$$\frac{3+y}{4} - \frac{y-2}{3} > 1$$
:

- 7. ABC հավասարասրուն սուրանկյուն եռանկյան AB և AC սրունքներին տարված բարձրությունները հատվում են M կետում։ Գտնել եռանկյան անկյունները, եթե \angle BMC= 140° :
- 8. ABC ուղիղ անկյունը BD ճառագայթով բաժանված է երկու անկյունների՝ 5:4 հարաբերությամբ։ Գտնել BD ճառագայթի և ABC անկյան կիսորդի կազմած անկյունը։

9-րդ դասարան (երկրորդ փուլ)

- 1. Հաշվել 1-2+3-4+5-6+...+999-1000
- 2. 101-ը ո բնական թվի վրա բաժանելիս ստացված մնացորդը քանորդի 20%-ն է։ Գտնել ո-ը։
- 3. Եթե բնական թվին գումարենք 5, ապա այն առանց մնացորդի կբաժանվի 9-ի։ Ի՞նչ մնացորդ կստացվի եթե սկզբնական թիվը բաժանենք երեքի։

4. Հաշվել
$$\sqrt{\left(16+\sqrt{257}\right)^2}+\sqrt{\left(16-\sqrt{257}\right)^2}$$
 :

- 5. Դասարանի աշակերտների 30%-ը և ևս 5 աշակերտ խաղում են շախմատ, իսկ $\frac{3}{8}$ -րդ մասը և ևս 8 աշակերտ՝ վոլեյբոլ։ Քանի՞ աշակերտ է սովորում դասարանում։
- 6. x-ի ո՞ր արժեքների դեպքում 2|x|-3 արտահայտության արժեքները գտնվում են (-7;-1] միջակայքում։

7. A և B քաղաքներից իրար հանդեպ շարժվեցին երկու ավտոմեքենա՝ համապատասխանաբար 50կմ/ժ և 70կմ/ժ հաստատուն արագություններով։ Առաջին ավտոմեքենայի դուրս գալուց 6 ժ հետո նրանք


հանդիպեցին։ Որոշել քաղաքների միջև եղած հեռավորությունը, եթե
հայտնի է, որ առաջինը երկրորդից մեկ ժամ շուտ է դուրս եկել:
8. Ջուգահեռագծի բարձրություններն են 6 սմ և 4 սմ, իսկ պարագիծը
42 սմ։ Գտեք զուգահեռագծի մակերեսը։
2010 p.
7-րդ դասարան (առաջին փուլ)
1. Գտնել 84 և 294 թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։
ui) 14 n) 42 o) 21 n) 84
2. Հաշվել արտահայտության արժեքը. $3-5\frac{3}{5}:1\frac{1}{3}$ \cdot 2,5:
w) 17p) 3q) -3η) 5
3. Գանել 19-ից փոքր պարզ թվերի քանակը։
u) 7 p) 8 q) 9 n) 10
4. Գանել 6 հայտարարով բոլոր կանոնավոր կոտորակների գումարի
հակադարձը։
w) -2,5 p) -0,4 q) 2/7 η) 0,4
5. Գանել 16-ի 3/4 մասի 25 տոկոսը։
u) 12 p) 6 q) 3 n) 48
6. Հետևյալ թվերից ո՞րն է բաժանվում և 4-ի, և 6-ի։
ш) 1096 р) 1596 q) 226 q) 3244
7. $\text{Quality}(2x+2x+2x+2x+y+y+y+y+y-p}, \text{ tpt } x=-1,25 \text{ tr} y=-0,2:$
ш) -11 p) -9 q) 11 η) 10
8. 225կմ/ժ արտահայտել մ/ր-ով։
w) 147 p) 135 q) 375 n) 3750
9. 1ց 12գ արտահայտել կգ-ով։
ա) 112 կգ թ) 1000,012կգ գ) 100,012կգ դ) 100,0012կգ
10. 10-ից 30 թվերի միջև 6-ի հետ փոխադարձաբար պարզ քանի՞ թիվ
ųш:
w) 6 p) 7 q) 8 η) 5
11. Ուղղանկյան երկարությունը 12սմ է, իսկ լայնությունը՝ 5սմ։ Քանի/
%-ով պետք է մեծացնել ուղղանկյան լայնությունը, որպեսզի նրա

մակերեսը դառնա 72սմ²։

q) 10 n) 50 **w**) 20 p) 25

- 12. Ծորակը ավազանի 2/3 մասը լցնում է 12 ժամում։ Քանի՞ ժամում կլցվի ավազանի կեսը։
- w) 10 p) 8 q) 18 η) 9
- 13.Ուղղի վրա նշված է 4 կետ։ Քանի՞ հատված կա, որոնց ծայրակետերը այդ կետերից են։
- u) 4 p) 5 q) 3 n) 6
- 14. Երկու վայրերի միջև եղած հեռավորությունն ավտոմեքենաներից մեկն անցնում է 2ժ-ում, իսկ մյուսը՝ 3ժ-ում։ Քանի՞ րոպեից նրանք կհանդիպեն, եթե միաժամանակ շարժվեն իրար հանդեպ այդ վայրերից։
- u) 360 p) 6 q) 1,2 n) 72
- 15. Գտնել 12-ի բնական բաժանարարների քանակր։
- u) 6 $p) 5 q) 4 <math>\eta) 3$
- 16. Երկնիշ թվերի քանի՞ %-ն է բաժանվում 5-ի։
- w) 10 p) 20 q) 25 η) 50
- 17. Հատվածի երկարությունը 75սմ-ից փոքր ամբողջ թիվ է։ Այն կարելի է բաժանել ամբողջ թվով երկարությամբ երկու, երեք կամ հինգ հավասար հատվածների, բայց հնարավոր չէ բաժանել ամբողջ թվով երկարությամբ չորս հավասար մասերի։ Քանի՞ սմ է հատվածի երկարությունը։
- u) 60 p) 30 q) 72 n) 70
- 18. Նվազելին՝ մեծացրին 15-ով։Ինչպե՞ս պետք է փոխել հանելին, որպեսզի տարբերությունը փոքրանա 21-ով։
- ա) փոքրքցնել 36-ով թ) մեծացել 36-ով
- գ) մեծացել 6-ով դ) փոքրացնել 6-ով
- 19. Նավակը հոսանքի ուղղությամբ 60կմ-ը անցնում է 6 ժամում։ Նավակը որքա՞ն ժամանակում կանցնի այդ հեռավորությունը հոսանքի հակառակ ուղղությամբ, եթե հոսանքի արագությունը 3կմ/ժ է։
 - u) 7 d 30 p p) 30 d q) 8 d n) 15 d
- 20. A-ից B հասնելու համար յուրաքանչյուր հատվածում անհրաժեշտ է հաղթահարել նշված թվով արգելքներ։

Ամենաքիչը քանի՞ արգելք հաղթահարելով կարելի է A-ից հասնել B:




ພ) 11 p) 8 q) 10 η) 3

8-րդ դասարան (առաջին փուլ)
1. Հաշվել արտահայտության արժեքը.
$$\left|1\frac{1}{8}-2\frac{1}{7}\right|:\frac{1}{56}$$

ພ) 29 p) 57 q) $\frac{1}{56}$ η) 1

2. Գումարեք մեծությունները. 3 մ + 150սմ ա) 153սմ p) 4,5ℷմ q) 18դմ η) 4,5դմ 3. Գրվածներից քանի՞սն է ճիշտ.

1) $x+3>x+1$ 2) եթե $x+2< y+1$, ապա 3) եթե $x<0$ և $y>0$ ապա $x+(-y)<0$



3) tipt
$$x < 0$$
 to $y > 0$, which $x + (-y) < 0$

4) tipt
$$x > 0$$
, with $x = x > 0$, with $x(x-1) > 0$
w) 1 p) 2 q) 3 n) 4

4. Քանի՞ երկնիշ թիվ կա, որոնց աջից 0 կցագրելուց և 91 հանելուց հետո կստացվի երկնիշ թիվ։

5. Գտնել 84-ի և 90-ի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարի $\frac{4}{3}$ մասը։

6. Լուծել անհավասարումը. $3 - y - \frac{y+2}{4} > 2,5$

u)
$$y < -4$$
 p) $y > -4$ q) $y < 0$ η) $y > 0$

7. Քանի՞ տարր ունի $\{x+y+z\}igcup \{y+ig|zig|-ig|xig|\}$ բազմությունը, եթե x < -1 l. z > 1

8. Գտնել |x-y|+x+y արտահայտության արժեքը, եթե ${x;y} \cap {1;2;3} = {1;2}$:

$$\{x;y\} \cap \{1;2;3\} = \{1;2\}:$$

ա) 2 p) 4 q) 2 կամ 4 դ) 6 9. a –ի ի՞նչ արժեքների դեպքում 1-ը ax = a հավասարման արմատ **5‡**:

$$\mathbf{w}) \text{ hpp } a = 0 \qquad \qquad \mathbf{p}) \text{ hpp } a \neq 0$$

գ) ցանկացած a-ի դեպքում դ) այդպիսի a չկա 10.Վերլուծել արտադրիչների. $\left(4x-y\right)^2-\left(2x+3y\right)^2$

u)
$$4(x-2y)(3x-2y)$$
 p) $4(x+y)(3x+y)$

q)
$$4(x+y)(3x-2y)$$
 q) $4(x-2y)(3x+y)$

11.Գումարեք կոտորակները. $\frac{1}{a^2 + ab} + \frac{1}{b^2 + ab}$

$$\mathbf{u}) \ \frac{2}{(a+b)^2} \quad \mathbf{p}) \ \frac{1}{ab} \quad \mathbf{q}) \ \frac{a+b}{ab} \quad \mathbf{\eta}) \quad \frac{2}{ab(a+b)}$$

12. Գանել a թվերի քանակը, որոնց դեպքում $\frac{1}{x-7}=a$

հավասարման արմատր միանիշ պարզ թիվ է։

- ա) 4 p) 5 q) 3 դ) անթիվ է
- 13. Դպրոցի շրջանավարտները իրար հետ փոխանակում են իրենց լուսանկարները։ Ընդհամենը քանի՞ լուսանկար են փոխանակել նրանք, եթե շրջանավարտների թիվը 23 է։
 - u) 46 p) 253 q) 529 n) 506
- 14.Ծորակից 3 վայրկյանում 40լ ջուր է թափվում։ Որքա՞ն ժամանակում կլցվի երկու խոր. մ. տարողությամբ բաքը այդ ծորակով։
- ա) 50 վ-ում բ) 1,5 վ-ում գ) 2,5 րոպեում դ) 0,25 րոպեում 15.60լ 20%-անոց սպիրտի լուծույթին ավելացրեցին 8լ թորած ջուր և 2լ մաքուր սպիրտ։ Քանի՞ %-անոց սպիրտի լուծույթ ստացվեց։


u) 20 p)
$$\frac{8000}{41}$$
 q) 25 p) 18

16.Երկու զուգահեռ ուղիղներից մեկի վրա նշված է երեք կետ, իսկ մյուսի վրա՝ երկու կետ։ Քանի՞ եռանկյուն գոյություն ունի, որոնցից յուրաքանչյուրի երեք գագաթներն էլ այդ կետերից են։

- u) 3 p) 9 q) 7 η) 0 17. Qum ülumph mılımı ülaph qını üli $\angle 1$ -p:
- ш) 107⁰ р) 92⁰ q) 88⁰ η) 73⁰

18. Նկարում AB – ն արամագիծ է, $\angle ABC = 60^{\circ}$ ։ Գանեւ եռանկյան անկյունները։

- u) 40°, 40°, 40° p) 30°, 30°, 120°
- q) 45°, 45°, 90° n) 30°, 45°, 105°
- 19. 28սմ-ի հավասար հատվածը տրոհված է երեք անհավասար հատվածների, ընդ որում մեջտեղի հատվածի երկարությունը 4սմ է։



Գտնել եզրային հատվածների միջնակետերի հեռավորությունը։

- բ) 16սմ q) 20uú n) հնարավոր չէ գտնել **w**) 18uú
- 20. ABC եռանկյան BD–ն բարձրություն uts ξ, $\angle BAC = 45^{\circ}$, $\angle ABC = 105^{\circ}$ lu AD + DB + BC = 12 us: Quntity BD-4:
- u) 3uú p) 4uú q) 2uú n) 5uú

9-րդ դասարան (առաջին փուլ)

- 1. Գտնել a թիվը, եթե $\{2a-1\} \cup \{a^3+a^2-1\} = \{1\}$:
 - **w**) 0 q) 2 η) -1
- 2. Հաշվել՝ 7դմ³-2,5լ: ա) 4500uմ³ p) 67 p) 67.51 q) 9.51 n) 0.450^3
- 3. Ավտոմեքենան շարժվում է 85կմ/ժ արագությամբ։ Քանի՞ ժամում այն կծախսի 17լիտը բենզին, եթե յուրաքանչյուր 100կմ-ին ծախսում է 10լ բենգին։
 - p) 2,5d a) 3d w) 5đ
- 4. Գումարեք կոտորակները. $\frac{x}{2v^2-rv} + \frac{4y}{r^2-2vv}$:

$$\text{ui} \frac{x+4y}{x^2-3xy+2y^2}$$
 p) $\frac{x+2y}{xy}$ q) $\frac{4y-x}{(x-2y)(x+y)}$ q) $-\frac{x+2y}{xy}$

- 5. a -ի ի°նչ արժեքների դեպքում 1-ը $|a| \cdot x = a$ հավասարման արմատ չէ։
 - w) a = 0 p) a > 0 q) $a \ge 0$ n) a < 0
- ABC եռանկյան անկյան կիսորդն է։ D 6. AD-û հեռավորությունը AC ուղղից հավասար է 4սմ, իսկ AB=10սմ։ Հաշվել ABD եռանկյան մակերեսը։
 - u) $20u\dot{v}^2$ p) $40u\dot{v}^2$ q) $5u\dot{v}^2$ η) $10u\dot{v}^2$

7. Ապրանքի գինը նախ բարձրացրին 10–ով, ապա իջեցրեցին 10–ով։ Արդյունքում ինչպե՞ս փոխվեց ապրանքի սկզբնական գինը։ ա) չփոխվեց բ) բարձրացավ 1-ով գ) իջավ 1-ով դ) իջավ 2-ով 8. Գանել ո-ը, եթե $9^9:3^3=27^n:$ ա) 5 p) 1 q) 3 դ) 2 9. Գանել արտահայտության արժեքը՝ $\sqrt{ -7 + \sqrt{9}-\sqrt{9}\cdot\sqrt{16}-\sqrt{81} }$
u) $\sqrt{11}$ p) 5 q) 4 η) ± 5
10. Գանել ո-ի ամենամեծ ամբողջ արժեքը, որի դեպքում
$\left(\frac{1}{2}\right)^n > 4 \cdot \left(2^2\right)^2 :$
ա) -6 թ) -7 գ) -5 դ) գոյություն չունի
11. Քանի՞ լուծում ունի $3-7x>-18$ և $x \in N$ բանաձևը։
ա) 1 թ) 2 գ) 3 դ) անթիվ
12 I niðti hunfullunnan $\sqrt{x} < 6$
12. Լուծել համակարգը՝ $\begin{cases} \sqrt{x} < 6 \\ x \in (-20; 29) \end{cases}$:
w) (-20;29) p) (-20;36) q) [0;29) η) [0;28)
13. Լուծել համախումբը` $x \in (1;2)$:
13. Լուծել համախումբը՝ $ \begin{bmatrix} x \in (-\infty;1) \cup (2;+\infty) \\ x \in (1;2) \\ x \in \{1\} \end{bmatrix} $
$\text{ui)} \ \left(-\infty; +\infty\right) \qquad \text{p)} \ \varnothing \qquad \text{q)} \ \left\{1; 2\right\} \qquad \text{\eta)} \left(-\infty; 2\right) \cup \left(2; +\infty\right)$
14. Ո՞ր քառորդում է գտնվում E(-2;4) կետը։
ա) առաջին բ) երկրորդ գ) երրորդ դ) չորրորդ
15. Գտեք a և b թվերը, եթե $y = ax + b$ ուղիղն անցնում է $(0;1)$ և $(1;0)$
կետերով։

u)
$$a = -1 \text{ l. } b = 1$$
 p) $a = 1 \text{ l. } b = 1$

q)
$$a = -1 \text{ th } b = -1$$
 q) $a = 1 \text{ th } b = 0$

16. Գանել $2x^2$ -7x+3 բազմանդամը x+1 երկանդամի վրա բաժանելիս ստացվող քանորդը և մնացորդը։

17. Գանել հավասարման մեծ արմատը՝

$$x^{2} - (3 + \sqrt{13})x + 3\sqrt{13} = 0$$
:
m) -3 p) $\sqrt{13}$ q) - $\sqrt{13}$ n) 3

- 18. Գտնել 13սմ երկարությամբ ներքնաձիգ և 5սմ էջ ունեցող ուղղանկյուն եռանկյան մակերեսը։
 - u) 32.5 ud^2 p) 65 ud^2 q) 60ud^2 n) 30ud^2
- 19. 6սմ շառավորվ շրջանագծին արտագծված ուղղանկյուն սեղանի սրունքներից մեկր 13սմ է։ Գտնել սեղանի մեծ հիմքի երկարությունը։
 - w) 15 p) 13 q) 25 η) 18
- 20. Շրջանագծին ներգծված ABCD քառանկյան A անկյունը երկու անգամ փոքր է \angle C-ից և 8^0 -ով մեծ է \angle B-ից։ Գտնել քառանկյան մեծ անկյունը։
 - m) 120° p) 138° q) 128° η) 150°

7-րդ դասարան (երկրորդ փուլ)

- 1. Երկու թվերի գումարը 429 է։ Նրանցից մեկը ավարտվում է զրոյով։ Եթե այդ զրոն ջնջենք, ապա կստացվի երկրորդ թիվը։ Գտնել այդ թվերը։
- 2. Գանել 45-ի բաժանվող 7*3** տեսքի հնգանիշ թիվը, որի թվանշանների արտադրյալը ամենամեծն է։
- 3. 5060703 թվի զրոները փոխարինել միևնույն թվանշաններով այնպես, որ ստացված թիվը բաժանվի 9-ի։ Գտնել բոլոր լուծումները։
- 4. Ուղղանկյունաձև խոհանոցի լայնությունը 3մ է, երկարությունը՝ 4մ։ Քառակուսու տեսք ունեցող 40սմ կողմով քանի՞ սալիկ է հարկավոր խոհանոցի հատակը ծածկելու համար։
- 5. 161 աշակերտ ունեցող դպրոցում գրավոր աշխատանքներ տալու համար պահանջվեց 7 տուփ թուղթ։ Քանի՞ տուփ թուղթ կպահանջվի 141 և 158 աշակերտներ ունեցող երկու դպրոցներում գրավոր աշխատանքներ կազմակերպելու համար։
- 6. A-ից B, որոնց միջև եղած հեռավորությունը 525կմ է, դուրս եկավ բեռնատար ավտոմեքենան 60կմ/ժ արագությամբ, իսկ 2 ժամ անց B-ից դեպի A դուրս եկավ մարդատար ավտոմեքենան 1250մ/ր արագությանբ։ A-ից ի՞նչ հեռավորության վրա ավտոմեքենաները կհանդիպեն։
- 7. Յորենի խոնավությունը 23% էր։ Չորացնելուց հետո խոնավությունը կազմեց 12%։ Քանի՞ տոկոսով նվազեց ցորենի քաշը։
- 8. Շրջանագծով վազում են 4 ձի։ Առաջին ձին մեկ պտույտը կատարում է 10 րոպեում, երկրորդը՝ 12, երրորդը՝ 15, իսկ չորրորդը՝

20։ Նրանք վազքը սկսում են միաժամանակ A կետից և որոշ ժամանակ անց միաժամանակ նորից հայտնվում են A կետում։ Այդ ընթացքում քանի՞ պտույտ կատարեցին ձիերը միասին։

8-րդ դասարան (երկրորդ փուլ)

- 1. Կրճատել կոտորակը. $\frac{3c^2d-3cd^2-c^3+d^3}{c^2+d^2-2cd}$:
- 2. a-ի ինչպիսի $^{\circ}$ արժեքների դեպքում -x=ax հավասարումն ունի արմատ։
- 3. Գտնել a թվերի քանակը, որոնց դեպքում $\frac{1}{x-7} = a$ հավասարման արմատր միանիչ պարզ թիվ է:
- 4. C կայարանը գտնվում է A և B վայրերի միջև, որոնց միջև եղած հեռավորությունը 62կմ է։ Հեծանվորդը A-ից C մեկնեց 200մ/ր արագությամբ։ 30 րոպե անց B-ից C մեկնեց ավտոմեքենան։ Ի՞նչ արագությամբ պետք է շարժվի ավտոմեքենան, որպեսզի C կայարան հասնի ավելի շուտ, քան հեծանվորդը, եթե C կայարանը գտնվում է A-ից 30կմ հեռավորության վրա։
- 5. Առաջին մեքենագրուհին մեկ էջը մեքենագրում է 2 րոպեում, իսկ երկրորդը՝ 5 րոպեում։ Ամենաշատը քանի՞ ժամ պետք է աշխատեն մեքենագրուհիները միասին, որպեսզի նրանց տպագրած էջերի տարբերությունը քիչ լինի 100-ից, եթե հայտնի է, որ այդ ժամանակը արտահայտվում է բնական թվով։
- 6. Տրակտորը դաշտը վարում է 2 հա/օր, 8 ժամ/օր, 15 լ/ժամ հաստատուն կշռույթներով։ Որոշել նրա հա/ժամ, հա/լ կշռույթները։
- 7. ABC եռանկյան մեջ տարված AN և BM կիսորդները, հատվում են E կետում։ Գտնել AEB անկյան մեծությունը, եթե \angle C=140 o :
- 8. AC հիմքով ABC հավասարասրուն եռանկյան մեջ AN-ը և CM-ը համապատասխանաբար A և C անկյունների կիսորդներն են։ Ապացուցել, որ. ա/ $\Delta ANB=\Delta BMC$, р/ $MN\parallel AC$:

9-րդ դասարան (երկրորդ փուլ)

- 1. Լուծել հավասարումը. $1,3\left(1,4+\frac{1}{7}x\right)-\frac{5}{21}x=1,6$:
- 2. Luzyti. $3(\sqrt{15}-\sqrt{5})^2-(1-2\sqrt{3})^3$:

- 3. Գտնել a-ի այն բնական արժեքները, որոնց դեպքում 5-ը 2ax+245>45x անհավասարման լուծումն է, իսկ 7-ը՝ ոչ։
- 4. Գտնել $\left(0,4a^{-5}b^{-2}\right)^{\!-4}\cdot\left(\frac{2,5b^{-3}}{a^{-7}}\right)^{\!-3}$ արտահայտության փոքրագույն

undton, tot $2 \le b \le 5$ to $4 \le a \le 10$:

- 5. Եթե երկու բնական թվերի արտադրյալին գումարենք 127 և արդյունքը բաժանենք այդ թվերից փոքրին, ապա քանորդում կստացվի 50, իսկ մնացորդում՝ 22։ Գտնել այդ թվերը։
- 6. Խանութը երեք օրում 600 կգ մրգի վաճառքից ստացավ 278000 դրամ։ Առաջին օրը վաճառվեց մրգի 0,2 մասը, իսկ երրորդ օրվա վաճառվածը 1,4 անգամ շատ էր երկրորդ օրվա վաճառածից։ Ի՞նչ գնով էր վաճառվում միրգը յուրաքանչյուր օրը, եթե առաջին օրը մրգի գինը 10%-ով թանկ էր, քան երկրորդ օրը, իսկ երրորդ օրը՝ 20%-ով էժան էր, քան երկրորդ օրը։
- 7. Շեղանկյան անկյունագծերից մեկը 48 սմ է, իսկ կողմը՝ 25 սմ։ Գտնել շեղանկյան մակերեսը և բարձրությունը։
- 8. ABCD սեղանի CD կողմնային կողի ծայրակետերը միացված են AB

կողմնային կողի M միջնակետին։ Ապացուցել, որ $S_{\square \mathit{CMD}} = \frac{1}{2} S_{\mathit{ABCD}}$:

2012 թ. 7-րդ դասարան (առաջին փուլ)

- 2. Գտնել 48 և 60 թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը։
 - m) 12 p) 2880 q) 240 η) 720
- 3. Գտնել 2-ից փոքր 5 հայտարարով բոլոր անկանոն կոտորակների գումարը։
 - m) 6 p) 7 q) 4,2 n) 5,2
- 4. Գտնել 12-ի բոլոր բնական բաժանարարների գումարր։
 - w) 28 p) 27 q) 16 η) 15

5. Գտնել B կետի կոորդինատը, եթե C կետը AB հատվածի
միջնակետն է, իսկ A և C կետերի կոորդինատներն են` A(14),
C(29):
ш) 45
6. Ո°ր թվանշանը պետք է ձախից և աջից կցագրել 34 թվին,
որպեսզի ստացված քառանիշ թիվը մեծ լինի 6000-ից և բաժանվի
3-h:
u) 5 p) 6 q) 7 n) 8
7. Տրված դրական թիվը քանի՞ տոկոսով է փոքր այդ թվի և նրա
հակադիր թվի տարբերությունից։
ш) 50
8. Գտնել -1-ից մեծ և 4-ից փոքր ամբողջ թվերի միջին
թվաբանականը։
u) 1,5 p) 3 q) 2 η) 1
9. Ո՞րն է այն թիվը, որն իր 20 տոկոսից մեծ է 60-ով։
w) 85 p) 80 q) 78 η) 75
10. Կենտ թիվը 6-ի բաժանելիս մնացորդը կարող է լինել՝
ա) 2 p) 5 q) 7 դ) 21 11. Ուղղանկյունանիստի երկարությունը 0,4մ է, լայնությունը՝ 5դմ,
իսկ ծավալը 0,06մ³։ Գտնել ուղղանկյունանիստի բարձրությունը։
m) 3ul p) 3nl q) 0,3nl n) 0,6ul
12. Քանի՞ երկնիշ թիվ կարելի է գրել 0, 2, 4, 6 թվանշաններով, եթե
նիշերը չի կարելի կրկնել։
u) 12 p) 16 q) 8 η) 9
13. Գտնել հավասարման արմատը` $5x-(\frac{1}{2}x+9)=18$ ։
u) 2 p) 3 q) 6 n) 9 0.123 · 0.321
14. Հաշվել՝ $\frac{0,123\cdot 0,321}{1,23\cdot 3,21}$:
1,23.3,21
u) 0,01 p) 100 q) 0,1 q) 0,001
15. Աշխատանքի արտադրողականությունը բարձրացրին 25%-ով։
Քանի՞ տոկոսով կկրձատվի առաջադրանքի կատարման ժամա-
նակը։
w) 25 p) 15 q) 50 η) 20

16. Երեք տարում Արմենի տարիքն ավելացավ իր տարիքի $\frac{1}{4}$ -ով։
Քանի՞ տարեկան է այժմ Արմենը։ ա) 15 թ) 16 գ) 7 դ) 19
17. Գտնել 4 ¹⁶ -ը 10-ի բաժանելիս ստացված մնացորդը։ ա) 4 p) 6 q) 16 դ) 8
18. 30 էջը մուտքագրելու համար օպերատորներից առաջինը ծախսում է 3ժ, իսկ երկրորդը՝ 6ժ։ Համատեղ աշխատելով նրանք քանի՞ ժամում կմուտքագրեն 30 էջ։ ա) 9
19. Գտնել 2x-1=5-x և -y+3=12+2y հավասարումների արմատների
արտադրյալը։ ա) 6
20. Իրար հետևից գրված են 1-ից մինչև 100 բնական թվերը։ Ո՞ր թվանշանն է գրված 111-րդ տեղում։ ա) 0 p) 7 q) 6 η) 1
8-րդ դասարան (առաջին փուլ)
8-րդ դասարան (առաջին փուլ) 1. Հաշվել արտահայտության արժեքը. $\left \frac{1}{3}-0,5\right :\frac{5}{6}$
1. Հաշվել արտահայտության արժեքը. $\left \frac{1}{3} - 0.5 \right : \frac{5}{6}$
1. Հաշվել արտահայտության արժեքը. $\left \frac{1}{3} - 0.5 \right : \frac{5}{6}$ ա) 5 p) -5 q) 0,2 η -0,2
1. Հաշվել արտահայտության արժեքը. $\left \frac{1}{3}-0.5\right :\frac{5}{6}$ ա) 5 p) -5 q) 0,2 դ) -0,2 2. 15 րոպե 46 վայրկյանը մեկ ժամի ո՞ր մասն է :
1. Հաշվել արտահայտության արժեքը. $\left \frac{1}{3} - 0.5 \right : \frac{5}{6}$ ա) 5
1. Հաշվել արտահայտության արժեքը. $\left \frac{1}{3}-0.5\right :\frac{5}{6}$ ա) 5
1. Հաշվել արտահայտության արժեքը. $\left \frac{1}{3}-0.5\right :\frac{5}{6}$ ա) 5
1. Հաշվել արտահայտության արժեքը. $\left \frac{1}{3}-0.5\right :\frac{5}{6}$ ա) 5
1. Հաշվել արտահայտության արժեքը. $\left \frac{1}{3} - 0.5 \right : \frac{5}{6}$ ա) 5
1. Հաշվել արտահայտության արժեքը. $\left \frac{1}{3}-0.5\right :\frac{5}{6}$ ա) 5
1. \angle աշվել արտահայտության արժեքը. $\left \frac{1}{3}-0,5\right :\frac{5}{6}$ w) 5 p) -5 q) 0,2 η) -0,2 2. 15 րոպե 46 վայրկյանը մեկ ժամի ո՞ր մասն է: w) $\frac{473}{1800}$ p) $\frac{773}{1800}$ q) $\frac{946}{3000}$ η) $\frac{61}{3600}$ 3. \angle աշվել $\frac{2^{21}+2^{19}}{2^{18}+2^{16}}$ w) 2 p) 8 q) 16 η) 64 4. \angle աշվել $\frac{20122012-2012}{2012}$ w) 2011 p) 1001 q) 10000 η) 920119999


6. Գտնել այն երկնիշ թվերի քանակը, որոնք 10%-ով մեծացնելիս ստացվում է երկնիշ թիվ։
ատացվում է նիկարջ թիզ. ա) 81 - բ) 9 - գ) 45 - դ) 10
7. Նշված արտահայտություններից որ մեկում 8-ը փոխարինելով
ուրիշ թվանշանով արդյունքը չի փոխվի։
11.1 (8+8).8+8
w) $(8+8):8+8$ p) $8 \cdot (8+8):8$ q) $(8+8-8) \cdot 8$ n) $(8+8-8):8$ 8. $1-3x+3x^2-x^3$, $a^2-10a+25$, $9+6a+a^2$, a^2+2x+4 , $x^3+xy^2+x^2y+y^3$
արտահայտություններից քանի՞սն են հանդիսանում որևէ
երկանդամի քառակուսի կամ խորանարդ։
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
(1, 1, 1)
9. Quality $x \text{ phyp., tight } \{2x+1\} \cap \left\{4; \frac{1}{3}; -2\right\} = \{-2\}:$
u_1 - 2 p_1 2 q_2 - 1,5 q_1 - 0,5
10. Հոսանքի ուղղությամբ մոտորանավակի արագությունը x
կմ/ժ է, իսկ հոսանքին հակառակ ուղղությամբ` y կմ/ժ։ Գտնել
մոտորանավակի սեփական արագությունը։
(x+y) = (x+2y) + (x+y) = (x+y)/2
11. Վարպետներից մեկը պատվերը կարող է կատարել 3
ժամում, իսկ մյուսը՝ 6 ժամում։ Աշխատելով միասին քանի՞
ժամում նրանք կկատարեն պատվերի կեսը։
w) 1 p) 2 q) 3 n) 4
12. ո բնական թիվը 17-ի բաժանելիս մնացորդում ստացվում է
11։ Ի՞նչ մնացորդ կստացվի 4ո-ը 17-ի բաժանելիս։
ш) 44
13. Գտնել 136-ի բնական զույգ բաժանարարների քանակը։
u) 6 p) 7 q) 5 n) 4
14. Գտնել միայն կենտ թվանշաններով գրվող և 5-ի վրա
բաժանվող եռանիշ թվերի քանակը (եռանիշ թվի թվանշանները
կարող են կրկնվել)։
u) 25 p) 50 q) 45 q) 180
15. Պարի խմբում կա 25 տղա և 19 աղջիկ։ Յուրաքանչյուր շաբաթ
խմբին միանում են 2 տղա և 3 աղջիկ։ Քանի՞ շաբաթ հետո խմբում
տղաների և աղջիկների քանակները կհավասարվեն։
100

գ) կփոքրանա 50%-ով դ) կփոքրանա 75%-ով


w) 5	p) 6	q) 7	ŋ) 8

16. 318-ը բաժանել 4 այնպիսի մասերի, որ առաջին մասը հարաբերի երկրորդին ինչպես 2:3, երկրորդը երրորդին՝ ինչպես 4:7, իսկ երրորդը չորրորդին՝ ինչպես 6։11։ Ինչքա՞ն է երկրորդ մասը։

Գանել \angle ABC-ն, եթե AD=BC, \angle DAC= 50° , \angle ACB= 70° , 17.



Տրված է ABCD ուղղանկյունը։ Ստվարագծված մասի 18. մակերեսը Q է։ Գտնել մնացած մասի մակերեսը։



w) Q

$$p)\ Q/2$$

q) 2Q

n) 0,4Q

Եռանկյան երկու կողմերի երկարություններն են 1 և Գտնել երրորդ կողմի երկարությունը, եթե հայտնի է, որ այն արտահայտվում է բնական թվով։

Նշվածներից ո՞ր կետն է պատկանում y=-2x+3 ուղղին։ 20. u) A(0;-1) p) B(-1;0) q) C(2;-1) n) D(-1;2)

$$u) A(0;-1)$$

$$\eta$$
) D(-1;2)

9-րդ դասարան (առաջին փուլ)

 $\sqrt{10} \cdot \sqrt{15} + \sqrt{54}$ արտահայտության արժեքը հավասար է՝ ա) $5\sqrt{6}$ p) $8\sqrt{6}$ q) $6\sqrt{8}$ դ) $6\sqrt{10}$ 1.

$$η$$
) $6\sqrt{10}$

2. Գտնել |4x-7|+4x արտահայտության արժեքը, եթե $x=\sqrt{3}$:

4.	Գտնել $ x-2 \leq 2$ անհավասարմանը բավարարող ամբողջ
	թվերի քանակը։
	w) 5 p) 3 q) 2 η) 4
5.	60-ը 12-ից քանի՞ տոկոսով է մեծ։
	ш) 100 p) 80 q) 300 q) 400
6.	Պարզեցնել $\frac{a^3-8}{2-a}+a^2+3a+6$ արտահայտությունը։
	u) $4a$ p) $a^2 + 4$ q) $2a^2 + 8$ η) $a + 2$
7.	Գտնել այն բնական թվերի քանակը, որոնք $x \le 5$ $x \ge 10$
	համախմբի լուծում չեն։
	ա) 6 թ) 5 գ) 4 դ) անթիվ բազմությամբ
8.	x և y բնական թվերն այնպիսին են, որ 12x և 18y թվերից
J	յուրաքանչյուրը բնական թվի քառակուսի է։ Գտնել (x+y)-ի
]	ինարավոր ամենափոքր արժեքը։
	ա) 2
9.	
	գումարը։
	m) 4 p) 9 q) 40 n) -1
10.	այ 4 p) 9 q) 40 դ) -1 Գտնել արտահայտության արժեքը՝ $\left(\sqrt{4+\sqrt{7}}+\sqrt{4-\sqrt{7}}\right)^2$:
	u) 14 p) 8 q) 5 n) 1
11.	
	b-ն շարժման ժամանակը։
	ա) b ժամանակում անցած մանապարհ p) արագություն
	գ) ինչքան ժամանակում կանցնի ձանապարհը
	դ) ինչքան Ճանապարհ է անցնում

u) $5\sqrt{3}$ p) 7 q) -7 η) $\sqrt{3}$ -7

մեծացնելիս ստացվում է երկնիշ թիվ: ա) 9 թ) 4 q) 3 η 60

102

3. Գտնել այն երկնիշ թվերի քանակը, որոնք 5%-ով

12.	Հնգանիշ	թվի	թվանշաններ	ւի գումարը	2	է։	Այդ	թվին
	գումարեցին	երկնի	շ թիվ, արդյու	նքում ստաց	ցվեց	ին	գանի	շ թիվ,
	որի թվանշա	նների	գումարը նոր]	ից 2 է։ Ի՞նչ լ	իվ 1	են գ	լումա	րել։
	uı) 19	n) 89	a) 90	n) 99				


13. Գտնել 45-ից փոքր այն երկնիշ թվերի քանակը, որոնք կարելի է ներկայացնել իրարից տարբեր պարզ թվերի արտադրյալի տեսթով։

14. a, b, c, d թվերն այնպիսին են, nր a-1=b+2=c-3=d+4։ Գտնել այդ թվերից ամենամեծի և ամենափոքրի տարբերությունը։

15. Գտնել երկնիշ թվի և նրա թվանշանների գումարի հարաբերության հնարավոր մեծագույն արժեքը։

16. Քանի՞ ուղիղներով հարթությունը կարելի է տրոհել 5 մասի։ ա) 2 p) 3 a) 4 n) 5

17. AB=BC, \angle ABC=14 $^{\circ}$, \angle BKD=100 $^{\circ}$: Quality \angle KDC- $\frac{1}{2}$:



18. O D կենտրոնով շրջանագծին ներգծված ABCD քառանկյան A, B, C անկյունների մեծությունները հարաբերում են ինչպես 5:9:7, իսկ \angle BOC=60 $^{\circ}$ ։ Գտնել CAD անկյունը։

m)
$$30^{0}$$
 p) 60^{0} q) 90^{0} n) 45^{0}

19. Հավասարասրուն եռանկյան անկյուններից մեկը 120º է, նրան արտագծած շրջանագծի շառավիղը` 10։ Գտնել եռանկյան սրունքի երկարությունը։

u)
$$10\sqrt{3}$$
 p) 20 q) $20\sqrt{3}$ η) 10

20. Շրջանագծին արտագծված հավասարասրուն սեղանի սրունքը 10սմ է, իսկ հիմքերը հարաբերում են ինչպես 1:3։ Գտնել սեղանի փոքր հիմքի երկարությունը։

w) 4uú

բ) 5սմ

g) 6uú n) 4,5uú

7-րդ դասարան (երկրորդ փուլ)

1. Հաշվել.

$$\left| 1,4-6\frac{7}{15} \right| : \left(2\frac{4}{5} + 1,2 \right) \cdot 15 :$$

- **2.** Լուծել 4,5(x-1)-2,3(x+2)=2,1x հավասարումը։
- 3. Երկու թվերի տարբերությունը 20 է։ Նրանցից մեկը մյուսից 40%-ով մեծ է։ Գտեք փոքր թիվը։
- 4. Երեք փոքր ուղղանկյունների պարագծերը հավասար են 12սմ, 18սմ, 16սմ, իսկ մեծ ուղղանկյան պարագիծը՝ 38սմ։ Գտեք մեծ ուղղանկյան լայնությունը (x-ր)։

18 16

- 5. Թվային ուղղի վրա նշված են A(-5), B(7) և C(1) կետերը։ Գտնել AB BC հատվածների միջնակետերի միջն հեռավորությունը։
- 6. Տան ջրագիծն անցկացնելու համար անհրաժեշտ է 167մ խողովակ։ Խանութում կա միայն 5մ և 7մ երկարությամբ խողովակներ։ Յուրաքանչյուր տեսակից քանի՞ խողավակ է վերցնել, որպեսզի ջրագիծն անցկացնելիս հարկավոր միացումների քանակը լինի նվազագույնը (խողովակները մասերի բաժանել չի թույլատրվում)։
- 7. Շրջանագծի վրա նշել են 15 կետ։ Քանի՞ հատված կստացվի, եթե ամեն կետ միացված է լուրաքանչյուրի մյուսի հետ։
- 8. Յոթ միատեսակ կոմբայներից կազմված բրիգադր կարող է դաշտր հնձել 10 օրում։ ա. Քանի[°] օրում կհնձեն դաշտր, եթե աշխատեն միայն 5 տրակտոր։

բ. Քանի՞ օրում կավարտեն հունձը, եթե աշխատանքային օրվա կեսը կոմբայներն աշխատեն երկու անգամ ավելի արագ, իսկ կեսօրից հետո` երկու անգամ ավելի դանդաղ։

8-րդ դասարան (երկրորդ փուլ)

1. Հաշվել.

$$\left| \frac{171717}{252525} - 1 \right| : 0,04:$$

- **2.** Lnidtl $\frac{2x-3}{4} + \frac{x+2}{2} = 6 \frac{3-2x}{2}$ huduuunniup:
- **3.** Բազմանդամը վերլուծեք արտադրիչների. ա. 9x-6x²+x³ p. x³-3x²+3x+7
- **4.** Հոսանքի ուղղությամբ մոտորանավակի արագությունը 23կմ/ժ է, իսկ հոսանքին հակառակ ուղղությամբ` 17 կմ/ժ։ Գտնել մոտորանավակի սեփական արագությունը։
- 5. 1 տանձը և 1 սալորը միասին կշռում են այնքան, որքան 2 խնձորը։ Չորս տանձը կշռում է այնքան, որքան 2 սալորը և 5 խնձորը միասին։ 7 խնձո՞րն է ծանր, թե՞ 5 տանձը։
- 6. Բանանը նարինջից 10%-ով թանկ է, իսկ խնձորից` 25%-ով։ Քանի՞ կիլոգրամ բանան կարելի է գնել 20 կգ խնձորի և 22 կգ նարինջի համար վՃարած գումարով։
- 7. ABC հավասարասրուն եռակյան (AB=BC) AB կողմի միջնուղղահայացը BC կողմը հատում է D կետում, ընդ որում BD=15, DC=5։ Հնարավոր է արդյո՞ք AC կողմը հավասար լինի 21-ի։ Հիմնավորել։
- **8.** ABC եռանկյան մեջ ∠B=150º: AD-ն ABC եռանկյան A անկյան կիսորդն է։ Գտնել D կետի հեռավորությունը AC ուղղից, եթե BD=8։

9-րդ դասարան (երկրորդ փուլ)

1. Գտնել n-p, եթե $16^n: 4^4 = 32^4:$

- **2.** a –ի ի՞նչ արժեքների դեպքում համակարգն ունի լուծում. $\begin{cases} 7-x \geq 0 \\ x-a > 0 \end{cases}$
- **3.** Ապացուցել, որ x-ի և y-ի ցանկացած արժեքների դեպքում տեղի ունի x²+5y²-4xy-6y+10>0 անհավասարությունը։
- **4.** Լուծել $\sqrt{15-x} < \sqrt{x+1}$ անհավասարումը։
- 5. Հնարավոր է արդյո՞ք [1; 53] միջակայքի պարզ թվերը տրոհել երկու խմբերի, որ նրանցից մեկում եղած թվերի գումարը հավասար լինի մյուսում եղած թվերի գումարին։ Հիմնավորել։
- **6.** Խնձորի, տանձի և դեղձի գները հարաբերում են ինչպես 2:3:4: 26կգ միրգ գնելիս գնորդը յուրաքանչյուր տեսակի մրգի համար վճարել է նույն գումարը։
 - ա. Գնված դեղձի կշիռը քանի՞ տոկոսով է պակաս տանձի կշռից։
 - բ. Քանի՞ կգ խնձոր կարելի է գնել վճարած ամբողջ գումարով։
- 7. ABC հավասարասրուն եռանկյան մեջ տարված են AA₁ և BB₁ բարձրությունները։ AB=BC=25 սմ, իսկ AC=30 սմ։
 - ա. Գտնել ABC եռանկյան մակերեսը։
 - բ. Գտնել A_1B_1 հատվածի երկարությունը։
- 8. ABCD սեղանին ներգծված է O կենտրոնով և 12սմ շառավղով շրջանագիծ։ Սեղանի բարձրությունը 1սմ-ով փոքր է սրունքից և ∠A=∠B=90°:
 - ա. Գտնել սեղանի մակերեսը։
 - բ. Գտնել COD անկյան մեծությունը։

10-րդ դասարան (մաթեմատիկա)

1. Պարզեցնել արտահայտությունը.

$$\frac{27-n^3}{3+n}: \left(3+\frac{n^2}{3+n}\right) - \frac{n^2}{n-3} \cdot \frac{9-n^2}{n^2+3n}$$

2. Լուծել համակարգը և գտնել համակարգին բավարարող պարզ թվերը։

$$\begin{cases} |x+0,5| > 1,5 \\ x^2 - 5x - 14 \le 0 \end{cases}$$

- 3. b-ի n° ր արժեքների դեպքում $x^2-2x+b^2-9=0$ քառակուսի հավասարման x_1 և x_2 արմատները բավարարում են $2x_1-x_2=4$ պայմանին։
- 4. Երեք թվեր, որոնցից առաջինը 3 է, կազմում են երկրաչափական պրոգրեսիա։ Եթե երկրորդ թվին գումարենք 6, իսկ մյուսները թողնենք անփոփոխ, ապա ստացված երեք թվերը կկազմեն թվաբանական պրոգրեսիա։ Գտեք անհայտ թվերը։
- 5. 40 դետալ պատրաստելու համար առաջին բանվորը ծախսում է 3ժ պակաս, քան երկրորդը։ Երկուսը միասին 20 դետալը պատրաստում են 1 ժամում։
 - ա. Քանի՞ դետալ է պատրաստում առաջինը 6 ժամում։
 - բ.Քանի՞ ժամում է երկրորդ բանվորը պատրաստում 60 դետալ։
 - գ. Առաջին բանվորի արտադրողականությունը քանի՞ տոկոսով է ավել երկրորդ բանվորի արտադրողականությունից։
- 6. Գտնել երկնիշ թվի և նրա թվանշանների արտադրյալի հարաբերության հնարավոր մեծագույն արժեքը (երկրորդ թվանշանը 0 չէ)։
- 7. ABC եռանկյան մեջ AB=9սմ, AC=24սմ, \angle A=60 $^{\circ}$:
 - ա. Գտնել BC կողմի երկարությունը։
 - բ. Գտնել ABC եռանկյան մակերեսը։
 - գ. Գտնել ABC եռանկյանն արտագծած շրջանագծի շառավիդը։
 - դ. Գտնել եռանկյան A գագաթից տարված միջնագծի երկարությունը։
- 8. ABC եռանկյանը ներգծված է O կենտրոնով շրջանագիծ, որը AC կողմը շոշափում է K կետում, իսկ BC կողմը` F կետում։ Հայտնի է, որ BF=12, FC=28, իսկ եռանկյան BD բարձրությունը հավասար է 24-ի։
 - ա. Գտնել KD հատվածի երկարությունը։
 - բ. Գտնել AB կողմի երկարությունը։

- գ. Գտնել ABC եռանկյան մակերեսը։
- դ. Գտնել շրջանագծի շառավղի երկարության եռապատիկը։

Ֆիզիկա 1-10 խնդիրները գնահատվում են 1-ական միավորով, իսկ 11-15 խնդիրները՝ 2-ական։

Տարբերակ 1

- 1. Պարաշուտիստը 2d/d հաստատուն արագությամբ իջնում է ուղղաձիգ դեպի ներքև։ Պնդումներից ո $^{\circ}$ րն է ձիշտ.
- 1) Պարաշուտիստի վրա ոչ մի ուժ չի ազդում։
- 2) Պարաշուտիստի վրա ազդող ծանրության ուժը հավասար է զրոյի։
- 3) Պարաշուտիստի վրա ազդող ուժերի համազորը հավասար է զրոյի։
- 4) Պարաշուտիստի վրա ազդող ուժերի համազորը հաստատուն է և հավասար չէ գրոյի։
- 2. Նշված դեպքերից որո՞ւմ է մարմինը խորասուզվում հեղուկի մեջ.
- 1) Երբ հեղուկի խտությունը մեծ է մարմնի խտությունից։
- 2) Երբ հեղուկի խտությունը փոքր է մարմնի խտությունից։
- 3) Երբ հեղուկի խտությունը հավասար է մարմնի խտությանը։
- 4) Երբ մարմնի կշիռը մեծ է հեղուկի կշռից։
- 3. Ո՞ր դեպքում է ծանրության ուժը կատարում աշխատանք.
- 1) Կշռաքարը դրված է սեղանին։
- 2) Ձեռքից բաց թողնված քարն ընկնում է գետնին։
- 3) Սահնակը շարժվում է հորիզոնական ձանապարհով։
- 4) Մեքենան կանգնած է բլրի գագաթին։
- 4. Նշված արագություններից ո՞րն է ամենափոքրը.
- 1) 72 h/d 2) 21 h/h 3) 300 h/h 4) 50 h/h/h
- 5. Օծանելիքի բաց սրվակի շրջակայքում զգացվում է նրա բույրը։ Դա նշանակում է, որ օծանելիքը ...
- 1) հալվում է 2) պնդանում է 3) գոլորշիանում է 4) խտանում է
- 6.Նշված մարմիններից ո՞րն է օժտված կինետիկ էներգիայով։
- 1) Մեղմված զսպանակը։

108

- 2) Օդի հոսանքը քամու ժամանակ։
- 3) Անշարժ անոթի մեջ լցված տաք ջուրը։
- 4) Գրասեղանին դրված գիրքը։
- **7.**Առարկան գտնվում է հարթ հայելուց 30սմ հեռավորության վրա։ Որքա $^{\circ}$ ն է պատկերի հեռավորությունը առարկայից.
- 1) 10ud 2) 15ud 3) 30ud 4) 60ud
- 8.Հավաքող ոսպնյակից ի՞նչ հեռավորության վրա պետք է տեղադրել առարկան, որպեսզի ստացվի առարկայի իրական պատկերը.
- 1) կիզակետից դուրս
- 2) կիզակետի և ոսպնյակի միջև
- 3) ցանկացած հեռավորության վրա կլինի իրական
- 4) ցանկացած հեռավորության վրա միշտ կլինի կեղծ
- 9. Ո՞րն է Ճիշտ շարունակությունը։

Եթե չեզոք ատոմը կորցնի էլեկտրոն, ապա այն ...

- 1) կմնա էլեկտրաչեզոք
- 2) կդառնա դրական իոն
- 3) կդառնա բացասական իոն
- 4) կունենա բացասական լիցք
- 10. Շիկացման լամպով և հաղորդչով անցնող հոսանքի ուժերը հավասար են։ Լամպի վրա լարումն ավելի մեծ է, քան հաղորդչի վրա։ Նշված պնդումներից ո՞րն է ձիշտ.
- 1) Լամպի թելիկի դիմադրությունն ավելի մեծ է, քան հաղորդչինը։
- 2) Հաղորդչի դիմադրությունն ավելի մեծ է, քան լամպի թելիկինը։
- 3) Լամպի թելիկն ու հաղորդիչն ունեն նույն դիմադրությունը։
- 4) Տվյալները բավարար չեն լամպի թելիկի և հաղորդչի դիմադրությունները համեմատելու համար։
- *11.* Ինչքա՞ն է ջրի ձնշումը 10մ խորությամբ ջրավազանի հատակին։ Ջրի խտությունը 1000կգ/մ³ է, մթնոլորտային ձնշումը ` 10^{5} Պա։
- **12.** Մարմինը դադարի վիճակից շարժվում է 2մ/վ² արագացումով։ Ինչքա՞ն ձանապարհ կանցնի մարմինը 5վ-ում և ինչքա՞ն արագություն կունենա այդ ձանապարհի վերջում։
- 13. Բևեռային շրջաններում խմելու ջուր ստանում են սառույցից։ Ինչքա՞ն ջերմաքանակ է անհրաժեշտ 2կգ -10° C-ի սառույցից 20°C-ի ջուր ստանալու համար։ Սառույցի տեսակարար ջերմունակությունը՝ 2100 Ջ/կգ.°C, ջրինը՝ 4200 Ջ/կգ.°C, սառույցի հալման տեսակարար ջերմությունը՝ 340000 Ջ/կգ։

- 14. Ունենք 3 Օմ և 6 Օմ դիմադրություններով երկու հաղորդիչ։ Պատկերեք այդ հաղորդիչների հաջորդական և զուգահեռ միացումները և հաշվեք այդ միացումների դիմադրությունները։
- 15. Առարկան գտնվում է հավաքող ոսպնյակից d<F հեռավորության վրա։ Կառուցեք այդ առարկայի պատկերը ոսպնյակում։ Որտե՞ղ է այն գտնվում, կե՞ղծ է, թե՞ իրական, ուղի՞ղ է, թե՞ շրջված, մեծացվա՞ծ է, թե՞ փոքրացված։

2013 թ. 7-րդ դասարան (առաջին փուլ)

1. 17*456 գրության մեջ աստղանիշի փոխարեն ո՞ր թվանշանը պետք է

3) 5

2. Նշված թվերից ընտրել այն, որն ունի ավելի շատ բաժանարար։

գրել, որ ստացված վեցանիշ թիվը բաժանվի 9-ի։ 2) 4

1) 0

	1) 30	2) 24	3) 20	4) 36	
3. Գտնել այ	ն թիվը, որ	ի 12.5%-լ	ը հավասար	է 4-ի։	
	1) 28	2) 30	3) 32	4) 40	
4. Գտնել այ	րտահայտո	ւթյան ա	րժեքը։		
-7 + 5	- -7+5				
	1) -10	2) 0	3) 10	4) 24	
5. Գտնել	$\frac{\frac{3}{4}:5}{7,136}$	$\frac{-0.15}{+19.37}$	արտահայւ	ոության ալ	ւժեքը։
	1) 2.5	2) 0	3) $4\frac{1}{3}$	4) 7.37	
6. Նույն արտադրողականությամբ աշխատող 6 տրակտորը 6 ժամում վարում է 6 հա։ Այդպիսի 5 տրակտորը քանի՞ ժամում կվարի 10 հա։ 1) 8 2)9 3) 12 4) 10					
7. Առաջին բրիգադը ս	բրիգադն ս ւշխատում	ւշխատա է 1.5 ս	նքը կարող	է կատարել դաղ։ Քանի	20 օրում։ Երկրորդ ՞ օրում կարող են

4)15


1) 12

2)50

3)10

- **8.**Ապրանքի գինը երկու անգամ հաջորդաբար էժանացրին, նախ 50%-ով, այնուհետև՝ 20%-ով։ Քանի՞ դրամ կդառնա 1350 դրամ արժողությամբ ապրանքի գինը երկու էժանացումներից հետո։
 - 1) 1080 2)540 3)675 4) 550
- 9. Նավակի արագությունը գետի հոսանքի ուղությամբ 15 կմ/ժ է, իսկ հոսանքին հակառակ ուղղությամբ` 10կմ/ժ։ Քանի՞ ժամում լաստը կանցնի 10կմ հեռավորություն։
 - 1) 2 2) 4 3)2,5 4) 3
- 10. Դասարանի բոլոր 15 աշակերտները գիտեն անգլերեն, կամ ռուսերեն։ Նրանցից 10-ը գիտի անգլերեն, 8-ը` և անգլերեն, և ռուսերեն։ Քանի՞ աշակերտ գիտի ռուսերեն։
 - 1) 5 2) 13 3) 8 4) 10
- 11. Արշակը և Բաբկենը միասին կշռում են 119 կգ, Արշակը և Գեղամը՝ 122 կգ, Բաբկենը և Գեղամ՝ 127 կգ։ Քանի՞ կգ է կշռում Բաբկենը։
 - 1) 57 2) 58 3) 62 4) 60
- **12**. Քանի՞ պարզ բաժանարար ունի 46200-ր։
 - 1) 9 2) 8 3) 5 4) 4
- **13.** Գտնել քանորդը, եթե բաժանելին 317 է, բաժանարարը ՝ 19, իսկ մնացրրդը՝ 13։
- **14**. Հայկը ժամը 9-ին դուրս եկավ A գյուղից և ժամը 16-ին հասավ B գյուղ, իսկ Արամը նույն օրվա ժամը 10-ին դուրս եկավ B գյուղից և A հասավ ժամը 17-ին։ Ժամը քանիսի՞ն նրանք հանդիպեցին։
- **15**. Անին 16 շոկոլադիկ գնելու համար չէր բավականեցնում 40 դրամ, իսկ 10 շոկոլադիկ գնելուց հետո նրա մոտ կմնար 200 դրամ։ Որքա՞ն դրամ ունի Անին։
- 16. Յուրաքանչյուր լվացքից հետո օմառի ծավալը փոքրանում է 25%-ով։ Ամենաքիչը քանի՞ լվացքից հետո այն կփոքրանա ոչ քիչ քան կրկնակի անգամ։
- 17. Մանկապարտեզում կա 20 հեծանիվ, դրանց մի մասը երկանիվ է, մյուս մասը` եռանիվ։ Բոլոր հեծանիվները միասին ունեն 55 անիվ։ Քանի՞ եռանիվ հեծանիվ կա մանկապարտեցում։
- 18. Ուղղի վրա նշված են 20 կետեր։ Քանի՞ հատված կա, որոնց ծայրակետերը այդ կետերն են։
- **19.** Վերելակը կարող է բարձրացնել 16 մեծահասակ կամ 20 երեխա։ Ամենաշատը քանի՞ մեծահասակ կարող է բարձրացնել վերելակը 15 երեխայի հետ։

20. P, Q, R և S պատկերները քառակուսիներ են P-ի մակերեսը 25սմ² է, իսկ Q-ինր՝ 36սմ²։ Գտնել S-ի մակերեսը։



7-րդ դասարան (երկրորդ փուլ)

1. Հաշվել արտահայտության արժեքը։

$$\left| 1,25 + \frac{5}{12} : \left(\frac{1}{3} \cdot 2, 5 - \frac{7}{8} \right) \right|$$

- **2.** 7-ով սկսվող տասանիշ թվի ցանկացած երեք իրար հաջորդող թվանշանների գումարը 15 է։ Գտնել այդ թվի վերջին թվանշանը։
- **3**. Գրքի գինը իջեցրին 20%-ով, իսկ հետո նոր գինը բարձրացրին 25%-ով, որից հետո այն դարձավ 500 դրամ։ Գտնել գրքի սկզբնական գինը։
- **4.** Հինգ իրարից տարբեր բնական թվերի միջին թվաբանականը 33 է։ Այդ թվերից մենափոքրը 30 է։ Գտնել այդ թվերից ամենամեծ թվի հնարավոր արժեքների քանակը։
- 5. Երկու վարպետ միասին աշխատանքը կատարում են 12 օրում։ Եթե առաջին վարպետը աշխատի 2 օր,իսկ երկրորդը՝ 3 օր, ապա կկատարվի ամբողջ աշխատանքի 20%-ը։ Վարպետներից յուրաքանչյուրը առանձին աշխատելու դեպքում այդ աշխատանքը քանի՞ օրում կկատարի։
- **6**. 1-ից մինչև 20 բնական թվերը բաժանել են խմբերի այնպես, որ յուրաքանչյուր խմբում ցանկացած երկու թվերի գումարը չի բաժանվում 5-ի։ Ամենաքիչը քանի՞ խմբերի կարելի է բաժանել այդ թվերը։
- 7. Գրատախտակին գրված են 1,...,10 թվերը։ Յուրաքանչյուր քայլում թույլատրվում է նշված թվերից որևէ վեցից յուրաքանչյուրի փոխարեն գրել նրանից 1-ով մեծ թիվ, իսկ մնացածը թողնել նույնը։ Հնարավո՞ր է, որ ինչ-որ քայլում գրատախտակին բոլոր թվերը լինեն նույնը։

8. Տրված է հետևյալ թվերի անվերջ շարքը`1;1;2;3;5;8;13;21;...։ Նկատել օրինաչափություն և պարզել հնարավո՞ր է արդյոք այս թվերի շարքում գտնվեն իրար հարևան երկու թվեր, որոնցից յուրաքանչյուրը բաժանվի 13-ի։

8-րդ դասարան (առաջին փուլ)

- 1. Հովազը կես կիլոմետրը անցնում է կես րոպեում։ Գտնել հովազի արագությունը.
 - ա) 90 կմ/ժ $\,$ բ) 60կմ/ժ $\,$ գ) 75կմ/ժ $\,$ դ) 30կմ/ժ
- **2.** 25711-ին ինչ թվանշան կցագրել, որ ստացված թիվը բաժանվի 12-ի.
- u) 8 p) 6 q) 4 n) 2
- 3. $2 \text{ might} \frac{47^2 23^2}{24 \cdot 28 + 24 \cdot 7}$
- u) 2; p) 70/206; q) 24/35; η) 576/840
- **4.** Հայրը 33 տարեկան է։ Նրա երեք որդիները համապատասխանաբար 5; 6; 10 տարեկան են։ Քանի՞ տարի հետո երեք որդիները միասին կլինեն հոր այժմյան տարիքին։
- $u) 4; p) 11; q) 5; \eta) 3$
- **5**. a-ն b-ից 1,5 անգամ մեծ է։ Քանի՞ տոկոսով է a-ն b-ից մեծ.
- ш) 30; p) 50; q) 100; η) 150;
- 6. Յուրաքանչյուր 10 րոպեն մեկ վառում են 1 մոմ, որը հանգում է 40 րոպե հետո։ 65 րոպե հետո քանի՞ մոմ կվառվի.
- u) 4 ; p) 5; q) 6 ; q) 7
- 7. A; B; C; D կետերը մի ուղղի վրա են։ AB=13; BC=11; CD=14; DA=12։ Գտնել ծայրակետերի միջև եղած հեռավորությունը.
- u) 14; p)38; q) 50; η)25;
- **8.** Ծածկագիրը կազմված է 6 թվանշաններից։ Հայտնի է, որ զույգ տեղերում գրված նիշերի գումարը հավասար է կենտ տեղերում գրված նիշերի գումարին։ Նշվածներից ո՞րը կարող է լինել ծածկագիր.
- ш) 81**61; р) 7*727*; q) 4*4141; η) 12*9*8
- 9. A դրական ամբողջ թվի համար ձիշտ է նշված 4 պնդումներից երկուսը։

- 1) A-ն բաժանվում է 5-ի 2) A-ն բաժանվում է 55-ի
- 3) A-ն բաժանվում է 11-ի 4) A<10

Գտնել A-ն։

- w) 0 p) 5 q)11 η)55
- 10. Հետևյալ պնդումներից ո՞րն է ձիշտ.
- 1.Գոյություն ունեն 2 թիվ, որոնց մոդուլը 5 է։
- 2.Եթե |x+2|=1, ապա արմատների միջին թվաբանականը հավասար ξ -2:
- 3. Եթե x-ի և 2-ի միջև հեռավորությունը 5 է, ապա |x-5|=2:
- 4. Կան անթիվ թվեր, որորնց համար | x-1 |≤0:
- w) 1;2;3 p)1;2 q)3;4 η)1;4
- **11.** Գրել կոորդինատների սկզբնակետով և y=2x+1 ուղղի x=1 աբսցիս ունեցող կետով անցնող ուղղի հավասարումը։

u)
$$y = x$$
 p) $y = 3$ q) $y = 3x$ η) $y = x + 2$

12.
$$\frac{a}{b} = \frac{4}{9}; \frac{b}{c} = \frac{5}{3}$$
: Quality $\frac{a-b}{b-c}$ -ii:

- $(m) 7/12; \quad (p) -25/18 \quad (q) 4; \quad (q) 5/2$
- **13.** Լուծել 5(2x+3)(x+2)-2(5x-4)(x-1)=12 հավասարումը:
- **14**. Քանի[°] պարզ թիվ կա, որը հնարավոր է ներկայացնել երկու պարզ թվերի գումարով և միաժամանակ երկու պարզ թվերի տարբերությամբ։
- **15.** A բազմությունն ունի 5 տարր, A∪B բազմությունը` 12 տարր, իսկ A∩B բազմությունը` 2 տարր։ Քանի՞ տարր ունի B բազմությունը։
- **16.** Շարժիչի հզորությունը W է, աշխատանքի ժամանակը t, աշխատանքը`A։ Արտահայտեք A,W,t-ի կապը։
- **17**. Արամը մտածեց նոր գործողություն` a \Box b=2a+3b: Հաշվել` 3 \Box (4 \Box 5):
- **18.** ABC հավասարասրուն եռանկյան AC հիմքը 12 է, իսկ սրունքին տարված AH բարձրությունը՝ 6։ Գտնել եռանկյան հիմքին առընթեր անկյան աստիճանային չափը։
- 19. ABC հավասարասրուն եռանկյան AC հիմքը 12 է, իսկ AH բարձրությունը՝ 6։ AL-ը եռանկյան կիսորդ է։ Գտնել HL-ը։

20. AC հիմքով ABC հավասարասրուն եռանկյան մեջ BC-ի վրա վերցված են K և M կետերն այնպես, որ AM=MK և ∠CAM=∠KAB: Գտնել ∠BAM-ն։

8-րդ դասարան (երկրորդ փուլ)

1.
$$\angle \text{m2ylp}$$
. $\frac{2 \cdot 3^{20} - 5 \cdot 3^{19}}{9^9}$

2. Նկատել բանաձև և գտնել արտահայտության արժեքը.

$$x^3 - 9x^2y + 27xy^2 - 27y^3$$
, that $x = 1\frac{1}{2}$ if $y = -0.5$

- **3.** Տրված է y = -4x + 3 ֆունկցիան։ (1; a) կետը պատկանում է այդ ֆունկցիայի գրաֆիկին։ Գտեք a-ն։
- 4. Գիրքը ժամանակին գրադարան հանձնելու համար աշակերտը պետք է օրական կարդար 40 էջ, բայց նա օրական 15 էջ պակաս էր կարդում և գիրքը հանձնեց ժամանակից 6 օր ուշ։ Աշակերտ քանի՞ օրում պետք է կարդար գիրքը։
- 5. Վերլուծել արտադրիչների. 9b²-(x+2y)²+8xy
- **6.** Ուղղանկյան մի կողմը մեծացրին 25 տոկոսով։ Քանի՞ տոկոսով պետք է փոքրացնեն մյուս կողմը, որպեսզի ուղղանկյան մակերեսը մնա նույնը։
- 7. Հավասարասրուն եռանկյան գագաթի անկյունը 36° է, հիմքի երկարությունը`4։ Գտնել այդ եռանկյան հիմքին առընթեր անկյան կիսորդի երկարությունը։
- 8. Քանի[°] եղանակով է հնարավոր 3 տղայի և 3 աղջկա շարք կանգնեցնել այնպես, որ միևնույն սեռի անձիք չլինեն իրար կողքի։

9-րդ դասարան (առաջին փուլ)

4) 2

1. Քանի՝	<i>៓</i>	է 40 <mark>–</mark> ը մեծ	20–ից։
1\ =	. ^	0) 100	0/0

1) 50 2) 100 3)200

2. Երկնիշ թվի տասնավորը a-ն է,միավորը՝ b-ն։Ի՞նչ պայմանի դեպքում այդ թիվը կբաժանվի 6-ի a-ի և b-ի բոլոր հնարավոր արժեքների դեպքում։

1)
$$a+b=6$$
 2) $b=2a$ 3) $a=2b$ 4) $b=5a$

	$3\pm\sqrt{3}$	2) -3	3)-3 lı	. 3	4) 3	
5.	Գտեք այն ս	ոմբողջ թվերի	քանակը, ւ	որոնք	$x^2 \le 9$ $\sqrt{x} \le 2$	համախմբի
լու	ծում են։				-	
1	1) 5	2) 4	3) 7	4) 8		
6. 9	Դտեք այն ա	2) 4 մբողջ թվերի ք	անակը, ոլ		$\int_{0}^{x^{2}} \leq 9$ $\int_{0}^{x} \leq 2$	ոամակարգի
	ծում են։					
	1)	52)	4	3) 3	4) 7	7
7.	b < 0 դեպքո	ເປ $\sqrt{27a^8b^2}$ ພຖ	ւտահայտո	ւթյունը	հավաւ	սար է.
	1) $3\sqrt{3}a^4b$	$2)-3\sqrt{3}a^4b$	3)-3	$\sqrt{3}a^6b$	4) $3\sqrt{3}$	Ba^6b
8. 4	Պարզեցրեք	$\frac{4a^2}{2a-b} + \frac{b^2}{b-2a}$ 2) $-b-2$	-2a wpm	ահայտ	ությունլ	<u>ī</u> :
	1) $1-2a$	2) $-b-2$	2a	3) $-l$	b	4) <i>b</i>
9.	Π° p pwn	որդին է պւ	ատկանում	y = 1	1-x	y = x - 3
ֆn	ւնկցիաների	գրաֆիկների l	հատման կ	ետը։		
	1) I			Ι		
		յի յուրաքանչյ				
		նի է,որ խորս ւղ։ Ամենաքիչը				
qm		ոլ. Ասսսաքրչը 2) 5			լո լաուլուա	սալուլը.
11	1) 2 Գլոեր	$b^2 + a^2 + 4b - 1$) 1 111m1m111	ıhıııınnı	เรียบเล	ինուրուովոր
	ւքրագույն այ		allara	ii ai a	-Jojana	iium[imqii]i
-	, :		$(2\sqrt{6})$			
12.	Հաշվել՝ (۷	$\frac{75 + \sqrt{50})(5 - 2)}{\sqrt{3} - \sqrt{2}}$:			
110	5	, ,				

3. Գտեք 2(x-1) = -3(-x+1) - x հավասարման արմատները։

արմատն է։

1) -2 2) -3 3) արմատ չունի 4) կամայական թիվ 4. m-ի ո՞ր արժեքի դեպքում 3–ը $x^2+m^2-6m=0$ հավասարման

- 13. $x^2 + 3x 1 = 0$ հավասարումն ունի երկու արմատ՝ x_1 ն x_2 : Հաշվել՝ $(x_1 - x_2)^2$:
- 14. Դիցուք *A* –ն 3–ի բաժանվող երկնիշ թվերի բազմությունն է, իսկ B -ն 5–ի բաժանվող երկնիշ թվերի բազմությունը։

Գտեք A∩ B բազմության տարրերի քանակը։

- 15. M -ը և N -ը ABC եռանկյան համապատասխանաբար AB և BC կողմերի միջնակետերն են։ Գտեք AMN եռանկյան մակերեսը, եթե ABC եռանկյան մակերեսը 24 է։
- 16. Վերելակը կարող է բարձրացնել 12 մեծահասակ կամ 20 երեխա։ Ամենաշատր քանի՞ երեխա կարող է բարձրացնել վերելակր 9 մեծահասակի հետ։
- 17. Շրջանագծին արտագծած հավասարասրուն սեղանի հիմքերի երկարություններն են 4 և 9։ Գտեք շրջանագծի շառավիդը։
- 18. Գտեք 6 և 8 անկյունագծերով շեղանկյան անկյունագծերի հատման կետի հեռավորությունը կողմի միջնակետից։
- 19. Գտեք 6 և 8 անկյունագծերով շեղանկյան անկյունագծերի հատման կետի հեռավորությունը նրա կողմից։
- 20. ABC սուրանկյուն եռանկյունում $\angle AHB = 140^{\circ}$, որտեղ H pեռանկյան բարձրությունների հատման կետն է։ Գտեք $\angle ABO$ –ն, որտեղ O–ն եռանկյանն արտագծած շրջանագծի կենտրոնն է։

- 9-րդ դասարան (երկրորդ փուլ) 1. Հաշվեք $\sqrt{\left(\sqrt{15}-4\right)^2}+\sqrt{15}-2$ արտահատության արժեքը։
- 2. Գտնել արտահայտության արժեքը

$$\left(\frac{x-2}{x^2-2x+4} - \frac{6x-13}{x^3+8}\right) : \frac{12-4x}{2x^2-4x+8}, \text{ hpt } x = 3,5$$

3. Լուծել անհավասարումը

$$\sqrt{7-x} \ge \sqrt{2x-5}$$

4. Հայտնի է,որ $x_1 = 3$ -ը $2x^2 + 16x + a = 0$ հավասարման արմատ է։ Գտնել հավասարման երկրորդ արմատր և a թիվը։

- 5. Մի քանի մարդկանց տարիքների արտադրյալը հավասար 1664 է։ Հայտնի է, որ նրանցից փոքրը երկու անգամ փոքր է մեծից։ Գտեք մարդկանց քանակը և տարիքները, եթե նրանց տարիքը արտահայտվում է ամբողջ թվով։
- 6. Հինգ մարդ՝ ձշմարտախոսներ և ստախոսներ, նստած են կլոր սեղանի շուրջը։ Նրանցից յուրաքանչյուրը հայտարարեց, որ իր երկու հարևանները ստախոս են։ Քանի՞ ստախոս է նստած սեղանի շուրջը, եթե ստախոսները մշտապես ստում են, իսկ ձշմարտախոսները մշտապես ձիշտ են խոսում։
- 7. ABCD հավասարասրուն սեղանի սուր անկյունը 60^{0} է, սրունքի երկարությունը 8 է, իսկ BC փոքր հիմքի երկարությունը` 5։

Գտնել սեղանի մակերեսը։

8. Երկնիշ թիվը 6-ով փոքր է իր թվանշանների գումարի քառակուսուց։ Գտնել այդպիսի թվերը։

10-րդ դասարան Մաթեմատիկա

1. Հաշվել արտահայտության արժեքը

$$ui)\frac{7\sqrt{30}}{3\sqrt{10}-10\sqrt{3}}+\sqrt{3}+\sqrt{10}$$

$$p) \ 2013 \cdot \left(1 - \frac{1}{2^2}\right) \left(1 - \frac{1}{3^2}\right) \cdot \dots \cdot \left(1 - \frac{1}{2013^2}\right)$$

- **2.** Գտնել m և n թվերը, եթե x_1 -ը և x_2 -ը $x^2 + (m-2n)x + 3m + 2n = 0$ հավասարման արմատներն են, որոնք բավարարում են $x_1 + x_2 = 6$, $x_1 \cdot x_2 = -6$ պայմաններին:
- 3. Կատարել առաջադրանքները.
- **ա**) Գտնել (a_n) թվաբանական պրոգրեսիայի տարբերությունը, եթե $3a_1 7a_2 + 4a_3 = 4$:

- **բ)** Գտնել 200-ից փոքր այն բնական թվերի քանակը, որոնք 3-ի բաժանելիս ստացվում է 1 մնացորդ։
- $m{q}$) $m{(}b_nm{)}$ անվերջ նվազող երկրաչափական պրոգրեսիայում $m{q}=rac{2}{3},\ S=9$: Գտնել b_1 -ը:
- դ) Գտնել (b_n) երկրաչափական պրոգրեսիայի հայտարարը, եթե $b_1 = 2; b_n = 486; S_n = 728:$
- 4. Գիրքը բաղկացած է երկու բաժնից, ընդ որում, առաջին բաժինը 20 էջով ավելի է գրքի կեսից և 20 % ավել էջ ունի, քան երկրորդ բաժինը։
- **ա)** Օրական հավասար էջեր կարդալով աշակերտը քանի՞ օրում կկարդա ամբողջ գիրքը, եթե առաջին բաժինը կարդում է 12 օրում։
 - **բ)** Քանի՞ էջ ունի գիրքը։
- **գ)** Քանի[°] թվանշան է գրվել գրքի առաջին բաժնի էջերը համարակալելիս (համարակալումը սկսվում է 1-ից)։

5. Spilud
$$\xi$$

$$\begin{cases} (8-x)(3+x) > 0 \\ 2x-a \le 3 \end{cases}$$
 huululuupap:

- ա) Լուծել համակարգի առաջին անհավասարումը և գտնել նրա ամբողջ լուծումների քանակը։
- p) Find p in p in
- q) Ամբողջ թվերով քանի՞ լուծում ունի համակարգը a=2 արժեքի դեպքում։
- η) Tupq p-U p- $\textit{U$
- 6. ABC ուղղանկյուն եռանկյան A անկյան կիսորդը BC էջը հատում է D կետում։ D կետով տարված է AC-ին զուգահեռ ուղիղ, որն AB ներքնաձիգը հատում է E կետում։ Հայտնի է, որ AE=15 , CD=12 :
- ա) *Գտնել DE հատվածի երկարությունը։*
- բ) *Գտնել AC կողմի երկարությունը։*

- գ) Գտնել ADE եռանկյան մակերեսը։
- դ) Գտնել BD հատվածի երկարությունը։
- ե) Գտնել ABC եռանկյանն արտագծած և ներգծած շրջանագծերի կենտրոնների հեռավորությունը։
- 7. Դիցուք, A -ն 1-ից մինչև 20 բնական թվերի բազմությունն է։ Քանի՞ եղանակով կարելի է այդ բազմությունից ընտրել երկու թիվ այնպես, որ դրանց արտադրյալը լինի 3-ի բազմապատիկ։

ՖԻՉԻԿԱ


- 1. Գնացքում կանգնած ուղևորը՝ անկախ իր կամքից, թեքվեց դեպի ետ։ Ինչո՞վ էր դա պայմանավորված։/1/
- 1) Գնացքի շրջադարձով։
- 2) Գնացքի արգելակմամբ։
- 3) Գնացքի արագության կտրուկ փոքրացմամբ։
- 4) Գնացքի արագության կտրուկ մեծացմամբ։
- 2. Ինչպիսի[°] արագություններ ձեռք կբերեն հրացանը և կրակոցի ժամանակ դրա փողից դուրս թռչող փամփուշտը./1/
- 1) միշտ նույն արագությունները,
- 2) միշտ տարբեր արագություններ,
- 3)հրացանը արագություն ձեռք չի բերի, իսկ փամփուշտը՝ ձեռք կբերի,
- 4) տարբեր արագություններ՝ կախված աշխարհագրական դիրքից։
- 3. Զսպանակին ամրացված գնդիկը երկու լրիվ տատանման ընթացքում անցել է 32սմ Ճանապարհ։ Որքա՞ն է գնդիկի տատանումների լայնույթը։/1/
- 1) 64ul, 2) 16ul, 3) 8 ul, 4) 4ul
- 4. Մետաղական բաժակի մեջ լցված է ջուր։ Ω ր գործողությունն է բերում ջրի ներքին էներգիայի մեծացմանը.
- ա/ ջուրը տաքացնում են էլեկտրասալիկի վրա,
- r/ ջուրը բաժակի հետ միասին համընթաց շարժման մեջ են դնում աշխատանք կատարելով։/1/
- 1) Միայն ա 2) Միայն բ 3)Ե´վ ա, և´ բ

- 4) Երկու դեպքում էլ ջրի ներքին էներգիան չի փոխվում։
- 5. Ո՞ր մարմինն ավելի շատ կտաքանա՝ կապարե կտորը, թե՞ նույն զանգվածի պողպատե կտորը, եթե դրանց հարվածեն մուրձով միևնույն ուժով և նույնքան անգամ։ $c_{\text{կապ}}=140~\Omega/\text{կq.°C}$, $c_{\text{պող}}=500~\Omega/\text{կq.°C}$:/1/
- 1) Կապարե կտորը,
- 2) Պողպատե կտորը,
- 3) Կտաքանան միևնույն չափով,
- 4) Խնդրի տվյալները բավարար չեն որոշելու համար։
- 6. Մարզիկը դահուկներով սահում է սարի թեք լանջով դեպի ներքև։ Նրա վրա ազդող ծանրության ուժն ուղղված է ... /1/
- 1) ուղղաձիգ դեպի վեր,
- 2) ուղղաձիգ դեպի ներքև,
- 3)թեք լանջով դեպի վեր,
- 4) թեք լանջով դեպի ներքև։
- 7. Ինչի՞ց է կախված հաղորդչի դիմադրությունը./1/
- 1)հաղորդչի ծայրերին կիրառված լարումից,
- 2)հաղորդչի չափերից և նյութի տեսակից,
- 3) հաղորդչով անցնող հոսանքի ուժից,
- 4)միայն հաղորդչի նյութի խտությունից։
- 8. Տանը միաժամանակ միացված են արդուկը, փոշեկուլը և էլեկտրալամպը։ Նշված պնդումներից ո՞րն է (որո՞նք են) Ճիշտ./1/ա/ էլեկտրական սարքերում հոսանքի ուժերը նույնն են,
- բ/ էլեկտրական սարքերը միացված են հաջորդաբար,
- գ/ Էլեկտրական սարքերի վրա լարումները նույնն են,
- դ/ էլեկտրական սարքերը միացված են զուգահեռ։
- 1) ឬក្រឃ្យាំ ឃ-៤, 2) ឬក្រឃ្យាំ q-៤, 3) ឃ-៤ ៤ ក្-៤, 4) q-៤ ៤ ក្-៤:
- 9. Ո՞րն է սխալ պնդում։/1/

Կոձի մագնիսական դաշտր կարելի է ուժեղացնել.

- 1)մեծացնելով նրանով անցնող հոսանքի ուժը,
- 2)ավելացնելով գալարների քանակը,
- 3)նրա մեջ մտցնելով պողպատե միջուկ,
- 4)նրա մեջ մտցնելով պղնձե միջուկ։


10. Նշվածներից ո՞րն է առավել ձիշտ համապատասխանում AB առարկայի A_1B_1 պատկերին հարթ հայելում։ /1/



- 11. Մոտոցիկլավարն անցավ 200 կմ։ Շարժման ժամանակի առաջին կեսում նա շարժվում էր 60կմ/ժ արագությամբ, իսկ մյուս կեսում անցավ 80կմ։ Ինչքա՞ն էր նրա արագությունը ձանապարհի երկրորդ տեղամասում։ /2/
- 12. Ի՞նչ ուժ է անհրաժեշտ 100 կգ զանգվածով գրանիտե սալը ջրում պահելու համար։ Գրանիտի խտությունը 2500կգ/մ³ է, ջրի խտությունը 1000կգ/մ³։ /2/
- 13. Կոփման համար 0,3 կգ զանգվածով պողպատե դետալը իջեցրին 0,8 կգ ջրի մեջ։ Ջրի ջերմաստիձանը 20°C-ից դարձավ 60°C։ Ինչքա՞ն էր դետալի սկզբնական ջերմաստիձանը։

Պողպատի տեսակարար ջերմունակությունը 500 Ձ/կգ.°C , ջրինը՝ 4200 Ձ/կգ.°C : /2/

14. Որոշեք նկարում պատկերված շղթայի լրիվ դիմադրությունը և չորրորդ լամպի սպառած հզորությունը։ R₁=2 Oմ, R₂=1 Oմ, R₃=5 Oմ, R₄=1 Oմ, I=2 Ա: /2/



R₃ R₄ 15. Առարկայից մինչև էկրան հեռավորությունը 3մ է։ Ի՞նչ օպտիկական ուժի ոսպնյակ պետք է վերցնել, որպեսզի առարկայի պատկերն էկրանին ստացվի 5 անգամ մեծացված։ Ներկայացրեք առարկայի պատկերի կառուցման սխեմատիկ գծագիրը։ /2/

2014 թ.

7-րդ դասարան (առաջին փուլ)								
1. Քանի	ຶ 0-ni	<u> </u> ኒ	վերջանում	առաջին	2014	hwun	պարզ	թվերի

3.Գտնել 588 և 630 թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։

4. Չորս տարբեր բնական թվերի արտադրյալը հավասար է 100-ի։

p) 7210 q) 7

q) 0.25 nú^3 n) 0.025 nú^3

ա) 0 p) 2 q) 1 դ) այլ պատասխան

բ) 2,5 դմ³

2. $0,0025 \, d^3 - p \, \text{արտահայտել } \, nd^3 - nd$.

արտադրյալը:


ա) 25 դմ³

_ , , , ,	վերի գում։	այւը։		
		q) 18	դ) 30	
5.Վերելակը	կարող է	բարձրացն	ել կամ 12 մ	մեծահասակ, կամ 20
				երեխա կարող է
բարձրացնել				
			I	n) 7
				։ 3.947.209 թվի վերջին
թվանշանը։				1.11 1.121
w) 6	բ) 5	q) 4	η) '	7
7. Ավտոմեք	ենան անցս	սվ Ճանապ	արհի $\frac{3}{4}$ մա	սը։ Ճանապարհի ո [°] ր
տոկոսը մնա	ւց անցնելո	L:		
u) 20		p) 25	q) 75	ŋ) 15
8. Առաջադր	անքը կատ	ւարելու հա	մար Նարեկ	ին պահանջվում է 12
				ով աշխատեն 4 օր և
				Կարենը կավարտի
-				
աշխատանք	ր։		1 1	
աշխատանք ա) 20	_	p) 10 q) 6		
u) 20	_	բ) 10 — գ) <i>6</i> տուն են կս	5 դ) 12	ոոգին քանի՞ օրում 3
ա) 20 9. 20 hnգի 20	_ 00 օրում 2 ւ		5 դ) 12	ոոգին քանի՞ օրում 3
ա) 20 9. 20 հոգի 20 տուն կկառո	- 00 օրում 2 ։ ւցեն։	տուն են կս	5 դ) 12 ւռուցում։10 հ	
ա) 20 9. 20 հոգի 20 տուն կկառո	- 00 օրում 2 ։ ւցեն։	տուն են կս	5 դ) 12 ւռուցում։10 հ	
ա) 20 9. 20 հոգի 20 տուն կկառո ա) 400 10. Տրված է	- 00 օրում 2 դ ւցեն։ բ) 100 19700019d	տուն են կս գ) 500 իննանիշ	5 դ) 12 սռուցում։10 և դ) 600 թիվը։ d-ի ւ	ոոգին քանի [°] օրում 3) ո՞ր արժեքի դեպքում
ա) 20 9. 20 հոգի 20 տուն կկառո ա) 400 10. Տրված է	- 00 օրում 2 դ ւցեն։ բ) 100 19700019d	տուն են կս գ) 500 իննանիշ	5 դ) 12 սռուցում։10 և դ) 600 թիվը։ d-ի ւ	
ա) 20 9. 20 հոգի 20 տուն կկառո	- 00 օրում 2 դ ւցեն։ բ) 100 19700019d	տուն են կս գ) 500 իննանիշ	5 դ) 12 սռուցում։10 և դ) 600 թիվը։ d-ի ւ) ո՞ր արժեքի դեպքում
ա) 20 9. 20 հոգի 20 տուն կկառո ա) 400 10. Տրված է	- 00 օրում 2 դ ւցեն։ բ) 100 19700019d	տուն են կս գ) 500 իննանիշ	5 դ) 12 սռուցում։10 և դ) 600 թիվը։ d-ի ւ	

11.
$$2 \text{ might} \left| 2 \frac{3}{4} - 3.8 \right| : 0.01$$

- **12.** Գտնել ամենափոքր բնական թիվը, որի վրա չի բաժանվում 2520 թիվը։
- **13.** x, 3 և 15 թվերի միջին թվաբանականը հավասար է x-ի։ Գտնել x-ր։
- **14.** Արևի տակ տաքանում էին մի քանի կատու։ Նրանք միասին 30 թաթ ավելի ունեին, քան ականջ։ Քանի[°] կատու էին տաքանում արևի տակ։
- **15.**Գտնել 2-ից փոքր 5 հայտարարով բոլոր անկանոն կոտորակների գումարը։
- 16.Գնացքը A-ից B 600 կմ ձանապարհն ըստ չվացուցակի պետք է անցներ 10 ժամում։ Շարժումն սկսելուց 4 ժամ հետո գնացքը C կայարանում հարկադրաբար 1 ժամ կանգնեց, որից հետո ավելացնելով նախատեսված արագությունը՝ ժամանակին հասավ կայարան։ Գնացքը CB ձանապարհահատվածը քանի՞ կմ/ժ արագությամբ անցավ։
- **17.** 3 թվի 40 տոկոսը բազմապատկեցին 3 թվի 60 տոկոսով։ Արդյունքում 3 թվի քանի՞ տոկոսը ստացվեց։
- **18.**Քանի[°] եղանակով է հնարավոր 3 տղայի և 2 աղջկա շարք կանգնացնել այնպես, որ միևնույն սեռի անձինք չլինեն իրար կողքի։
- 19.Արմինեն գումարել է ուղղանկյան որևէ երեք կողմերի երկարությունները և արդյունքում ստացել է 20 սմ։ Վարդանը գումարել է նույն ուղղանկյան որևէ երեք կողմերի երկարությունները և արդյունքում ստացել է 22 սմ։ Գտնել այդ ուղղանկյան պարագիծը։
- 20. Գտնել ուղղանկյուն զուգահեռանիստի ստվերագրված նիստի

մակերեսը, եթե նրա ծավալը 8 դմ³ է, իսկ հիմքի կողմերից մեկի երկարությունը 40 սմ է։



8-րդ դասարան (առաջին փուլ)

 η) $\frac{4444}{5555}$

q) $\frac{555}{666}$

a > b > c ։ Գտնել (a-b)(b-c)(c-a) արտահայտության արժեքը։

2. a,b,c այնպիսի բնական հաջորդական կենտ թվեր են, որ


1. Նշված կոտորակներից ո՞րն է ամենամեծը.

p) $\frac{66}{77}$


 $u) \frac{7}{8}$

u) 4	p) -4	q) 1	6	դ) -16		
3 . 2014+2014++2	.014 գումար	ւի բոլոր գու	ւմարելի	ւները հավ	ասար են։	
Ամենաքիչը քան	ի՞ գումարկ	ելի պետք	է լինի,	որպիսզի	գումարը	
բաժանվի 20-ի։						
u) 5	p) 10	q) 2	0	ŋ) 4		
4. $\left(7^{10}-7^9+7^8\right)$	թիվը բւ	սզմապատ]	իկ է .			
ա) 28-ին բ)	301-ին	գ) 63-ին	ŋ) ´	7 ⁹ -ին		
5. Հաշվել. 1202						
$m) \frac{89}{309}$ p)	0.4	$a > \frac{3}{2}$	n) .	29		
6. 5463	թվերի	միջև դրե	ւլ են	+,-,× 1	ւշանները,	
յուրաքանչյուրը					0	
արդյունքը չի կայ	րող ստացվ՝	ել.				
u) 17 p) 2	26	q) 19	ŋ) 2	1		
7. 6 աշխատողը	6 օրում պա	ստրաստու	մ են 6 ռ	ոբոտ։ Քա	նի՞ օրում	
8 աշխատողը կպատրաստեն 32 ռոբոտ։						
ա) 24 բ	e) 8 q) 4	8	դ) 6			
8. $(n-2)^3 - (n \cdot (n-2)^3)$	$(3+(n-3)^2)$)-10) u	ւրտահս	սյտության	արժեքը	
ցանկացած <i>n</i> ամ						
ա) 18-ի բ						
9. Եթե <i>n</i> բն		_	_	_	ացորդում	
կստացվի <i>x</i> :Ել						
կստանացվի y: (.					0 1 1	
1 оп / (-	· · / I L I I	1 L J1L	1	ι 1 ζ.		
					125	

- u) (5;6) p) (7;1) <math>q) (9;7) $\eta) (0;0)$
- **10.** Թվարկած ո՞ր եռանկյան մասին կարելի է ասել, որ այն հավասարասրուն է, սակայն ոչ հավասարակողմ.
- ա) 300 և 600 անկյուններով եռանկյունը
- գ) երեք հավասար անկյուններով եռանկյունը
- r) 30° և 100° անկյուններով եռանկյունը
- դ) 500 և 800 անկյուններով եռանկյունը
- 11. Գտնել $10^{2014} 2014$ թվի թվանշանների գումարր։
- 12. Գտնել BAC անկյան մեծությունը, եթե CD և BD հատվածները կիսում են B և C անկյունները, իսկ $\angle BDC = 5\alpha$:
- **13.** $x^2 y^2 10x 12y 11$ Վերլուծել արտադրիչների։



- **14.** Թիվը երկու անգամ հաջորդաբար նույն տոկոսով իջեցնելուց հետո, ստացան տրված թվի $\frac{1}{4}$ մասը։ Քանի՞ տոկոսով իջեցրին տրված թիվը յուրաքանչյուր քայլում։
- **15.** Յոթ հաջորդական բնական թվերի գումարը հավասար է 980։ Քանի՞սն են դրանցից պարզ։
- 16. Տասը բանվորից բաղկացած բրիգադը նախատեսել էր մի որոշ առաջադրանքը ավարտել 12 օրում։ Եթե բրիգադն օրվա կեսն աշխատեր նախատեսվածից երկու անգամ ավելի դանդաղ, իսկ երկրորդ կեսը՝ նախատեսվածից երկու անգամ ավելի արագ, ապա տրված ժամկետում քանի՞ տոկոսով կգերակատարեր առաջադրանքը։
- 17.Երկու հեծանվորդ, որոնց արագություններն են 10կմ/ժ և 15կմ/ժ, դուրս եկան շրջանագծի A կետից հակառակ ուղղություններով։ Քանի՞ կետ կա շրջանագծի վրա, որտեղ այդ հեծանվորդները կարող են հանդիպել։
- **18.** y = 3x ֆունկցիայի գրաֆիկը 2 միավոր տեղափոխել աջ ,որից հետո 5 միավոր ներքև։ Գրել ստացված ֆունկցիայի բանաձևը։



 $\mathbf{u}) \left(-\infty; 1\right) \qquad \mathbf{p}) \left(-\infty; \frac{27}{7}\right) \qquad \mathbf{q}) \left[\frac{2}{7}; 5\right) \qquad \mathbf{\eta}) \left(1; +\infty\right)$

127

- 8. Գտնել հավասարման արմատների քանակը. $(x-7)(x+3) + (x-1)(x+5) + 25 = 0 \\ w) \ 2 \qquad p) \ 0 \qquad q) \ 1 \qquad \eta) \ 3$
- ա) 2 p) 0 q) 1 դ) 3 9. $x^2 + 3x 1 = 0$ հավասարումն ունի երկու արմատ՝ x_1 և x_2 : Հաշվել՝ $(x_1 x_2)^2$
- ખ) 9 p) 13 q) 11 η) 5

 10. 2ω2վել. $\frac{1}{3+2\sqrt{2}} + \frac{1}{3-2\sqrt{2}}$ ω) $\frac{16}{17}$ p) $\frac{1}{3}$ q) 2 η) 6
- 11. Գտնել (1; 17) միջակայքին պատկանող պարզ թվերի քանակը։
- 12. Հոսանքի ուղղությամբ նավակի արագությունը քանի՞ կմ/ժ-ով է ավել հոսանքին հակառակ ուղղությամբ նավակի արագությունից, եթե հոսանքի արագությունը 5,5 կմ/ժ է։
- 13. Գտնել $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6$ և 6^3 թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։
- 14. Մեծ քառակուսուց հեռացվել է փոքր քառակուսի, որի արդյունքում քառակուսու մակերեսը նվազել է 4%-ով։ Քանի՞ անգամ է մեծ քառակուսու կողմը մեծ փոքր քառակուսու կողմից։
- 15. Քանի՞ տարբեր կարգավորված (x;y) թվազույգեր գոյություն ունեն, եթե x-ը զույգ ամբողջ թիվ է այնպիսին, որ $4 \le x \le 10$, իսկ y-ը ամբողջ թիվ է այնպիսին, որ 4 < y < 10:
- 16. Երեկույթի ժամանակ յուրաքանչյուր անձ ձեռք սեղմեց 5 այլ մարդկանց հետ։ Ընդհանուր տեղի ունեցավ 60 ձեռքսեղմում։ Քանի՞ մարդ կար երեկույթի ժամանակ։
- 17. Շունը դուրս գալով տանից, քայլում է 18 կիլոմետր հյուսիս, ապա 24 կիլոմետր արևելք։ Եթե շունը ցանկանում է այդ կետից անմիջականորեն գնալ տուն ուղիղ գծով և քայլում է ժամում 2 կիլոմետր ձանապարհ, որքան ժամանակ կտնի վերադարձի ձանապարհը։
- 18. Ուղղանկյուն եռանկյան ներքնաձիգը 13սմ է, իսկ էջերի գումարը 17սմ։ Գտեք եռանկյանը ներգծած շրջանագծի շառավիղը։ 128


- 19. ABCD ուղղանկյան A անկյան կիսորդը BC կողմը հատում է K կետում։ Հայտնի է, որ BK=5սմ, KC=7սմ։ Գտեք ուղղանկյան մակերեսը։
- 20. Հավասարասրուն սեղանի անկյունագիծը 25սմ է, իսկ բարձրությունը՝ 15սմ։ Գտեք սեղանի մակերեսը։

7-րդ դասարան (երկրորդ փուլ)

- 1. Կատարել գործողությունները. $\left| \frac{3}{4} : 3\frac{3}{4} 0,45 \right| \cdot 1\frac{1}{5} (-1,7)$:
- 2. Տրակտորներից մեկը 3 ժամում վարում է դաշտի $\frac{1}{7}$ մասը, իսկ երկրորդը 7 ժամում վարում է դաշտի 25%։ Միասին աշխատելով երկու տրակտորները քանի՞ ժամում կվարեն այդ դաշտր։
- 3. Արկղում եղած խնձորների թիվը եռանիշ է։ Հայտնի է, որ այդ խնձորները կարելի է հավասարապես բաժանել թե՛ 2, թե՛ 3 և թե՛ 5 երեխաների միջև, բայց հնարավոր չէ բաժանել 4 երեխաների միջև։ Նվազագույնը քանի՞ խնձոր կա արկղում։
- 4. Մաթեմատիկայի առաջադիմող 7 աշակերտներից պետք է կազմել 6 հոգանոց օլիմպիական թիմ։ Քանի՞ եղանակով է դա հնարավոր անել։
- 5. Վեցանիշ թիվը վերջանում 7-ով։ Եթե այդ թվի վերջին թվանշանը՝ 7-ը ջնջենք և գրենք այդ թվի սկզբում, ապա ստացված թիվը սկզբնականից մեծ կլինի 5 անգամ։ Գտնել այդ վեցանիշ թվի թվանշանների գումարը։
- 6. A բնական թվի մասին արվում է չորս պնդում, դրանք են` A-ն բաժանվում է 5-ի, A-ն բաժանվում է 11-ի, A-ն բաժանվում է 55-ի, A-ն 10-ից փոքր է։ Հայտնի է, որ այդ պնդումներից երկուսը ձիշտ են, իսկ երկուսը սխալ։ Գտնել A-ն։
- 7. Ճշտախոսներից և ստախոսներից կազմված 25 հոգանոց հերթում կանգնած առաջինից բացի բոլոր մարդիկ ասացին, որ իրենց առջևում կանգնած մարդը ստախոս է, իսկ առաջին

կանգնած մարդն ասում է, որ իրենից հետո կանգնած բոլոր մարդիկ ստախոս են։ Քանի՞ ստախոս կա հերթում։

8. Նկարում պատկերված պատկերի մակերեսը $\frac{9}{4}$ սմ² է։ Որքա՞ն է պատկերի պարագիծը։ Նկարում հատվածների երկարությունները արտահայտված են սանտիմետրերով։



8-րդ դասարան (երկրորդ փուլ)

- **1.** Լուծել հավասարումը. 5x-4(x-3(x-2))=2
- **2.** Պարզեցնել 0.5a(2.4b+1.6a)-1.5b(0.6b+0.8a)

արտահայտությունը և հաշվել նրա արժեքը, երբ $a=2\frac{1}{2}$ և $b=3\frac{1}{3}$

3 .Բազմանդամը ներկայացնել արտադրյալի տեսքով.

$$c^2 + 2cd + c - 3d^2 + 3d$$

- **4.** Միաժամանակ վառեցին նույն երկարությամբ երկու մոմ։ Մոմերից մեկը հաստ է և վառվում է 4 ժամում, իսկ մյուսը բարակ է և վառվում է 2 ժամում։ Որոշ ժամանակ անց երկու մոմերն էլ հանգցրին։ Պարզվեց, որ հաստ մոմի մնացորդը 3 անգամ երկար է բարակ մոմի մնացորդից։ Քանի՞ րոպե էին վառվել մոմերը։
- 5. ABC եռանկյունում տարված է AH բարձրությունը, ընդ որում AH=HC=AB/2։ Գտնել եռանկյան անկյունները, եթե հայտնի է, որ H կետր գտնվում է BC կողմի վրա։
- 6. Եթե համաժողովին ներկա գտնվող ունկնդիրների թիվը նվազեր 20%-ով անցյալ տարվա համեմատ, ապա նրանց թիվը այս տարի կլիներ 2112։ Եթե համաժողովին ներկա ունկնդիրների թիվը ավելանար 25%-ով, ապա որքանո՞վ ավելի մարդ կմասնակցեր համաժողովին անցյալ տարվա համեմատ։
- 7. Ժամը 2:20-ին ժամացույցի մեծ և փոքր սլաքները ի՞նչ աստիձանի անկյուն կկազմեն։
- 8. Սուրանկյուն եռանկյան և բութանկյուն եռանկյան 6 անկյուններից հայտնի են չորսի աստիձանային չափերը՝ 120°, 80°,

55°, 10°։ Գտնել սուրանկյուն եռանկյան փոքր անկյան աստիձանային չափը։

9-րդ դասարան (երկրորդ փուլ)

1.Հաշվել արտահայտության արժեքը.
$$\frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}+\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$$

- **2.** Պարզեցնել արտահայտությունը. $\frac{\frac{3}{2}a^2 2ab + \frac{2}{3}b^2}{\frac{1}{4}a^2 \frac{1}{9}b^2} + \frac{6b}{\frac{3}{4}a + \frac{1}{2}b}$
- **3**. Լուծել անհավասարումը. $\sqrt{3-x} \ge \sqrt{x-10}$
- **4.** a -ի ի՞նչ արժեքների դեպքում $\begin{cases} x^2 x \le 0 \\ 3x 5a > 1 \end{cases}$ համակարգը լուծում

ունի։

- 5. Հնարավո՞ր է արդյոք հինգ քաղաքներ իրար հետ ձանապարհներով միացնել այնպես, որ յուրաքանչյուր քաղաք միանա ընդամենը երեք քաղաքների հետ։
- 6. Ի՞նչ քանակությամբ 90%–ոց սպիրտի լուծույթ պետք է խաոնել 10%–ոց 5 լիտր սպիրտի լուծույթին, որ ստացված նոր լուծույթի տոկոսը բարձր լինի 40%–ից, բայց չգերազանցի 50%–ը։
- **7.** ABC եռանկյան A անկյունը 60° է, AB=8 սմ, AC=5սմ։ Գտնել եռանկյան BC կողմի երկարությունը։
- 8. ABC եռանկյան BC կողմը 34 սմ է։ Այդ կողմի միջնակետից AC ուղղին տարված MN ուղղահայացը AC կողմը տրոհում է երկու՝ AN=25 սմ և NC=15 սմ հատվածների։ Գտնել ABC եռանկյան մակերեսը։

10-րդ դասարան Մաթեմատիկա


1. Գտնել $2a^2-2ab+b^2-2a+2$ արտահայտության փոքրագույն արժեքը։ a-ի և b-ի ինչպիսի՞ արժեքների դեպքում այն կընդունի իր փոքրագույն արժեքը։

2.Ապացուցել, որ փոփոխականի բոլոր թույլատրելի արժեքների դեպքում արտահայտության արժեքը կախված չէ իր մեջ մտնող փոփոխականների

$$\text{ upshplitphg.} \quad \left(\frac{2ab}{a^2-b^2}+\frac{a-b}{2a+2b}\right) \cdot \frac{2a}{a+b}+\frac{b}{b-a} \ :$$

- 3. Գանել $\sqrt{3x_1+1}+\sqrt{3x_2+1}$ արտահայտության արժեքը, որտեղ x_1 -ը և x_2 -ը $x^2-5x+1=0$ հավասարման արմատներն են։
- 4. Lniðti $\sqrt{x^2 4x} + \sqrt{x x^2} \sqrt{x} = 0$ hավասարումը։

- 6. Լուծեք 1+4+7+...+x=117 հավասարումը՝ ձախ մասը դիտարկելով, որպես թվաբանական պրոգրեսիայի անդամների գումար։
- 7. Երեք թվեր կազմում են երկրաչափական պրոգրեսիա։ Եթե միջին անդամը կրկնապատկենք, իսկ մյուսները թողնենք անփոփոխ, ապա կստանանք թվաբանական պրոգրեսիա։ Գտեք երկրաչափական պրոգրեսիայի հայտարարը։
- 8-9. A վայրից դուրս եկած ավտոմեքենան B վայր է հասնում 2 ժամում, իսկ B-ից դուրս եկածը A է հասնում 3 ժամում։
- 8. B-ից դուրս եկած ավտոմեքենան քանի՞ տոկոսով պետք է ավելացնի արագությունը, որպեսզի միաժամանակ իրար հանդեպ շարժվելիս հանդիպումը տեղի ունենա A և B վայրերի միջնակետում։
- 9. Միաժամանակ իրար հանդեպ շարժվելիս քանի $^{\circ}$ րոպեից նրանք կհանդիպեն։
- 10. Երկու ավտոմեքենա միաժամանակ դուրս եկան A վայրից և մեկնեցին 540կմ հեռավորության վրա գտնվող B վայրը։ Առաջին ավտոմեքենան, ունենալով երկրորդից 10կմ/ժ ավելի մեծ արագություն B վայր հասավ նրանից 45ր շուտ։ Գտեք յուրաքանչյուր ավտոմեքենայի արագությունը։
- 11. 21 մարդ միասին հավաքել են 200 սունկ։ Ապացուցել, որ գոյություն ունեն գոնե 2 մարդ, որոնք հավաքել են հավասար թվով սնկեր։
- 12. Առաջին 100 բնական թվերից քանիսն են առանց մնացորդի բաժանվում կամ 2-ի, կամ 3-ի կամ 5-ի։



- 13. Գտնել AC անկյունագծի երկարությունը։
- **14.** Գտնել *ABC* եռանկյանը և *ABCD* սեղանին արտագծած շրջանագծերի շառավիղների հարաբերությունը։
- 15. Գանել սեղանի անկյունագծերով կազմված սուր անկյան աստիճանային չափը։
- 16. Գտնել սեղանի մակերեսը։
- 17-20. ABCD շեղանկյան մեջ $\angle A = 60^{\circ}$: AB և BC կողմերի վրա համապատասխանաբար վերցված են M և N կետերն այնպես, որ AM=BN:
- 17. Ապացուցել, որ DMN եռանկյունը հավասարակողմ է։
- **18**. Գտնել ADM և BMN եռանկյուններին արտագծած շրջանագծերի շառավիղների հարաբերությունը։
- 19 .Գտեք BMD և BND անկյունների գումարը։
- **20**. Համեմատել BNM և BDM անկյունները։

Ֆիզիկա

Թեստային առաջադրանքներ

- 1.Մարմնի վրա ազդող քարշի և շփման ուժերն ազդում են նույն ուղղով և ուղղված են հակառակ ուղղություններով։ Ի՞նչ կարելի է ասել այդ ուժերի համագորի մասին, եթե մարմինը շարժվում է հավասարաչափ։ /1/
- 1) Համազորն ուղղված է շարժման ուղղությամբ։
- 2) Համագորն ուղղված է շարժման հակառակ ուղղությամբ։
- 3)Համազորը հավասար է զրոյի։
- 4) Համագորը շարժման ուղղության հետ կազմում է ուղիղ անկյուն։
- 2. Ինչի՞ է հավասար F ուժը, եթե նկարում պատկերված Ճախարակի կշիռը 2Ն է։ Շփման ուժն անտեսեք։ /1/




2) 11Ն

3) 20Ն


4) 22Ն



- 3. Նկարում պատկերված երկու խորանարդը հորիզոնական հարթ մակերևույթով շարժվում են միմյանց ընդառաջ։ Ի՞նչ տեղի կունենա խորանարդների հետ, եթե հարվածից հետո դրանք կպել են իրար։ /1/
- 1) կշարժվեն դեպի ձախ,
- 2) կշարժվեն դեպի աջ,
- 3) կկանգնեն,




- 4) սկզբում կշարժվեն դեպի ձախ, հետո՝ դեպի աջ։
- **4.** Ինչի՞ է հավասար տատանողական շարժում կատարող մարմնի՝ մեկ պարբերության ընթացքում անցած ձանապարհի և տատանումների լայնույթի հարաբերությունը։ /1/
- 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4
- 5.Նկարում պատկերված է սառնարանում ափսեով դրված ջրի ջերմաստիձանի՝ ժամանակից կախվածության գրաֆիկը։ Գրաֆիկի ո՞ր տեղամասն է համապատասխանում այն վիձակին, երբ ափսեում գտնվում են և՛ սառույց, և՛ ջուր։ /1/




1) միայն AB 2) միայն BC 3) միայն CE 4) BC և CE

Հարցեր

6. A պինդ մարմինն ունի նույն ձևն ու չափերը, ինչ B անոթի հեղուկը։ Նու յնն են արդյոք հեղուկի ձնշման ուժը անոթի հատակին և պինդ մարմնի ձնշման ուժը հորիզոնական մակերևույթին, եթե հեղուկի և պինդ մարմնի զանգվածները նույնն են։ Պատասխանը հիմնավորեք։/1/





- 8. Ինչպե՞ս կարող ենք համոզվել, որ պինդ միջավայրում ձայնն ավելի արագ է տարածվում, քան օդում։/1/
- 9. Պղնձե հաղորդալարի երկու կտոր ունեն նույն զանգվածը։ Մի կտորը 5 անգամ երկար է մյուսից։ Ո՞ր կտորն ունի ավելի մեծ դիմադրություն և քանի՞ անգամ։/1/
- 10. Տ լույսի աղբյուրի և նրա Տ՛ պատկերի դիրքը ոսպնյակի OO գլխավոր օպտիկական առանցքի նկատմամբ ցույց է տրված նկարում։ Ինչպիսի՞ն է ոսպնյակը։ Կառուցումով ցույց տվեք ոսպնյակի տեղը և նրա կիզակետերի դիրքը։ /1/

Խնդիրներ

11. Երբ շունն անցել էր կամրջի երկարության 3/8 մասը, լսեց հետևից եկող մեքենայի ազդանշանը։ Եթե շունը վազի հետ, ապա կհանդիպի 134

մեքենային կամրջի սկզբում, իսկ եթե վազի առաջ, ավտոմեքենան կհասնի շանը կամրջի վերջում։ Քանի՞ անգամ է ավտոմեքենայի արագությունը մեծ շան արագությունից։ /2/


- **12.** Մարմինը նետված է ուղղաձիգ դեպի վեր **50մ/վ** արագությամբ։ Ի՞նչ բարձրության վրա այդ մարմնի կինետիկ և պոտենցիալ էներգիաները կդառնան իրար հավասար։ Օդի դիմադրությունն անտեսեք։ /2/
- **13. 400կգ 30°C** ջերմաստիձանի ջուր պարունակող տաշտակի մեջ 60°C ջերմաստիձանի ջուր է լցվում։ Որքա՞ն ժամանակ պետք է բաց թողնել ծորակը, որպեսզի խառնուրդի ջերմաստիձանը դառնա 35°C, եթե յուրաքանչյուր 60 վ-ում լցվում է 10կգ տաք ջուր։ /2/
- **14.** Որոշեք նկ.1-ում պատկերված շղթայի լրիվ դիմադրությունը և չորրորդ լամպի սպառած հզորությունը։ **R**₁=**4 O**մ, **R**₂=**25 O**մ, **R**₃ **O**մ, **I**=**2**Ŭ:/2/
- **15.** Սառնարանը **20ր**-ի ընթացքում **1,5կգ** ջուրը **16 °C**-ից սառեցնում է մինչև **4 °C**։ Սառնարանում որքա՞ն սառույց կառաջանա հաջորդ **մեկ ժամվա** ընթացքում։ Ջրի տեսակարար ջերմունակությունը 4200 Ջ/կգ. °C է, սառույցի հալման տեսակարար ջերմությունը՝ 340000 Ջ/կգ։ Միավոր ժամանակում սառնարանին տրված ջերմաքանակը հաստատուն է։ /2/


2015 թ. 7-րդ դասարան (առաջին փուլ)

1.	Գտնել <u>333</u> · 4 դ	արտադրյա	լի թվանշանն	երի գումարը։	
	1) 6044	2) 6048	3) 6045	4) 6046	
2.	Ռետինը տետրից	էժան է 50	%-ով, իսկ մա	տիտը տետրից է	ժան

- 2. Ուետինը տետրից Էժան է 50 %-ով, իսկ մատիտը տետրից Էժան է 40 %-ով։ Քանի՞ տոկոսով է մատիտը թանկ ռետինից։

 1) 50 2) 20 3) 100 4) 25
- 3. a և b թվերի միջին թվաբանականը հավասար է 17-ի, իսկ a,b և c թվերի միջին թվաբանականը հավասար է 15-ի։ Ինչի՞ է հավասար c-ն։
 - 1) 14 2) 13 3) 12 4) 11





7. Քանի $^{\circ}$ n բնական թիվ կա, որ 2015-ը n-ի բաժանելիս մնացորդը կլինի 25։

1) 6 2) 8 3) 4 4) 3

8. Չորս պատձենահանող մեքենաները միասին 3 րոպեում պատձենահանում են 240 էջ։ Քանի՞ րոպեում հինգ այդպիսի մեքենաները միասին կպատձենահանեն 500 էջը։

1) 5 2) 20 3) 60 4) 12


9. 75 դմ² –ն 0,01ար-ի որ՞ մասն է։

1) 0,075 2) 0,75 3) 0,025 4) 0,25

10. Հեծանվորդը մեկ վայրկյանում անցնում է 5 մ։ Հեծանվի յուրաքանչյուր անվի շրջանագծի երկարությունը 125 սմ է։ Քանի՞ պտույտ է կատարում յուրաքանչյուր անիվը 7 վայրկյանում։

1) 33 2) 28 3) 31 4) 30

11. Երկու ծորակների համատեղ աշխատելու դեպքում դատարկ ավազանը լցվում է 4 ժամում։ Եթե 2 ժամ աշխատի միայն առաջին ծորակը և ևս 3 ժամ երկրորդը, ապա կլցվի դատարկ ավազանի



60%-ը ։ Քանի՞ ժամում դատարկ ավազնը կլցնի միայն երկրորդ

ծորակը։


վճարումների, լրացուցիչ քանի՞ կարկանդակ կստանար Անահիտը։

20. Եռանիշ թվի թվանշանների արտադրյալը 135 է։ Գտնել այդ թվի թվանշանների գումարը։


8-րդ դասարան (առաջին փուլ)

1. *ABCD* քառակուսու *AD* կողմի վրա կառուցված է *ADE* հավասարակողմ եռանկյունը։ Գտնել *BEA* անկյան մեծությունը։






- 2. Նկարում ուղղանկյունը ներգծված է 4 սմ կողմով քառակուսուն։ Որքա՞ն է ներգծված ուղղանկյան մակերեսը։
- 1) 13 2) 10 3) 6 4) 12



- 3. Եթե 1111:101 = A, ապա
- 3333:101+6666:303-ը հավասար է.
 - 1) 2*A*
- 2) 3*A*
- 3) 9*A*
- 4) 5*A*
- 4. Քանի հնգանիշ թիվ կարելի է կազմել 2, 3, 4, 5, 6 թվանշաններով, որոնք սկսվում և վերջանում են զույգ թվանշանով, եթե յուրաքանչյուր թվի մեջ այդ թվանշանները պետք է օգտագործել միայն մեկ անգամ։
 - 1) 52
- 2) 36
- 3) 6
- 4) 18

5. Ինչի՞ է հավասար նկարում նշված վեց անկյունների գումարը։




- 1) 1800
- $2)\ 360^{\circ}$
- $3)\ 320^{\circ}$
- 4) 2700

6. Ներմուծենք երկու գործողություն՝

$$x * y = x + y$$



Ինչի՞ է հավասար



-ր։

- 1) 169
- 2) 625
- 3) 100
- 4) 121

7. Դիցուք a -ն և b -ն զրոյից տարբեր կամայական թվանշաններ են։ Հետևյալ թվերից ո՞րն է անպայման բաժանվում 7-ի։

- 1) aabbab
- 2) ababab
- 3) babbaa
- 4) abbaab

8. Հարթության վրա տարված են չորս ուղիղներ։ Դիցուք n-ը դրանց հատման կետերի քանակն է։ Ինչի՞ չի կարող հավասար լինել n-ր։

- 2) 2 3) 3 4) 5

9. Ω րն է $a = (999222)^2$ և $b = 999221 \cdot 999223$ թվերի միջև կապը։

- 1) $a^2 = b^2 + 1$
- 2) b = a 1 3) a = b 1 4) a = 2b

10. Եթե $\frac{a}{b} = \frac{1}{3}$, ապա $\frac{a^2 + 2ab}{b^2 + 2ab}$ -ն հավասար է.


- 1) $\frac{7}{15}$ 2) $\frac{15}{7}$ 3) $\frac{7}{8}$ 4) $\frac{1}{3}$

- 11. $2 \cdot 2^{2014} + 3 \cdot 2^{2015}$ թիվը հավասար է. 1) 2^{2016} 2) 2^{2017} 3) :
- 3) $3 \cdot 2^{2015}$ 4) 2^{2016}
- 12. Ինչի՞ է հավասար x + y -ը, եթե $x^2 6x = 2xy x^2 y^2 9$:
 - 1) 0
- 2) 3

- 13. Գտնել այն երկնիշ թվերի քանակը, որոնք 4 %-ով մեծացնելիս ստացվում է երկնիշ թիվ։
 - 1) 95
- 3) 96
- 4) 3
- 14. Նկարում x = 40, y = 30:

Ալդ դեպքում z -ր հավասար է.

- 1) 90
- 2) 110
- 3) 70
- 4) 120



- 15. Քանի՞ եռանիշ թիվ կա որոնք 12-ի բաժանելիս մնացորդում ստացվում է 11, իսկ 18-ի բաժանելիս մնացորդում ստացվոմ է 1։
 - 1) 12
- 2) 6
- 3) 36
- 16. Մի սենյակում նստած 9-ը մարդկանց միջին տարիքը հավասար է 25-ի, իսկ մլուս սենյակում նստած 11 մարդկանց միջին տարիքը հավասար է 45։ Որքա՞ն է այդ 20 մարդկանց միջին տարիքը։
- 17.2աշվել 99...9:99...9+33...3·11 թվի թվանշանների գումարը։
- Քանի՞ երկնիշ թիվ կա, որոնց թվանշանների 18. տեղափոխությունից թիվը կմեծանա ոչ պակաս քան 3 անգամ։
- 19. Ինչի՞ է հավասար $a^2b-ab+a^2c-ac$ -ն,

$$bpb \ a = -3\frac{1}{3}, b+c=3,6:$$

20. Հայտնի է, որ $x + \frac{1}{r} = 3$ ։ Գտնել $\frac{1}{r^2} + 3x$ արտահայտության արժեքը։

7-րդ դասարան (երկրորդ փուլ)

Հաշվել արտահայտության արժեքը.

$$\left(5,6:0,42-17,5:2\frac{11}{12}\right)\cdot 10,5:$$

- 2. Խանութը ապրանքը ձեռք էր բերել 500 դրամով։ Ապրանքը վաճառեցին նախատեսված գնից 10%-ով ցածր գնով և ստացան 8% շահույթ։ Սկզբում քանի՞ տոկոս շահույթ էր նախատեսվում ստանալ։
- 3. Գրատախտակին գրված են հետևյալ վեց թվերը` 1;-1;-1;1;1;1 ։ Յուրաքանչյուր քայլին թույլատրվում է փոխել թվերից ձիշտ երկուսի նշանները։ Հնարավո՞ր է արդյոք որևէ քայլից հետո գրատախտակին գրված լինեն 1;-1;1;-1;1;-1 թվերը։
- 4. 2015-ը բաժանել են 1-ից մինջև 700-ը բոլոր թվերի վրա։ Ո՞րն է ամենամեծ մնացորդը։
- 5. Հնարավո՞ր է 1;2;3;...;100 թվերից ընտրել 71 հատն այնպես, որ դրանց գումարը հավասար լինի մնացած 29 թվերի գումարին։
- 6. Քանի[°] հնգանիշ թիվ կա, որի մի թվանշանը ջնջելուց հետո արդյունքում ստացվի 5463։
- 7. Վարդանը, Անդրանիկը և Բագրատը կատարում են մի որոշ աշխատանք։ Անդրանիկը և Բագրատը միասին այդ աշխատանքը կարող են կատարել 12 ժամում, Անդրանիկը և Վարդանը՝ 15 ժամում, իսկ Բագրատը և Վարդանը 20 ժամում։ Քանի՞ ժամում այդ նույն աշխատանքը մենակ կարող է կատարել Բագրատը։
- 8. Եղբայրը կերավ ափսեում եղած ծիրանների $\frac{3}{11}$ մասը և ևս 3 ծիրան։ Այնուհետև քույրը կերավ ափսեում մնացած ծիրանների $\frac{2}{7}$ մասը և ևս 4 ծիրան, որից հետո ափսեում մնաց 11 ծիրան։ Մկզբում քանի՞ ծիրան կար ափսեում։

8-րդ դասարան (երկրորդ փուլ)

1.Հաշվել արտահայտության արժեքը.
$$\frac{2\frac{3}{8} : \frac{3}{4} - 24 \cdot \frac{7}{9}}{7\frac{2}{3} + 2 : 24}:$$

- 2.Վինի Թուխը 3 պաղպաղակը և 1 գաթան ուտում է 25 րոպեում, իսկ Կարլսոնը` 55 րոպեում։ Մեկ պաղպաղակը և 3 գաթան Վինի Թուխը ուտում է 35 րոպեում, իսկ Կարլսոնը` 1 ժամ 25 րոպեում։ Նրանք միասին քանի՞ րոպեում կուտեն 6 պաղպաղակը։
- 3. 1;2;3;4;5 թվանշաններից կազմում են տասանիշ թվեր՝ յուրաքանչյուր թվանշանը օգտագործելով ձիշտ երկու անգամ։ Կարո՞ղ է այդ թվերից որևէ մեկը լինի բնական թվի քառակուսի։
- 4. Բազմանդամը վերլուծել արտադրիչների. $x^3 + 3x^2 + 3x 26$:
- 5. Գտնել (a+b)(b-c)(c-a)+abc+8 արտահայտության արժեքը, եթե a+b=c:
- 6. Դպրոցի շրջանավարտների 40%-ը գերազանցիկ են, ընդ որում տղաների 25%-ն է գերազանցիկ, իսկ աղջիկների` 50%-ը։
- ա)Աղջիկների քանակը տղաների քանակից քանի^{*} տոկոսով է ավելի։
- բ) Ամենաքիչը քանի՞ շրջանավարտ կարող է ունենալ այդպիսի դպրոցը։
- 7. BM -ը ABC եռանկյան միջնագիծն է։ Հայտնի է, որ $\angle ABM = 40^{\circ}$, $\angle MBC = 70^{\circ}$ ։ AB հատվածի երկարությունը քանի՞ անգամ է մեծ BM հատվածի երկարությունից։
- 8. ABC եռանկյան A անկյան կիսորդը, B գագաթից տարված միջնագիծը և C գագաթից տարված CH բարձրությունը հատվում են մի կետում, ընդ որում $AC = 2 \cdot AH$ ։ Գտնել եռանկյան անկյունները։

10-րդ դասարան Մաթեմատիկա

- 1. Տրված է, որ $2^{3^a} = 8^{3^b}$ ։ Գտնել a և b թվերի տարբերությունը։ /2,5 միավոր/
- 2. Լուծել անհավասարումը. $\frac{(5-x)(x+6)}{x-11} \ge 0$: /2,5 միավոր/

3. Լուծել համախումբը.
$$\begin{bmatrix} \sqrt{3-2x} < 5 \\ |4x+19| > 25 \end{bmatrix}$$
 : /2,5 միավոր/

4. Հայտնի է, որ
$$\frac{x_1-1}{x_2} + \frac{x_2-1}{x_1} = 2$$
, որտեղ x_1 -ը և x_2 -ը

 $2x^2 + (6-2a)x + 3 = 0$ հավասարման արմատներն են։

Գտնել *a* -ն։ /**2,5 միավոր**/

5.Երեք թվեր, որոնց գումարը հավասար է 105-ի կազմում են երկրաչափական պրոգրեսիա։ Եթե առաջին թիվը մեծանենք 1-ով, իսկ երրորդը փոքրացնենք 46-ով կստանանք թվաբանական պրոգրեսիա կազմող երեք թվեր։ Գտնել այդ թվերը։ /2,5 միավոր/

6. Պարզեցնել արտահայտությունը.

$$\left(\frac{5a}{a-9} + \frac{42a}{a^2-18a+81}\right) \cdot \frac{a^2-81}{5a-3} - \frac{9(a+9)}{a-9} :$$
/2,5 \(\text{1}\) \(\text{hwlnp/}

- 7. Երկու քաղաքներից միաժամանակ իրար ընդառաջ շարժվեցին երկու մեքենա։ Առաջին մեքենան այդ քաղաքների միջև եղած Ճանապարհն անցնում է 1 ժամ 30 րոպեում, իսկ երկրորդը՝ 1 ժամում։
- 1) Այդ Ճանապարհի քանի՞ տոկոսը կանցնի երկրորդ մեքենան 15 րոպեում։ **/0,5 միավոր**/
- 2) Քանի[°] րոպեում երկրորդ մեքենան կանցնի առաջին մեքենայի մեկ ժամում անցած ձանապարհը։ /**1 միավոր**/
- 3) Շարժումը սկսելուց քանի՞ րոպե հետո այդ մեքենաները կհանդիպեն։ /**1 միավոր**/
- 8. ABC եռանկյան մեջ AC = 8, BC = 6, AB = 10: Գտեք.
- 1) C անկյան աստիձանային չափը։ /0,5 միավոր/
- 2) Գտնել մեծ կողմին տարված բարձրության երկարությունը։ /0,5 միավոր/
- 3) Գտնել ABC եռանկյանը ներգծած շրջանագծի շառավիղը։ /0,5 միավոր/
- 4) Գտնել ABC եռանկյան մեծ անկյան կիսորդի երկարությունը։ /1 միավոր/

Ֆիզիկա

Թեստային առաջադրանքներ

1. R դիմադրությամբ երկու միատեսակ հաղորդիչ նախ միացվում են հաջորդաբար, ապա՝ զուգահեռ։ Ո՞րն է առաջին և երկրորդ դեպքերում ընդհանուր դիմադրությունների հարաբերությունը։ /1 միավոր/

m/2 p/1/4 q/4 q/8

2. Մարմինը յուրաքանչյուր վայրկյանում ուղղագիծ հետագծով անցնում է 5մ ձանապարհ։ Ինչպիսի՞ շարժում է կատարում մարմինը։ /1 միավոր/

ա/ Ուղղագիծ հավասարաչափ

բ/ Ուղղագիծ հավասարաչափ արագացող

գ/ Ուղղագիծ հավասարաչափ դանդաղող

դ/ Հարցին հնարավոր չէ միանշանակ պատասխանել

3. Ջրածնով լցված փուչիկը հավասարաչափ բարձրանում է վեր։ Ինչպե՞ս է ուղղված փուչիկի վրա ազդող ուժերի համազորը։ /1 միավոր/

ա/ Ուղղված է դեպի վեր

բ/ Ուղղված է դեպի ներքև

գ/ Համագոր ուժը զրո է

դ/ Ջրածնով լցված փուչիկը չի կարող վեր բարձրանալ

4. m զանգվածով և V արագությամբ շարժվող սայլակը հարվածում է նույն զանգվածով անշարժ սայլակին և կպչում դրան։ Որքա՞ն է սայլակների իմպուլսը հարվածից հետո։ /1 միավոր/

u/ 0 p/ mV q/ mV/2 η / 2mV

5. Զսպանակին ամրացված մարմինը տատանումներ է կատարում հորիզոնական հարթ սեղանի վրա։ Ինչքա՞ն ձանապարհ կանցնի մարմինը 2,5 պարբերության ընթացքում, եթե տատանումների լայնույթը A է, իսկ ժամանակի սկզբնական պահին մարմնի շեղումը հավասարակշռության դիրքից առավելագույնն է։ /1 միավոր /

uu/5A p/2A q/10A n/0

6. Ո՞րն է Ճիշտ շարունակությունը. /1 միավոր/ Հալման ընթացքում բյուրեղային մարմնի ... ա/ և՛ ներքին էներգիան, և՛ ջերմաստիճանն աճում են


բ/ և՛ ներքին էներգիան, և՛ ջերմաստիձանը մնում են անփոփոխ գ/ ջերմաստիձանն աձում է, իսկ ներքին էներգիան մնում է անփոփոխ

դ/ ներքին էներգիան մեծանում է, իսկ ջերմաստիձանը մնում է անփոփոխ

7. R, 2R, 3R, 4R դիմադրություններով հաղորդիչները միացված են հաջորդաբար և միացված են հաստատուն լարման ցանցին։ Ո՞ր դիմադրության վրա միննույն ժամանակում կանջատվի ամենափոքր ջերմաքանակը։ /1 միավոր/

w/R p/2R q/3R n/4R


8. Ո՞ր նկարում է ձիշտ պատկերված հոսանքակիր կոձի մոտ գտնվող մագնիսական սլաքների դիրքերը (մուգ գույնով պատկերված է մագնիսական սլաքի հյուսիսային բևեռը)։ /1 միավոր/



Հարցեր

- 1. Տարբեր զանգվածներով երկու ընկնող մարմիններից որի՞ արագացումն է մեծ։ Օդի դիմադրությունը **հաշվի առնել և համարել, որ այն երկու մարմինների համար նույնն է**։ Պատասխանը հիմնավորեք։ /1 միավոր/
- 2. Ինչպե՞ս կփոխվի հաստատուն լարման ցանցին միացված հաղորդալարով անցնող հոսանքի ուժը, եթե լարը ձգելով երկարացնենք։ Պատասխանը հիմնավորեք։ /1 միավոր/

- 3. Ինչպե՞ս կփոխվի մաթեմատիկական ձոձանակի տատանումների հաձախությունը, երբ այն Երկրից տեղափոխենք Լուսին։ Պատասխանը հիմնավորեք։ /1 միավոր/
- 4. Կառուցումով որոշեք ոսպնյակի կիզակետերը, եթե A-ն լուսատու կետն է, A₁-ը՝ դրա պատկերը, MN-ը ոսպնյակի գլխավոր ոպտիկական առանցքն է։ /1 միավոր/



Խնդիրներ

1. Մարմինն առանց սկզբնական արագության ազատ անկում է կատարում H=100մ բարձրությունից։ Ազատ անկման արագացումը՝ g=10մ/վ 2

ա/ Ի՞նչ արագություն կունենա մարմինը գետնին հասնելու պահին։ /1 միավոր/

ր/ Ի՞նչ կինետիկ էներգիա կունենա մարմինն անկումն սկսելուց 1 վ անց։ /1 միավոր/

2. Մեքենան շարժումն սկսելուց հետո 4 վայրկյանի ընթացքում կատարում է հավասարաչափ արագացող շարժում a=2մ/վ² արագացմամբ, ապա ևս 4 վայրկյանի ընթացքում կատարում է ուղղագիծ հավասարաչափ շարժում այն արագությամբ, որը ձեռք էր բերել արագացող շարժման վերջում։

ա/ Կառուցեք մարմնի արագության՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը շարժման 8վ-ի ընթացքում։ /1 միավոր/ բ/ Ինչքա՞ն Ճանապարհ է անցել մարմինը ամբողջ շարժման ընթացքում։ /1 միավոր/

- 3. Համասեռ մարմինը լողում է կերոսինում՝ ընկղմվելով իր ծավալի 0,75 մասով։ Կերոսինի խտությունը 800կգ/մ³է։
- ա/ Որքա՞ն է մարմնի վրա ազդող ծանրության և արքիմեդյան ուժերի հարաբերությունը։ /1 միավոր/

բ/ Որքա՞ն է մարմնի նյութի խտությունը։ /1 միավոր/

4. Էլեկտրական թեյնիկում եռացող ջուրը ամբողջովին գոլորշիացավ 30 ր-ի ընթացքում։ Որքա՞ն ժամանակում նույն 146

թեյնիկում այդ ջուրը տաքացավ 20 °C-ից մինչև եռալը (100 °C)։ Ջրի տեսակարար ջերմունակությունը՝ 4200Ջ/կգ.°C, շոգեգոյացման տեսակարար ջերմությունը՝ 2.3·10°Ջ/կգ։ Ջերմային կորուստները և մինչև եռալը ջրի գոլորշիացումն անտեսեք։ /2 միավոր/

1.Նշված թվ	երից ընտրեք ա		բաժանվում է	12-ի։
		q)11		դ) 8888
2. Գտեք (13	$(3-9,5:3\frac{4}{5})\cdot\frac{3}{7}$	սրտահայտու	թյան արժեքը	<u>ı</u> :
uı) 4,5	p) -24,5	q) $\frac{75}{38}$	<u>5</u>	$(\eta) - \frac{75}{38}$
3. Գտեք 201	6, 64, 9, 7 թվերի	ո ամենամեծ <u>ը</u>	ւնդհանուր բս	սժանարարը։
	p) 64		դ) այլ պ	ատասխան
4. 640 nu ² -	່ນ 10ປ²-ກເ ກ [°] ກ ທ _ີ	ոկոսն է։		
u) 36	բ) 50	q)32	դ) 64	
5. Արամի ունեցած գրքերի քանակը 150-ից շատ է և 200-ից քիչ։				
Հայտնի է, ո	ւր Արամի գրքե	րի քանակի 2	20%-ը մաթեմ	նատիկայի ե ն ,
hu h	իզիկայի։ Գտեք	Արամի գրքե	րի քանակը։	
ա) 175	p) 170	դ) 185 - ո	դ) այլ պատա	սխան
6. Հենվելու	լ ձախ ոտքի	վրա կենգույ	րուն թռչում	է Ճիշտ 2մ,
հենվելով ա	ջ ոտքի վրա` ձ	իշտ 4մ, իսկ <mark>հ</mark>	ւենվելով երկ <mark>ւ</mark>	ու ոտքի վրա`
	մենաքիչը քան			
	նցնի ուղիղ 1000	Ոմ։		
w) 144	р) 1 4 5	q)143	դ) այլ պւ	ատասխան

- 7. Բոլոր բնական թվերը ներկել են երեք գույնով։ 1-ը` կարմիր, 2-ը` կապույտ, 3-ը` կանաչ, 4-ը` կարմիր, 5-ը կապույտ, 6-ը կանաչ և այդպես շարունակ։ Ո՞ր գույնով է ներկված կարմիր և կապույտ թվերի գումարը։
- ա) միայն կապույտ բ) կարմիր կամ կանաչ
- գ) միայն կարմիր դ) այլ պատասխան

վերջին թվանշանի վրա։ Գտեք ստացված քանորդներից				
հնարավոր մեծագույնի արժեքը։				
ա) 41				
10. Նշված թվերից ո՞րը կարող է լինել չորս հաջորդական բնական				
թվերի արտադրյալի վերջին երեք թվանշանները։				
ш) 116				
11. 2016, 2017,, 2100 թվերից գտեք այն թվերի քանակը, որոնց				
վերջին թվանշանը հավասար է մյուս երեք թվանշանների				
գումարին։				
ա) 12				
12. Գտեք 25-ի բաժանվող այն քառանիշ թվերի քանակը, որի				
վերջին թվանշանը հավասար է մյուս երեք թվանշանների				
գումարին։				
u) 5 p) 12 q) 3 n) 4				
13. A և B գյուղերից միաժամանակ միմյանց հանդեպ դուրս եկան				
երկու հեծանվորդ և հանդիպեցին 36 րոպե անց։ Առանց կանգ				
առելու առաջին հեծանվորդը հասավ B և ամիջապես հետ				
վերադարձավ, իսկ երկրորդ հեծանվորդը մի փոքր ուշ հասավ A և				
ամիջապես հետ վերադարձավ։ Հանդիպումից հետո քանի րոպե				
անց հեծանվորդները կհանդիպեն երկրորդ անգամ։				
14. Գտնել 756-ի բոլոր պարզ բաժանարարների քանակը։				
15. Գտեք այն երկնիշ թվերի քանակը, որոնց թվանշանների				
գումարը կենտ է։				
16. Բնական թիվը կանվանենք հետաքրքիր, եթե այն մեծ է իր				
վերջին թվանշանից 6 անգամ։ Գտեք հետաքրքիր թվերի քանակը։				
17. Քանի գրոյով է վերջանում 2016-ից 2027 բնական թվերի				
արտադրյալը։				
18. Գտեք այն հնգանիշ թվերի քանակը, որոնք ձախից աջ և աջից ձախ կարդացվում են նույն ձևով (օրինակ՝ 54345, 17071)։				
148				

8. Նարինջներով լի արկղը կշռում է 35 կգ։ Երբ վաձառեցին նարինջների կեսը, արկղի կշիռը դարձավ 21 կգ։ Ինչքա՞ն է կշռում

դ) այլ պատասխան

q) 5

9. 10-ի չբաժանվող երկնիշ թիվը բաժանել են այդ երկնիշ թվի

դատարկ արկղը։

բ) 14

u) 7

- 19. Գտեք 237*4* տեսքի վեցանիշ թվերի քանակը, որոնք բաժանվում են 18-ի։
- 20. Շրջանագծի՝ վրա վերցրել են 7 կետ, որոնցից երկուսը ներկել են կարմիր գույնով, երկուսը՝ կապույտ գույնով, իսկ երեքը՝ կանաչ գույնով։ Գտեք այն հատվածների քանակը, որոնց ծայրակետերը ներկված են տարբեր գույներով։

8-րդ դասարան /առաջին փուլ/

1. Գտնել 7 համարիչով ամենափոքր անկանոն կոտորակի և 6
հայտարարով ամենամեծ կանոնավոր կոտորակի
տարբերությունը։

, 1	\ 1	, 1	, 29
$u) \frac{1}{3}$	p) 1	q) $\frac{1}{6}$	η) $-\frac{29}{35}$

2. Գտնել եռանիշ թվերի քանակը, որոնց թվանշանների արտադրյալը 270 է։

ա) 6 բ)1 գ) 8 դ) 3
3. Երկու ժամ առաջին ծորակը և երեք ժամ երկրորդ ծորակը աշխատելու դեպքում դատարկ ավազանը լցվում է։ Եթե երեք ժամ առաջին ծորակը աշխատի, իսկ երկրորդը՝ երկու ժամ, ապա կլցվի դատարկ ավազանի 80 %։ Միայն առաջին ծորակը որքա՞ն

ժամանակում կլցնի դատարկ ավազանը։

ա) 12 ժամ 30 րոպե բ) 15ժամ գ) 8 ժամ դ) 10 ժամ 50 րոպե 4. Շրջանագծի վրա վերցրել են 7 կետ, որոնցից երկուսը ներկել են կարմիր գույնով, երկուսը՝ կապույտ գույնով, իսկ երեքը՝ կանաչ գույնով։ Գտեք այն եռանկյունների քանակը, որոնց գագաթները ներկված են տարբեր գույներով։

u) 9 p) 6 q)3 n) 12

5. Գտեք 25-ի բաժանվող այն քառանիշ թվերի քանակը, որի առաջին թվանշանը հավասար է մյուս երեք թվանշանների գումարին։

m)14 p) 12 q) 17 n) 9

6. Գտնել այն եռանիշ թվերի քանակը, որոնց գրառմանը մասնակցում է գոնե մեկ 8 թվանշան։

u) 81 p) 100 q) 260 n) 252

7. Քանի [°] զրոյով է վերջանում 1-ից մեծ և 244-ից փոքր 9-ի վրա բաժանվող բնական թվերի արտադրյալը։			
m) 6 p) 3 q) 4 η) 5			
, 1, 1,			
8. Հավասար հզորությամբ 5 տրակտոր, յուրաքանչյուրը 1 օրում			
վարելով 0,4 հա, դաշտը կարող են վարել 30 օրում։ Նույն			
հզորությամբ քանի տրակտոր պետք է ավելացնել, որպեսզի			
համատեղ աշխատելով դաշտը վարեն 25 օրում։			
w)4 p)2 q)3 η) 1			
9. Գտնել $y=2x-4$ և $y=8$ ֆունկցիաների հատման կետով			
անցնող և $y=1-3x$ ուղղին զուգահեռ ուղղի բանաձևը։			
u) $y = 3x - 10$ p) $y = 26 - 3x$ q) $y = 8$ q) $y = 20 - 3x$			
10. Արդյո՞ք ցանկացած x և y թվերի համար ձիշտ է			
$2x^2 + 3y^2 - 4x - 12y + 14 > 0$ պայմանը:			
ա) այո բ)այո՝ բացառությամբ մի դեպքի			
գ) այո` բացառությամբ երկու դեպքի 🛮 դ) այլ պատասխան			
11. 2016 թիվը <i>ո</i> թվին բաժանելիս մնացորդը 26 է։ Գտնել այդ <i>ո</i>			
թվերից մեծի և փոքրի գումարը ։			
12. Դասարանում բացակա աշակերտների թիվը կազմում է			
ներկաների 20 %-ը։ Երբ երեք հոգի գնաց տուն, ապա հաջորդ			
դասաժամի բացակաների թիվը եղավ այդ պահին դասարանում			
գտնվող աշակերտների $\frac{1}{3}$ մասը։ Քանի $^\circ$ աշակերտ ունի			
դասարանը։			
13. Դասարանի 25 աշակերտներից 12-ը հաձախում է			
մաթեմատիկայի խմբակ, 9-ը տնտեսագիտական խմբակ, 8			

- աշակերտ ոչ մի խմբակ չեն հաձախում։ Տնտեսագետներից քանի սն են հրապուրվում մաթեմատիկայով։
- 14. 2016 բնական թվերի արտադրյալը հավասար է 2016։ Գտնել այդ թվերի գումարի հնարավոր փոքրագույն արժեքը։
- 15. 0,1,2,3,4,5 թվանշաններից կազմվում են բոլոր հնարավոր հնգանիշ թվերը (առանց թվանշանների կրկնության)։ Դրանցից քանի սն են 5-ի բազմապատիկ։
- 16. Վերլուծել արտադրիչների $9x^3 + 3x 3x^2 1$ ։

- 17. $* \in \{3;4;\Delta;9\}$ գրառման մեջ * և Δ նշանների փոխարեն թույլատրվում է գրել 4-ից փոքր ցանկացած թվանշան (օր.՝ $0 \in \{3;4;2;9\}$); $2 \in \{3;4;2;9\}$ և այլն)։ Բոլոր պնդումների ո՞ր մասն է կազմում ստույգ պնդումները։
- 18. Ի՞նչ սահմաններում (միջակայքում) կարող է փոփոխվել եռանկյան պարագիծը, եթե նրա երկու կողմերն ունեն 12սմ և 14սմ երկարություններ։
- 19. CM-ը ABC եռանկյան միջնագիծն է։ Հայտնի է, որ $\angle ACM=30^\circ$, իսկ $\angle BCM=60^\circ$ ։ Գտնել CM հատվածի երկարությունը, եթե AB+BC=15 սմ։
- 20. ABC եռանկյունում AB=BC, $\angle ABC = 120^\circ$: AD-ն ABC եռանկյան բարձրությունն է, իսկ DH-ը ADC եռանկյան բարձրությունը։ AB և DH ուղիղների հատման կետը K կետն է։ Գտնել KH-ը եթե BD=13սմ։

7-րդ դասարան /երկրորդ փուլ/

- $1. \, 2$ աշվեք $\left| 1,6:2,5-3\frac{1}{5}\cdot\frac{1}{3} \right| \cdot 4\frac{13}{16}$ արտահայտության արժեքը։
- 2. A,B,C թվերից մեկը դրական է, մեկը բացասական, մեկը 0։ Հայտնի, է որ $A=B\cdot (B-C)$ ։ A,B,C թվերից ո՞րն է դրական, ո՞րը բացասական, ո՞րը հավասար 0։ Պատասխանը հիմնավորել։
- 3. Երեք ծովահեն որոշեցին բաժանել մետաղադրամներով լի արկղը։ Առաջին ծովահենը վերցրեց մետաղադրամների երեք յոթերորդը, երկրորդը՝ մնացածի 51%-ը։ Պարզվեց, որ երրորդ ծովահենը ստացավ 8 մետաղադրամ պակաս, քան երկրորդը։ Քանի՞ մետաղադրամ կար արկղում։
- 4. Ավազանը ունի երեք ծորակ` 1-ինը և 2-րդը լցնող, իսկ 3-րդը դատարկող։ 1-ին և 3-րդ ծորակները միասին դատարկ ավազանը լցնում են 6 ժամում, իսկ 2-րդ և 3-րդ ծորակները միասին դատարկ ավազանը լցնում են 12 ժամում։ Քանի՞ ժամում կլցնեն դատարկ ավազանը երեք ծորակները միասին, եթե 3-րդ ծորակը աշխատի երկու անգամ ավելի մեծ արտադրողականությամբ։

- 5. Չորս սկյուռիկներ կերան 2016 կաղին, յուրաքանչյուրը ամենաքիչը 102 հատ։ Հայտնի է, որ առաջին սկուռիկը կերել է ամենաշատ կաղին, իսկ երկրորդը և երրորդը միասին կերել են 1275 կաղին։ Քանի՞ կաղին է կերել առաջին սկյուռիկը։
- 6. Գտեք 1, 2, 3, 4 թվանշաններով գրվող այն քառանիշ թվերի քանակը, որոնց թվանշանները տարբեր են և, որոնց գրառման մեջ 1-ը գտնվում է 2-ից աջ։
- 7. Շարքում կանգնած է 10 երեխա։ Երբ շարքում կանգնած յուրաքանչյուր երեխա իրենից աջ գտնվող բոլոր երեխաներին տվեց մեկական կոնֆետ, պարզվեց, որ բոլոր աղջիկների կոնֆետների քանակը ավելացավ 25-ով։ Գտեք շարքում կանգնած աղջիկների քանակը։ Պատասխանը հիմնավորել։
- 8. A բնական թվի իրարից տարբեր երեք փոքրագույն բաժանարարների գումարը հավասար է 8։ Քանի՞ զրոյով կարող է վերջանալ A թիվը։

8-րդ դասարան /երկրորդ փուլ/

- 1. k –ի ո՞ր արժեքների դեպքում y=kx+1 ֆունկցիայի գրաֆիկը անցնում է A(3;k-1) կետով։
- 2.Նավակը գետի հոսանքի ուղղությամբ 90 կմ ձանապարհն անցնում է 3 ժամում, իսկ հոսանքին հակառակ ուղությամբ 80 կմ ձանապարհը՝ 4 ժամում։ Եթե նավակը և լաստը միաժամանակ A վայրից շարժվեն հակառակ ուղղություներով, ապա քանի՞ ժամ հետո նրանց հեռավորությունը կլինի 60 կմ։
- 3. Վերլուծել արտադրիչների.

$$x^4 + 4x^2 - y^2 + 6y - 5$$

- 5. Գտեք այն քառանիշ թվերի քանակը, որոնք բաժանվում են 4-ի և որոնց թվանշանները դասավորված են աձման կարգով։
- 6. ABC եռանկյան AB կողմի վրա վերցրել են E և K կետեր այնպես, np AE=EC, BK=CK և $\angle ECK = 64^\circ$ (E կետը գտնվում է A և K կետերի միջև)։ Գտեք ACB անկյան մեծությունը։

- 7. ABC եռանկյան AK կիսորդը և BD միջնագիծը փոխուղղահայաց են։ Գտեք ABC եռանկյան կողմերի երկարությունները, եթե նրանք երեք հաջորդական բնական թվեր են։
- 8. 1, 2, 3, ..., 2016 թվերը բաժանել են երկու բազմություների, որոնց տարրերի քանակը հավասար են, և հաշվել են յուրաքանչյուր բազմությանը պատկանող թվերի արտադրյալների տարբերությունը։ Կարող է արդյո՞ք այդ տարբերությունը հավասար լինել 777-ի։

10-րդ դասարան Մաթեմատիկա

1. Պարզեցնել արտահայտությունը.

$$\left(\frac{5(m-2)}{m^3-8}-\frac{m+2}{m^2+2m+4}\right)\cdot\frac{2m^2+4m+8}{m-3}$$
:

- 2. Գտնել բոլոր այն եռանիշ թվերի միջին թվաբանականը, որոնք 4-ի բաժանելիս տալիս են 3 մնացորդ։
- 3. a -ի ի՞նչ արժեքների դեպքում $x^2+2x-|a-2|=0$ հավասարման արմատների տարբերությունը հավասար է 4-ի։
- 4. Լուծել համախումբը

$$\frac{x^2 - 4x + 4}{x^2 - 4} \ge 0$$

$$\sqrt{x + 2} < \sqrt{8 - x}$$
:

- 5. Երկու մեքենա A քաղաքից պետք է գնան B քաղաքը, որոնց հեռավորությունը 840 կմ է, ընդ որում՝ այդ հեռավորությունը մեքենաներից մեկը մյուսից 2 ժ-ով պակաս ժամանակում է անցնում։ Այն ժամանակահատվածում, երբ առաջին մեքենան անցնում է 63 կմ, երկրորդն անցնում է 54 կմ։ Գտնել առաջին մեքենաի արագությունը։
- 6. Գտնել 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 թվանշաններով գրվող այն հնգանիշ թվերի քանակը, որոնց թվանշանները տարբեր են և, որոնց գրառման մեջ 1, 2, 3 թվանշանները դասավորված են աՃման կարգով (օրինակ՝ 71243)։

- 7. O կենտրոնով շրջանագծի A կետից տարված են AC=15 և AB=9 երկարությամբ երկու լարեր։ BAC աղեղի աստիձանային չափը 120° է։ Գտնել BC լարի երկարությունը և շրջանագծի շառավիդը։
- 8. r=2 սմ շառավորվ շրջանագծին արտագծած է ուղղանկյուն սեղան, որի ամենափոքր կողմի երկարությունը 3 սմ է։ Գտնել սեղանի մակերեսը։

Ֆիզիկա

Թեստային առաջադրանքներ

- 1. Ծանր բեռը պարանով կախված է որոշակի արագությամբ դեպի վեր բարձրացող օդապարիկից։ Ինչպիսի՞ն կլինի բեռի շարժումը, եթե պարանը կտրվի. /1 միավոր/
- 1) կմնա դադարի վիձակում, 2) կընկնի ուղղաձիգ դեպի ներքև,
- 3) մի քիչ կբարձրանա, այնուհետև կընկնի ուղղաձիգ դեպի ներքև,
- 4)կընկնի կոր գծով ներքև։
- 2. Ծորակով իրար միացած Ա և Բ անոթներում լցված է ջուր։ Ծորակը փակ է։ Ի՞նչ կլինի, եթե ծորակը բացեն. /1 միավոր/
- 1) ջուրը Ա անոթից կլցվի Բ անոթի մեջ,
- 2) ջուրը Բ անոթից կլցվի Ա անոթի մեջ,
- 3) ջուրը կսկսի տատանվել. Բ անոթից կտեղափոխվի Ա անոթ, իսկ հետո՝ հակառակը,
- 4) ջուրը կմնա նույն դիրքում. չի տեղաշարժվի։
- 3.Հավասարակ*շ*ռության դիրքով անցնելու պահին ազատ տատանումներ կատարող 40գ զանգվածով գնդիկի կինետիկ էներգիան հավասար է 20Ջ։ Որքա՞ն է գնդիկի պոտենցիալ էներգիան 5վ անց, եթե տատանման պարբերությունը 20վ է։

/1 միավոր /

- 1) 0 Ω
- 2) 5 Ω
- 3) 10 Ω
- **4) 20 Ω**
- 4.Պնդումներից ո՞րն է վերաբերում եռման պրոցեսին։ /1 միավոր / Տեղի է ունենում.
- ա) ցանկացած ջերմաստիձանում,
- բ) որոշակի ջերմաստիձանում,
- գ) ջերմաքանակի անջատումով,
- դ) ջերմաքանակի կլանմամբ։

154

1) ա և բ


2) ա և դ

3) բ և դ


4) բ և գ

5.Նկարում պատկերված են հոսանքի ուժի՝ լարումից կախումն արտահայտող գրաֆիկները երկու տարբեր հաղորդիչների համար։ Հարաբերակցություններից ո՞րն է Ճիշտ այդ հաղորդիչների դիմադրությունների համար. /1 միավոր/

- $1)R_1:R_2=5:2$
- 2) R₁:R₂=2:5
- 3) $R_1:R_2=2:1$
- 4) R₁:R₂=1:2



6. Նկարում պատկերված փակ արկղում կա հարթ հայելի։ Հայելու դիրքերից ո՞րն է Ճիշտ լուսային ձառագայթները նշված ձևով անդրադարձնելու համար։ /1 միավոր/



1)w


2)բ

3)q

4)դ




7. Մագնիսական սլաքը տեղադրված է օղակի կենտրոնում (տե՛ս նկ.), որով հոսանքն անցնում է ABC ուղղությամբ։ Ո՞ր բևեռով կշրջվի մագնիսական սլաքը դեպի դիտորդը։ Պատասխանը հիմնավորեք։ /1 **միավոր**/



8. Երեք անոթներում լցված է նույն բարձրությամբ ջուր։ Դրանց մեջ գցում են միատեսակ փայտե գնդիկներ։ Նույնը կլինի՞ արդյոք Ճնշումն անոթների հատակին։ Պատասխանը հիմնավորեք։

/1 **միավոր**/



9. Ինչպե՞ս կփոխվի էլեկտրասալիկի հզորությունը, եթե դրա պարուլրը կիսենք և ստացված մասերը միացնենք զուգահեռ։

Պատասխանը հիմնավորեք։ /1 **միավոր**/

10. Ջրի երես դուրս եկող օդի Տ պղպջակի և դիտորդի աչքի դիրքն անոթի մեջ լցված ջրի մակերևույթի նկատմամբ ցույց է տրված նկարում։ Ընտրելով աչքին ընկնող երկու



ձառագայթ՝ գծեցեք դրանց մոտավոր ընթացքը և ցույց տվեք պղպջակի՝ աչքի համար տեսանելի կեղծ պատկերի դիրքը ջրում։ /1 միավոր/

Խնդիրներ

11. 200գ զանգվածով տափօղակը սառույցի վրայով անցնում է 5մ ձանապարհ մինչև կանգ առնելը, եթե նրան հաղորդում են 2մ/վ սկզբնական արագություն։


ա/Ինչքա՞ն է տափօղակի վրա ազդող *շ*փման ուժը։ /1 **միավոր**/ բ/Ինչքա՞ն ձանապարհ կանցնի տափօղակը, եթե դրան հաղորդեն 4մ/վ արագություն։ /1 **միավոր**/

12.Կալորաչափում կա tւ=15° C ջերմաստիձանի mւ=250գ ջուր։ Այդ ջրի մեջ լցրեցին թաց ձյուն, որի 35%-ը ջուր է։ Ձյան հայվելուց հետո կալորիմետրում հաստատվեց t2=10° C ջերմաստիձան։ Ջրի տեսակարար ջերմունակությունը 4200Ջ/կգ.°C է, սառույցի հայման տեսակարար ջերմությունը՝ 340000Ջ/կգ։ Կալորաչափի ջերմունակությունն անտեսեք։ ա/ Ինչքանո՞վ փոխվեց կայորաչափում եղած ջրի ներքին էներգիան։ /0.5 **միավոր**/

բ/ Որքա՞ն ձյուն լցրեցին կալորաչափի մեջ։ /1.5 միավոր/

13. Շղթայի ծայրերին կիրառված է 110Վ լարում, իսկ յուրաքանչյուր հաղորդչի դիմադրությունը 200 Օմ է։

ա/ Հաշվեք շղթայի ընդհանուր դիմադրությունը։ /1 միավոր/



բ/ Որոշեք հոսանքի ուժը 3-րդ հաղորդչում։ /1 **միավոր**/

14.Ալյումինե սնամեջ գունդը կշռելիս ուժաչափը ցույց է տալիս ջրում՝ P_1 =24Ն, իսկ բենզինի մեջ՝ P_2 =33Ն։ Ալյումինի խտությունը՝ 2700կգ/մ³, ջրի խտությունը՝ 1000կգ/մ³, բենզինի խտությունը՝ 700կզ/մ³։

ա/ Որոշեք գնդի ծավալը։ /1 **միավոր**/ p/ Որոշեք խոռոչի ծավալը։ /1 **միավոր**/

15.Երկու կայարանների միջև 17կմ հեռավորությունը գնացքն անցավ 60կմ/ժ միջին արագությամբ։ Հավասարաչափ արագացող թափավազքի և հավասարաչափ դանդաղող արգելակման (տարբեր արագացումներով) ընդհանուր ժամանակը ti=4ր է, իսկ մնացած ժամանակում գնացքը շարժվել է հավասարաչափ։ ա/ Որոշեք գնացքի հավասարաչափ շարժման ժամանակը և կառուցեք գնացքի արագության՝ ժամանակից կախվածության որակական գրաֆիկը։ /1 **միավոր**/

ր/ Որոշեք գնացքի հավասարաչափ շարժման արագությունը։ /1 **միավոր**/


2017 թ. 7-րդ դասարան (առաջին փուլ) 1. Գտնել $\begin{vmatrix} 2 & 3 & 2 \\ -2 & -2 & 0.15 \end{vmatrix}$ արտահայտության արժերը։

roraul	5 5.0,	,15 arranamajamer	սյաս ար <u>սսքը</u> ։
1) 20	2) $5\frac{4}{15}$	$\frac{1}{5}$ 3) $\frac{1}{15}$	4) 8

2. 5սմ երկարություն և 3սմ լայնություն ունեցող ուղղանկյան մակերեսը 2դմ²-ու ո՞ր մասն է կազմում։

1) 0,075	2) 7,5	3) $\frac{3}{4}$	4) $\frac{3}{80}$
		4	01

3. Գտնել 200-ի բոլոր բաղադրյալ բաժանարարների քանակը։ 1) 8 2) 10 3) 9 4) այլ պատասխան



4. Գտնել 1, 2, 3 թվանշաններով գրվող բոլոր կանոնավոր

կոտորակների քանակը, եթե լուրաքանչյուր կոտորակը գրելիս

1) $\frac{1}{6}$	2) $\frac{3}{4}$	3) $\frac{1}{8}$	4) $\frac{1}{12}$	
12. Նավաև	n atını hnuu		ամբ 90կմ-ն անցնում	ե 3
			ությամբ 80կմ-ը՝ 4 ժամո	
_			ակ A վայրից շարժ	
			ի [°] ժամ հետո նրանց մ	
	վորությունը կլ		Ir oaa naam ahaag a	1-24
unimo munim				
1) 2	2) 2,4	3) $\frac{12}{7}$	4) 1,2	
13. Գրա	ւտախտակին	գրված է 1234	ւ554321 թիվը։ Ջնջել ւ	մեկ
թվանշան ւ	այնպես, որ ա	 տացվի 9-ի վր	ա բաժանվող հնարա	վոր
			ւծ թվի վերջին ել	
	երի գումարը։		I di l'Ici	
1) 6	2) 7	3) 8	4) 9	
•	,	,	գել շախմատի մրցաշ <u>։</u>	ար։
			ուրաքանչյուրն ամեն մ	
հետ խաղա		1 1 3133	1 + 4 1	11
1) 56	2) 28	3) 8	4) 7	
	•	,	մարի հակադիր թիվը։	
_			1	
1) $\frac{1}{25}$	2) -25	3) -24	4) $\frac{1}{24}$	
16. Ωnnd 1	hpn iadwo ini	սկառից սկզբո	ւմ դատարկեցին ջրի	1/4
	,		10%-ը։ Դրանից հե	
տանառում	່ ປໂນເນດ 26າ	օուո։ Քան	ւի՞ լիտր է տակս	սռհ
տարողունս		21	I. [[].]1.	1
		որ յուստնեւ ա	յնպես, որ յուրաքանչյ	nın
_			սրը լինի նույնը, իսկ բո	_
			ի։ Գտնել 17 թվի եր	
	լերի արտադրյ		i. iaiaal ii lodli ali	4
napaaa pq	17	2	0	
				150
				159

11. Խաղոսկրը (զառը) գցել են երկու անգամ։ Ինչի՞ է հավասար հավանականությունն այն բանի, որ ստացված թվերի գումարը

կլինի 6-ին բազմապատիկ։

- 18. Պարի մրցույթին մասնակցում եին 22 երեխաներ։ Առաջին աղջիկը պարեց 7 տղաների հետ, երկրորդ աղջիկը՝ 8 տղաների հետ, երրորդը՝ 9 տղաների հետ և այդպես շարունակ։ Վերջին աղջիկը պարեց բոլոր տղաների հետ։ Քանի՞ տղա էր մասնակցում մրցույթին։
- 19. Երկու հայելային թվերի արտադրյալը հավասար է 65125-ի։ Գտնել այդ թվերի գումարը։ Երկու թվեր կոչվում են հայելային, եթե մեկը մյուսից ստացվում է թվանշանների հակառակ դասավորելիս (օրինակ՝ 123-ը և 321-ը)։
- 20. Չորսից փոքր թվանշաններով քանի՞ եռանիշ թիվ կարելի է կազմել այնպես, որ հարևան թվանշանները լինեն իրարից տարբեր։

8-րդ դասարան /առաջին փուլ/ 1.Գտնել $5^{15} + 7^{17} + 2^{12}$ թվի ամենափոքր պարզ բաժանարարը։ 2) 5 4) այլ պատասխան 1)3 2. 53-ից փոքր քանի՞ թիվ կա, որ կարելի է գրել երեք պարզ թվերի արտադրյալի տեսքով (արտադրիչները կարող են կրկնվել)։ 1)9 3. Գտնել x թիվը, եթե $\{-2x-1\} \cap \left\{4; \frac{1}{3}; -5\right\} = \left\{-5\right\}$ 3) $-\frac{2}{3}$ 1) - 2,52) 2 4. Կա 80 գ 25 %- անոց աղի լուծույթ։ Քանի՞ գրամ ջուր պետք է

գոլորշիացնել այդ լուծույթից, որպեսզի աղի պարունակությունը դառնա 80 %:

1) 55 3) 50 4) 35 5. Գտնել $\frac{5(180\cdot 6^7 - 108\cdot 6^6)}{216^3 - 36^4}$ արտահայտության արժեքը։

3) 120 1) 135 2) 27 4) այլ պատասխան


6. 11-ր չգերազանցող, 5 հայտարարով քանի՞ անկրձատելի անկանոն կոտորակ կա։

1) 39 2) 40 3) 41 4) այլ պատասխան

7. Գտնել $\left(\frac{3}{5}\right)$	$(\frac{3}{5}; -1\frac{2}{5})$ կետ	ով անցնող և օրդ	լինատների առանցքը 4 կետում
հատող ուղղ	լի անկյունայի	ւն գործակիցը։	
1) -4,5	2) $-\frac{11}{3}$	3) -9	4) այլ պատասխան
8. Քանի՞	(m,n) բնակ	ան թվերի զույց	դ կա, որոնց դեպ <u>ք</u> ում ձիշտ է
$m^2 - n^2 = 2$	2 ⁵⁰ +50 հավա	ւսարությունը։	
1) 1	2) 2	3)անթիվ	4) այլ պատասխան
9. \overline{abc} ເກເນໂ	ս <u>իշ թ</u> իվը հան	դիսանում է խոր	անարդի ծավալի թվային
1) 0	2) 1	սրզ։ Քանի՞ այդպ 3) 2	4) այլ պատասխան
10. Հայտնի	t, np (a-3)	(a-20) = 83: 9	տնել $\dfrac{a^2}{a+1}$ արտահայտության
արժեքը։ 1) 22,5	2) 23		4) 23,5
11. Հաշվել	$\left(1-\frac{1}{7^2}\right)\left(1-\frac{1}{7^2}\right)$	$1 - \frac{1}{8^2} \left(1 - \frac{1}{9^2} \right)$	$\cdot \ldots \cdot \left(1 - \frac{1}{20^2}\right)$ արտադրյալի
արժեքը։			
1) 0,9	2) 1,1	3) $\frac{6}{7}$	4) այլ պատասխան
12. Վեցանիշ թվի առաջին թվանշանը 1 է։ Եթե այն տեղափոխվի թվի գրության վերջում, ապա այն կմեծանա երեք անգամ։ Գտնել ստացված թվի թվանշանների գումարի հակադիրը։			
1) $\frac{1}{30}$	2) -30	3) -27	4) $\frac{1}{27}$
13. CAB եռանկյան AB կողմի վրա O կետը այնպիսին է, որ $\mathit{CO} = \mathit{OB}$			
		<i>C</i> -ն, եթե ∠ <i>ACI</i>	$B = 45^{\circ}$:
1) 15°	2) 105°	3) 30°	4) այլ պատասխան

14. AC հիմքով ABC հավասարասրուն եռանկյան արտաքին

անկյուններից մեկը 60° է։



- 1) 2 2) 2,5 3) 3 4) 4
- 15. BC հիմքով ABC հավասարասրուն եռանկյան BC և AC կողմերի վրա համապատասխանաբար D և E կետերը վերցված են այնպես, որ

AD = AE։ Գտնել EDC անկլունը, եթե $\angle BAD$ -ն 45° է։

- 1) 45° 2) 30° 3) 22.5° 4) այլ պատասխան
- 16. Ֆուտբոլի առաջնությունում հինգ ֆուտբոլիստներից առաջինը երկրորդից խփել է 2 անգամ պակաս գնդակ, երրորդը առաջինից խփել է 1 գնդակ պակաս, չորրորդը երրորդից 3 գնդակ ավել, հինգերորդը չորրորդից 3 գնդակ ավել։ Հայտնի է, որ այդ ֆուտբոլիստներից երկուսը խփել են հավասար թվով գնդակ, և ոչ մի ֆուտբոլիստ երկրորդից ավել գնդակ չի խփել։ Քանի՞ գնդակ է խփել երրորդ ֆուտբոլիստը։
- 17. Գտնել ամենափոքր բնական a թիվը այնպես, որ տեղի ունենա $3a^4=5b^3$ հավասարությունը, որտեղ b -ն նունպես բնական թիվ է։
- 18. 8-րդ դասարանի հինգ աշակերտներին հարկավոր է բաշխել երկու գուգահեռ դասարանների միջև։ Քանի՞ եղանակով է դա հնարավոր։
- 19. Մեկ տետրի, երկու մատիտի և մեկ գրիչի համար Կարենը վճարեց 120 դրամ։ Արսենը 270 դրամ վճարեց երկու տետրի, երեք մատիտի և երեք գրիչի համար։ Քանի՞ դրամ վճարեց Աշոտը երկու տետրի, հինգ մատիտի և մեկ գրիչի համար։
- 20. A թիվը 2017^2 թվի հետ փոխադարձաբար պարզ և նրանից փոքր բնական թվերի քանակն է ։ Գտնել A թվի թվանշաններից մեծի և փոքրի գումարը։


7-րդ դասարան /երկրորդ փուլ/

1. Հաշվել՝
$$\left| 5\frac{3}{7} - \left(2, 5 + 1\frac{1}{3} \right) : \frac{1}{6} \right| :$$

- 2. Վինի Թուխը, Խոզուկը, Հագարը և Իշուկը կերան մի տակառիկ մեղր։ Ընդ որում Խոզուկը կերավ Վինի Թուխի կերածի կեսի չափով, իսկ Ճագարը` Վինի Թուխի չկերածի կեսի չափով։ Իշուկը կերավ մեղրի տասներորոդ մասը։ Մեղրի ո՞ր մասը հասավ Հագարին։
- 3. Գտնել զրոյից տարբեր թվանշաններով գրվող այն քառանիշ թվերը, որոնց առաջին երեք թվանշանների գումարը հավասար է 24, իսկ վերջին երեք թվանշանների գումարը ` 16։
- 4. Դասարանի բոլոր աշակերտների 20 %-ը և ևս 5 աշակերտ խաղում են շախմատ, իսկ $\frac{3}{7}$ մասը և ևս 8 աշակերտ՝ վոլեյբոլ։ Քանի՞ աշակերտ է սովորում դասարանում, եթե դասարանի յուրաքանչյուր աշակետ մասնակցում է այդ խաղերից միայն մեկին։
- 5. Խանութում կար 1,75 տ խնձոր և 1,1 տ տանձ։ Օրական վաձառվում էր 125 կգ խնձոր` կիլոգրամը 250 դրամով, և 110 կգ տանձ` կիլոգրամը 300 դրամով։ Նվազագույնը քանի՞ օրում խնձորի վաձառքից ստացված հասույթը /գումարը/ կգերազանցի տանձի վաձառքից ստացված հասույթին։
- 6. Շրջանագծի վրա վերցրել են 8 կետ, որոնցից երկուսը ներկել են կարմիր գույնով, երեքը՝ կապույտ գույնով, իսկ մյուս երեքը՝ ծիրանագույն։ Գտնել այն եռանկյունների քանակը, որոնց գագաթները նշված կետերն են և, որոնց գագաթներից գոնե երկուսը ներկված են նույն գույնով։
- 7. Արամը գրեց 136 հատ սովորական կանոնավոր կոտորակ՝ $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}, \frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \frac{3}{5}, \frac{4}{5}, \dots$, որից հետո այն կոտորակները, որոնք

փոքր են $\frac{1}{2}$ -ից, ներկեց կարմիր գույնով, իսկ մնացած կոտորակները՝ կապույտ գույնով։ Ո՞ր գույնի կոտորակներն են շատ և որքանո՞վ։

8. 11 սմ, 9 սմ, 7 սմ և 5 սմ կողմերով քառակուսիները դասավորված են այնպես, ինչպես ցույց է տրված նկարում։ Պարզվել է, որ գորշագույն մասերի մակերեսների գումարը կրկնակի մեծ է սև մասերի մակերեսների գումարից։ Գտնել սպիտակ մասերի մակերեսների գումարը։




8-րդ դասարան /երկրորդ փուլ/

1. Գտնել y = 0.5x - 4և $y = 1\frac{1}{4}x + 8$ ուղիղների հատման կետի

հեռավորությունը աբսցիսների (x-երի) առանցքից։

- 2. Սայլի առջևի անիվի շրջանագծի երկարությունը 2,5 մ է, իսկ հետևի անիվինը` առջևինից 40%-ով ավելի։ Քանի[°] մետր Ճանապարհ կանցնի սայլը, եթե առջևի անիվը 20 պտույտ ավել կատարի, քան հետևի անիվը։
- 3. Վերլուծել արտադրիչների. $a^3 + a^2 12$
- 4. Դիցուք A-ն 5-ի վրա չբաժանվող երկնիշ թվերի բազմությունն է, իսկ B-ն 3-ի վրա բաժանվող երկնիշ թվերի բազմությունն է։ Գտնել $A \cup B$ բազմության տարրերի քանակը։
- 5. Զրոյից տարբեր երեք տարբեր թվանշաններով կազմել են բոլոր հնարավոր չկրկնվող թվանշաններով երկնիշ թվերը։ Պարզվել է, որ այդ բոլոր թվերի գումարը հավասար է 154-ի։ Գտնել այդ թվանշանները։ (Հիմնավորել)։
- 6. Ապացուցել, որ ցանկացած 11 բնական թվերից կարելի է ընտրել երկուսը, որոնց գումարը կամ տարբերությունը բաժանվում է 19-ի։
- 7. AD-ն ABC եռանկյան կիսորդն է, իսկ DH-ը՝ ADC եռանկյան բարձրությունը։ Գտնել ABC անկյունը, եթե DH=4 սմ, BD=8 սմ։

8. Տրված է $\angle BAC = \angle CAM$, $\angle BEC = \angle BDA$, AD = CE ։ Ապացուցել, որ AM -ը զուգահեռ է BC -ին։



10-րդ դասարան Մաթեմատիկա

1.Պարզեցնել արտահայտությունը.

$$\left(\frac{x}{x^2 - 36} - \frac{x - 6}{x^2 + 6x}\right) : \frac{2x - 6}{x^2 + 6x} + \frac{x}{6 - x}$$

- 2. $\left(a_{_{n}}\right)$ թվաբանական պրոգրեսիայում $a_{_{6}}=13$, $a_{_{4}}+a_{_{7}}=21$ ։ Գտնել 60-ը չգերազանցող բոլոր անդամների գումարը։
- 3. Գիրքը բաղկացած է երկու բաժնից, ընդ որում, առաջին բաժինը 30 էջով ավել է գրքի կեսից և 25%-ով ավել էջ ունի, քան երկրորդ բաժինը։ Քանի՞ թվանշան է գրվել գրքի առաջին բաժինը համարակալելիս /համարակալումը սկսվում է 1-ով/։
- 4. Լուծել համակարգը.

$$\begin{cases} x + 2 \ge \frac{4}{2 - x} \\ |x - 2| + |x + 2| \le \frac{2}{3}x + 4 \end{cases}$$

- 5. 10! $(n!=1\cdot 2\cdot 3\cdot ...\cdot n; n\in N)$ թիվը քանի՞ եղանակով կարելի է ներկայացնել a և b բնական թվերի արտադրյալի տեսքով այնպես, որ a թիվը հանդիսանա b թվի բաժանարար։
- 6. Կախված a պարամետրի արժեքներից, գտնել $ax^2 + 2x + 1 = 0$ հավասարման արմատների քանակր և արմատների նշանները։
- 7. AD տրամագծով շրջանագծին ներգծված է ABC եռանկյունը, ընդ որում, AB=24 սմ, AC=15 սմ և $\angle BAC=60^\circ$ ։ Գտնել BD հատվածի երկարությունը։
- 8. M -ը և N -ը գտնվում են ABCD ուռուցիկ քառանկյան համապատասխանաբար BC և AD կողմերի վրա։ O -ն` BD և MN հատվածների հատման կետն է։ Ապացուցել, որ, եթե $S_{ABD}=S_{BCD}$,

BM = MC li MO = ON, li Mi = ND:

Ֆիզիկա Թեստային առաջադրանքներ

- 1. Նկարում պատկերված ձախարակներից որի՞ կիրառման ընթացքում են կորցնում ձանապարհի մեջ։ /1 միավոր/
- 1) w, 2) p, 3) q, 4) həlməliri nə dh nəmpənid:
- 2. Նկարում պատկերված հաղորդակից անոթներից Բ-ն փակ է, իսկ մյուսները՝ բաց։ Նշված հաղորդակից անոթներից որո՞նք հնարավոր չէ մինչն պռունկները ջուր լցնել։ /1 միավոր/
- 1) U-u u F-u, 2) F-u u Q-u,
- 3) F-u, 7-u u t-u, 4) U-u, 9-u u 2-u:
- **3.** m և 2m զանգվածով մարմիններն ազատ անկում են կատարում միևնույն H բարձրությունից։ Դրանցից n° րը գետնին կհարվածի ավելի մեծ արագությամբ։ /1 միավոր/
- 1) m զանգվածով մարմինը, 2) 2m զանգվածով մարմինը,
- 3) երկուսն էլ կհարվածեն նույն արագությամբ, 4) հնարավոր չէ որոշել։
- **4.** Ինչո՞ւ միևնույն պայմաններում եթերն ավելի շուտ է գոլորշիանում, քան ջուրը. /1 միավոր/

- 1) եթերն ավելի ցածր ջերմաստիձանում է գոլորշիանում, քան ջուրը,
- 2) եթերի մոլեկուլների միջև փոխադարձ ձգողության ուժերն ավելի փոքր են, քան ջրի մոլեկուլներինը,
- 3) եթերի և ջրի մոլեկուլների չափերը տարբեր են,
- 4) եթերի գոլորշիացման համար ավելի շատ ջերմաքանակ է պահանջվում, քան ջրի։
- 5.Նշված պնդումներից ո՞րն է սխալ. /1 միավոր/
- 1) դիմադրությունը բնութագրում է էլեկտրական հոսանքին հակազդելու՝ հաղորդչի ներքին հատկությունը,
- 2) դիմադրությունը կախված է հաղորդչի երկրաչափական չափերից և նյութի տեսակից,
- 3) դիմադրությունը հակադարձ համեմատական է հոսանքի ուժին,
- 4) դիմադրությունը կախված է հաղորդչի ջերմաստիձանից։
- 6. Գլանաձև խողովակի մեջ տեղադրված է հավաքող ոսպնյակ։ Հավաքող ոսպնյակի դիմաց դրված է փոքրիկ լամպ։ Ոսպնյակից ի՞նչ հեռավորության վրա է գտնվում լամպը, եթե էկրանի վրա լուսավոր շրջանի չափերը կախված չեն էկրանից մինչև խողովակ հեռավորությունից։ Լույսի անդրադարձումը խողովակի ներքին պատերից անտեսեք։

/1 միավոր/

1) F/2, 2) F, 3) 2F, 4) h@upudnp \$\tau\ npn2\text{\text{\text{l}}}:

Որակական հարցեր

7.8ույց տվեք բեռի վրա ազդող շփման ուժի ուղղությունը բեռնափոխադրիչի ժապավենի պտտման երկու ուղղությունների դեպքում։ /1միավոր/




8. Ուղիղ պատերով երկու միատեսակ անոթ տեղադրված են նկարում պատկերված ձևով և լցված են հավասար քանակի ջրերով։ Նու՞յնն են արդյոք ջրի ձնշումը և ձնշման ուժը երկու անոթների հատակին։ Պատասխանը հիմնավորեք։ /1միավոր/

9. Ինչու[°] իրարից հեռու տեղադրված մագնիսական սլաքները դասավորվում են մի ուղղությամբ (նկ.1), իսկ իրար մոտ տեղադրված մագնիսական սլաքները՝ մեկ այլ ուղղությամբ (նկ.2)։ /1միավոր/



10. Նկարում պատկերված լույսի S կետային աղբյուրը գտնվում է C կետում։ Նշված կետերից որո՞վ (որոնցո՞վ) չի անցնի AB հայելուց անդրադարձած Ճառագայթ։

Պատասխանը հիմնավորեք։ /1 միավոր/



Խնդիրներ

- 11. Մարմինը նետված է 40 մ/վ արագությամբ դեպի վեր։ Երկրի մակերևույթից ի՞նչ բարձրության վրա նրա պոտենցիալ էներգիան 3 անգամ մեծ կլինի կինետիկ էներգիայից։ Օդի դիմադրությունն անտեսել /g=10մ/վ²/։ /2 միավոր/
- 12. Նկարում պատկերված է անհավասարաչափ շարժում կատարող մարմնի արագության ՝ ժամանակից կախվածության գրաֆիկը։ ա/ Ինչքա՞ն է մարմնի անցած ձանապարհը 0-ից 2վ-ում։ /0.5 միավոր/ բ/Ինչքա՞ն է մարմնի արագացումը 5վ-ից 9վ ժամանակահատվածում։ /0.5 միավոր/




գ/Ինչքա՞ն է մարմնի միջին արագությունը 0-ից 9վ ժամանակահատվածում։ /0.5 միավոր/

դ/Կառուցեք մարմնի արագացման՝ ժամանակից կախվածության գրաֆիկը։ /0.5 միավոր/

13. Ըստ նկարում պատկերված սխեմայի որոշեցեք.

ա/հոսանքի ուժը շղթայի չճյուղավորված մասում, /1 միավոր/




14. Իրար թելով ամրացված $m_1=2$ կգ և $m_2=4$ կգ զանգվածներով չորսուների վրա ազդում է F ուժը։ g=10 մ/վ 2 ։ Ինչքա 2 ն պետք է լինի F ուժը, որպեսզի

ա) չորսուները միացնող թելի լարման ուժը լինի 40Ն, /0.5 միավոր/

բ) չորսուները միացնող թելի լարման ուժը լինի 48Ն, /1 միավոր/

գ) չորսուները շարժվեն դեպի ներքև 2 մ/վ 2 արագացումով։ /0.5 միավոր/

15. Երկու միատեսակ ջեռուցիչներով տաքացվում են նույն զանգվածով A և B նյութերը։ Նկարում պատկերված է նյութերի ջերմաստիձանի ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկները։ Դիտարկման սկզբնապահերին երկու նյութի ջերմաստիձանը



F

2 կգ

4 կգ

երկու նյութի ջերմաստիձանը 300°C էր։ B նյութի հալման ջերմաստիձանը 330°C է, A նյութը տաքացվել է մինչև 450°C։ Մնացած տվյալները վերցրեք գրաֆիկներից։ Ջերմային կորուստներն անտեսեք։


ա/ Գտեք պինդ վիճակում A և B նյութերի տեսակարար ջերմունակությունների հարաբերությունը։ /1 միավոր/

r/ Գտեք A և B նյութերի հալման տեսակարար ջերմությունների հարաբերությունը։ /0,5 միավոր/

գ/ Գտեք հեղուկ վիճակում A և B նյութերի տեսակարար ջերմունակությունների հարաբերությունը։ /0,5 միավոր/

		2018թ.		
	7-րդ	դասարան /առս	ւջին փուլ/	
1. Գտնել	$0,875 - \left -\frac{13}{18} \right $	2 <mark>- ⁸ · 0,1 արտա</mark>	հայտության արժեքը։	
u) 0,85	բ) 0,9	q) -1,625	դ) այլ պատասխան	
			րի հակադարձ թիվը։	
			4	
$\frac{1}{25}$	բ) -25	q) -24	η) $\frac{1}{24}$	
3. Շրջանս	սգծի վրա նշված	են մի քանի կետ	եր, որոնցից յուրաքանչյուր	
երկուսով	տարված է ուղի	ղ։ Գտնել կետերի	ո քանակը, եթե տարված է	
րնդամենլ	ո 15 ուղիղ։			
u) 8	բ) 5	q) 6	դ) այլ պատասխան	
		մեծացնել 27-ը, ո	րպեսզի ստացվի 72-ից 25%-ւ	ով
փոքր թիվ		0 2 2		Ī
u) 4	բ) 2	q) 1,5	դ) այլ պատասխան	
5. 2 hավր	3 օրում ածում է	4 ձու։ Քանի՞ ձու	կածեն ինը հավը ինը օրում։	
		q) 36	η) 72	
	_	_	6 մասը, իսկ երկրորդ օրը՝ 1	/8
			Անիին մնացել է կարդալու և	
34 էջ։	1 210 1 1			
	բ) 56	q) 42	դ) այլ պատասխան	
7. Դպրոց	ի աշակերտներն	ւ ուսումնասիրո	ւմ են անգլերեն և ֆրանսերե	ն։
			-ը՝ ֆրանսերեն։ Աշակերտնե <u>լ</u>	
_	կոսն է տիրապե			-
u) 40	բ) 50	q) 30	դ) այլ պատասխան	
8. 10դմ կո	ողմ ունեցող խոլ	ոանարդը ամբ <mark>ո</mark> ւ	լջովին տրոհեցին 10սմ կողմո	ով
խորանալ	որիկների։ Այնու	հետև բոլոր խոր	անարդիկները շարեցին ուղո	լի
վրա կողլ	ջ կողքի /հարևս	սն խորանարդի	կների նիստերը իրար հպան	5/:
	տր է շարքի երկւ	•		
u) 10000	р) 1000	q) 100	դ) այլ պատասխան	
9. 3-ին բւ			նակը 5-ին չբաժանվող երկն]	12
	նակի ո՞ր մասն 🛚			
		q) 5/12	ŋ) 10/27	
		ւտ թիվ կա, որո	նցից յուրաքանչյուրը կարելի	է
ներկայացնել երկու պարզ թվերի գումարի տեսքով։				
	р) 7		ŋ) 5	

- 11. Սուրենն ու Արմենը միասին ամբողջ բերքը կարող են հավաքել 12 օրում։ 10 օր միասին աշխատելուց հետո Սուրենը հավաքած բերքը տարավ վաճառելու, իսկ Արմենը միայնակ 3 օրում ավարտեց բերքահավաքը։ Սուրենը միայնակ քանի՞ օրում կարող էր հավաքել ամբողջ բերքը։
- 12. Եթե դասարանի աշակերտներից յուրաքանչյուրին տան 2 տետր, ապա 19 տետր կավելանա, իսկ եթե աշակերտներից յուրաքանչյուրին փորձեն տալ 4 տետր, ապա 11 տետր կպակասի։ Քանի՞ աշակերտ կա դասարանում։
- 13. Երկու հեծանվորդ միաժամանակ դուրս եկան Ա և Բ վայրերից։ Առաջինին Ա-ից Բ գնալու համար պահանջվում է մեկ ժամ, իսկ երկրորդին Բ-ից Ա գնալու համար՝ կես ժամ։ Քանի՞ րոպեից նրանք կհանդիպեն։
- 14. 100-ը ինչ-որ թվի բաժանելիս մնացորդում ստացվում է 4, իսկ 90-ը այդ նույն թվին բաժանելիս մնացորդում ստացվում է 18։ Գտնել բաժանարարը։
- 15. Գտնել 4-ից մեծ և 200-ից փոքր այն բնական թվերի քանակը, որոնք ունեն միշտ երեք բաժանարար։
- 16. Վեց թվերի միջին թվաբանականը հավասար է 17-ի։ Երբ այդ թվերից մեկը հեռացրին, մնացած հինգ թվերի միջին թվաբանականը դարձավ 19։ Ինչի՞ է հավասար հեռացված թիվը։
- 17. Թվային ուղղի վրա նշված են A(-1,5), B(7,5) և C(x) կետերը։ Գտնել x-ը, եթե C կետը գտնվում է A և B կետերի միջև, իսկ BC հատվածի երկարությունը երկու անգամ մեծ է AC հատվածի երկարությունից։
- 18. Քանի[°] երկնիշ թիվ կա, որոնց գրառման մեջ միավորը փոքր է տասնավորից։
- 19. Հայրը, մայրը և տղան ոտքով գնում են դպրոց։ Եթբ հայրը կատարում է երեք քայլ, մայրը կատարում է 5 քայլ։ Երբ մայրը կատարում է 3 քայլ, տղան կատարում է 5 քայլ։ Մայրիկը և տղան հաշվել են, որ նրանք միասին կատարել են 400 քայլ։ Քանի՞ քայլ կատարեց հայրը։
- 20. Նկարում պատկերված ուղղանկյունը տրոհված է հինգ քառակուսիների։ Փոքր քառակուսու կողմը հավասար է 5սմ-ի։ Գտնել ուղղանկյան պարագիծը։




ա) 18 թ) 12 գ) 0 դ) այլ պատասխան 10. XOY կոորդինատային համակարգում տրված վերցված են A(0;-4) և B(4;0) կետերը։ Գտնել C կետի բոլոր հնարավոր դեպքերի քանակն այնպես, որ ABC եռանկյունը լինի հավասարասրուն ուղղանկյուն եռանկյուն։

- ա) 6 p) 4 q) 1 դ) այլ պատասխան
- 11. Եռանիշ թիվը սկսվում է 7 թվանշանով։ Եթե 7-ը տեղափոխենք այդ թվի վերջ, ապա ստացված եռանիշ թիվը կլինի սկզբնականից 117-ով փոքր թիվ։ Գտնել եռանիշ թիվը։
- 12. Հրաձգության մրցույթին մասնակցում էին 16 մարդ։ Բոլորը միասին հավաքեցին 480 միավոր։ Երրորդը մասնակիցը հավաքեց առաջին և երկրորդ մասնակիցների հավաքած միավորների թվաբանական միջինի չափ, չորրորդը առաջին երեքի թվաբանական միջինի չափ և ընդհանրապես, յուրաքանչյուր հաջորդը սկսած երրորդից հավաքել է իր նախորդների հավաքած միավորների թվաբանական միջինի չափ։ Քանի՞ միավոր հավաքեցին առաջին և երկրորդ մասնակիցները միասին։
- 13. a,b,c,d,e դրական թվերն այնպիսին են, որ ab=2,bc=3,cd=4,de=5։ Ինչի՞ է հավասար $\frac{e}{a}$ -ը։
- 14. Հայտնի է, որ x+3y=8։ Գտնել (2x 6y)։ $(0,25x^2 2,25y^2)$ ։
- 15. Գտնել $\, k \,$ թիվը, եթե հայտնի է, որ $\, y$ =0,25 $\, k^2 x$ -3 գծային ֆունկցիայի գրաֆիկը զուգահեռ է $\, y$ =($\, k$ -1) $\, x \,$ ֆունկցիայի գրաֆիկին։
- 16. ABC-ն AB ներքնաձգով ուղղանկյուն եռանկյուն է։ AB ուղղի վրա վերցրած K և M կետերն այնպիսին են, որ AK = AC, BM = BC, ընդ որում K կետը գտնվում է AB ներքնաձգի վրա, իսկ M կետը չի գտնվում AB ներքնքձգի վրա։ Գտնել KCM անկյան մեծությունը։
- 17. Ուղղանկյունը տրոհված է չորս ուղղանկյունների։ Քանի՞ դմ² է ուղղանկյան մակերեսը, եթե հայտնի են երեք փոքր ուղղանկյունների մակերեսները։

0,03น์2	900uú²
9դմ²	

18. **a** և **b** ուղիղները զուգահեռ են։ ∠ABC=100⁰, ∠ACD=70⁰, AB=BC: Գտնել EDC անկյան մեծությունը։



- 19. *ABC* եռանկյան մեջ ∠B=20⁰, ∠C=40⁰, իսկ AD կիսորդի երկարությունը
- 4,8սմ է։ Գտնել BC և AB կողմերի երկարությունների տարբերությունը։
- 20. Երկու նավահանգիստների միջև եղած հեռավորությունը գետի հոսանքի ուղղությամբ մոտորանավակն անցնում է 8 ժամում, իսկ լաստր՝ ժամում։ Քանի՞ ժամ կծախսի մոտորանավակը հեռավորությունը լձով անցնելու դեպքում։

7-րդ դասարան /երկրորդ փուլ/ 1. Հաշվել՝
$$\left(\left|1,3-3\frac{1}{5}\right|:0,038\right):\left(\frac{6}{11}-\frac{52}{55}\right):$$

- Չամբլուղում կա 30 հատ միրգ՝ տանձ և խնձոր։ Հայտնի է, որ 2. ցանկացած 12 մրգից գոնե մեկը տանձ է և ցանկացած 20 մրգից գոնե մեկը խնձոր է։ Քանի՞ տանձ և քանի՞ խնձոր կա զամբյուղում։
- 3. 17-ից մեծ և 1000-ից փոքր թվերը գրված են առանձին թերթիկների վրա։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ թերթիկ պետք է վերցնել, որպեսզի այդ թերթիկների վրա գրված թվերից գոնե մեկը 3-ի բաժանելիս մնացորդում ստացվի 2։
- 4. Երկու թվերի գումարը 2018 է։ Գտնել այդ թվերը, եթե նրանցից մեկի վերջին թվանշանը ջնջելուց ստացվում է մյուս թիվը։
- Ուղղանկյունը տրոհված 5. ուղղանկյունների /տես նկարը/։ Ստացված ուղղանկյունների երեք

պարագծերը համապատասխանաբար հավասար են 16մ, 20մ և 14մ։ Գտնել չորրորդ ուղղանկյան պարագիծը։


16น์	20น์
14น์	

- 6. Բնական թիվն ունի ձիշտ երեք պարզ բաժանարար։ Եթե այդ թիվը բազմապատկենք 6-ով կամ 7-ով, ապա ստացված թվերը նույնպես կունենան երեր պարզ բաժանարար։ Գտնել ալդպիսի ամենափորը թիվը, եթե այն ունի ձիշտ 12 բաժանարար։
- 7. Շախմատի մրցաշարին մասնակցում են 16 մարդ։ Ընդ որում յուրաքանչյուր երկուսը իրար հետ խաղում են միայն մեկ պարտիա /հաղթանակի դեպքում հաղթողին տրվում է 1, իսկ պարտվողին 0 միավոր, ոչոքիի դեպքում յուրաքանչյուր մասնակցին տրվում է 0,5 միավոր/։ 10 և ավելի միավոր հավաքած մասնակիցը ստանում է մրցանակ։ Ամենաշատր քանի՞ մասնակից կարող է ստանալ մրցանակ։
- 8. Գնացքը A-ից B ձանապարհը պետք է անցներ որոշակի արագությամբ։ Նախատեսված ժամանակի 2/3-ի ընթացքում գնացքն

ձանապարհի AC հատվածը, որը կազմում է ամբողջ ձանապարհի 75%-ը։ Այնուհետև գնացքը ձանապարհի CB հատվածն անցավ ավելի ցածր արագությամբ և ժամանակին տեղ հասավ։ Գնացքի արագությունը AC հատվածում քանի՞ անգամ է մեծ CB հատվածում ունեցած արագությունից։

8-րդ դասարան /երկրորդ փուլ/

- 1. Գտնել $9x^2+y^2$ արտահայտության արժեքը, եթե 3x+y=2 և xy=-3:
- 2. k-ի n ր արժեքների դեպքում y=kx+2 ֆունկցիայի գրաֆիկը անցնում է (k-6;-7) կետով։
- 3. Յոթ միատեսակ տրակտորներից կազմված խումբը դաշտը կարող է վարել 42 օրում։ Քանի՞ այդպիսի տրակտոր է անհրաժեշտ դաշտը 28 օրում վարելու համար, եթե տրակտորներն աշխատեն 25% պակաս արտադրողականությամբ։
- 4. Վերլուծել արտադրիչների. x(x+1)(x+2)(x+3)+1
- 5. Ինչպիսի՞ թ պարզ թվերի դեպքում 2p+1 և 4p+1 թվերը նույնպես կլինեն պարզ։
- 6. Եռանիշ թիվը 5 անգամ մեծ է նրա թվանշանների արտադրյալից։ Գտնել այդ թվի թվանշանների գումարի հակադիր թիվը։
- 7. ABC եռանկյան AAı և CCı կիսորդները հատվել են O կետում և ∠ABC=120⁰։ Գտնել Aı և Cı կետերի համապատասխանաբար CCı և AAı ուղիղներից ունեցած հեռավորությունների գումարը, եթե OAı+OCı=12uմ։
- 8. Ուռուցիկ վեցանկյան հանդիպակաց կողմերը զուգահեռ են և հավասար։ Գտնել վեցանկյան ոչ հարևան երեք գագաթներով առաջացած եռանկյան մակերեսը, եթե վեցանկյան մակերեսը հավասար է 28սմ²։



10-րդ դասարան Մաթեմատիկա

1. Ապացուցեք, որ ցանկացած n ամբողջ թվի համար n^4-n^2 արտահայտության արժեքը բաժանվում է 4-ի։

- 2. Թվաբանական պրոգրեսիայում $a_3 + a_5 = 64$ և $S_4 = 68$ ։ Ապացուցեք, որ պրոգրեսիայի որևէ անդամ չի կարող լինել բնական թվի քառակուսի։
- 3. Հայտնի է, որ $\frac{x_1^2}{x_2} + \frac{x_2^2}{x_1} = 4$, որտեղ x_1 –ը և x_2 –ը $x^2 2ax + 2a = 0$

հավասարման իրարից տարբեր արմատներն են։ Գտեք a –ն։

- 4. Լուծեք համակարգը. $\begin{cases} \sqrt{x-2} \ge -1 \\ |x+2| + |x-2| = 4 \end{cases}$
- 5.Երկու կետեր շարժվում են շրջանագծով նույն ուղղությամբ։ Շրջանագծի երկարությունը 24 մ է։ Առաջին կետը մեկ լրիվ պտույտը կատարում է երկրորդից 9 րոպեով արագ և լուրաքանչյուր 4 րոպեն մեկ հասնում է երկրորդին։ Գտեք այդ կետերի արագությունները։
- Քանի[°] եղանակով 400-ր կարելի ներկայացնել 6. է փոխադարձաբար պարզ թվերի գումարի տեսքով։ (Երկու բնական թվեր փոխադարձաբար պարզ, եթե նրանց ընդհանուր կոչվում են բաժանարարը միայն 1 թիվն է։ 400 = a + b և 400 = b + aներկայացումները համարել նույնը)։
- 7. Շրջանագծին ներգծած ABCD քառանկյունում հայտնի է, որ AB = BC = 2, $\angle ABC = 120^{\circ}$, huly AD lu CDտարբերությունը՝ 1 է։ Գտեք ABCD քառանկյան մակերեսը և շրջանագծի շառավիդը։
- 8. AC = 12 և BC = 16 էջերով ուղղանկյուն եռանկյանը ներգծած շրջանագիծը BC էջր շոշափում է K կետում։ K կետից AC էջին տարված գուգահեռ ուղիդր AB հատվածր հատում է P կետում։ Գտեք.
- 1. *KP* հատվածի երկարությունը։
- 2. K և P կետերով անցնող և AC հատվածը շրջափող շրջանագծի շառավիդի երկարությունը։

Ֆիզիկա

Թեսթեր 1-6 /յուրաքանչյուրը 1 միավոր/

1. Նկարում պատկերված անկշիռ ձողի ծայրակետերում կիրառված են $F_1=100$ Ն և $F_2=300$ Ն ուժեր։ Ձողի ո՞ր կետում պետք է տեղադրել հենարանը, որպեսզի ձողը գտնվի հավասարակաշռության մեջ։

ա/ 1 կետում, բ/ 2 կետում, 2. Ինչպե՞ս է փոփոխվում սուզանավի վրա ազդող արքիմեդյան ուժը, երբ այն ծովի մակերևույթից սուզվում է մինչև 500 մ խորությունը։ Ջրի խտությունը համարեք անփոփոխ։

ա/անընդհատ մեծանում է, բ/ անրնդհատ փոքրանում է, գ/ սկզբում փոքրանում է, հետո՝ մեծանում, դ/ սկզբում մեծանում է, հետո՝ մնում հաստատուն։

3. Ո՞ր դեպքում է խոսք գնում ակնթարթային արագության մասին։ 1/գնդակը հրացանի փողից դուրս է թռչում 800 մ/վ արագությամբ։ 2/ Երևանից Մոսկվա ինքնաթիռը թռչում է 800 կմ/ժ արագությամբ։ 3/ դադարի վիճակից ավտոբուսը 10 վ-ում ձեռը բերեց 20 մ/վ

ա/ միայն 1, բ/ միայն 2, q/2 h 3, $\eta/1 li 3$

Նշված ո՞ր պրոցեսում (պրոցեսներում) է տեղի ունենում նյութի տեղափոխություն։

ա/ միայն ջերմահաղորդականության, բ/ միայն կոնվեկցիայի, գ/ ջերմահաղորդականության և կոնվեկցիայի,

դ/ կոնվեկցիայի և ձառագայթման

5. Նկարում պատկերված շղթայում վոլտաչափը ո՞ր հաղորդչի (հաղորդիչների) վրա լարումն է չափում։


ա/միայն R₁-ի, q/ R2-h h R3-h,

արագություն։

բ/ R₁-ի և R₂-ի, ŋ/ R1-þ, R2-þ, R3-h:

6. Ի՞նչ բևեռներ են առաջանում նկարում պատկերված էլեկտրամագնիսի ծայրերին։

w/wo bwinned N, awhined S, բ/աջ ծայրում S, ձախ ծայրում՝ N գ/ երկու ծայրերում էլ N, դ/ երկու ծայրերում էլ Տ։



Որակական առաջադրանքներ

7. Նկարում պատկերված օդահան պոմպի զանգի տակ, որը լցված է օդով, հավասարակշոված են տարբեր տրամագծերով երկու ապակե գունդ։ Լծակր հավասարաբագուկ է։ Ո՞ր



գունդը կբարձրանա, եթե զանգի միջից օդը լրիվ հանենք։ Պատասխանը հիմնավորեք։ /1 միավոր/

8. Ձմռանը դրսում մետաղը շոշափելիս ավելի սառն է թվում, քան փայտը։ Ինչու՞։ Ի՞նչ կթվա մեզ ստվերում երեսուն աստիձան ջերմաստիձանի դեպքում նույն մետաղն ու փայտը շոշափելիս։ Ո՞ր ջերմաստիձանում դրանք շոշափելիս միատեսակ զգացողությունը կունենանք։ /1 միավոր/

9. M և m զանգվածներով (M>m) երկու մարմին միաժամանակ բաց են թողնում նույն բարձրությունից։ Մարմինների վրա ազդող դիմադրության ուժերը համարեք հաստատուն և իրար հավասար։ Ո՞ր մարմինն ավելի


շուտ կհասնի գետնին։ Պատասխանը հիմնավորեք։

/1 միավոր/

10. Լույսի A կետային աղբյուրը և անթափանց D գունդը գտնվում են BC հարթ հայելու դիմաց։ Ցույց տվեք ստվերի և կիսաստվերի տիրույթները։ /1 միավոր/

Խնդիրներ

11. Փականով բաժանված հաղորդակից անոթների ձախ ծնկում ջրի սյան բարձրությունը 50 սմ է, աջում՝ 6.5 սմ։ Ձախ ծնկի լայնական հատույթի մակերեսը 10 սմ² է, աջինը՝ 20սմ²։ Անոթները միացնող խողովակի չափերն անտեսեք։



ա/ Ինչքա՞ն է փականի երկու կողմերում ջրի

հիդրոստատիկ ձնշումների տարբերությունը։ Ջրի խտությունը՝ 1000 կգ/մ³։

/1 միավոր/

բ/ Որքանո՞վ կփոխվի ջրի մակարդակն աջ ծնկում, եթե փականը բացենք։

/1 միավոր/


12. Նկարում պատկերված սխեմայում R₁=10 Oմ,

R₂=5 Od, R₃=2 Od, R₄=6 Od, իդեալական ամպերաչափի ցուցմունքը՝ I₂=2U:

ա/ Որոշեք շղթայի լրիվ դիմադրությունը։

/1 միավոր/

բ/ Որոշեք № դիմադրությամբ լամպի սպառած հզորությունը։ /1 միավոր/



13.Երկու չորսու դրված են սեղանին և հպվում են իրար։ Չորսուների m

 m_2

զանգվածներն են՝ m1=3կգ և m2=2կգ։

Առաջին չորսուն հրում են

հորիզոնական ուղղված F=10Ն ուժով (տե՛ս նկ.)։

ա/ Ի՞նչ ուժով է առաջին չորսուն ազդում երկրորդի վրա համատեղ շարժման

ընթացքում, եթե չորսուների և սեղանի միջև շփումը բացակայում է։ /1 միավոր/

p/ Ի՞նչ ուժով է առաջին չորսուն ազդում երկրորդի վրա համատեղ շարժման ընթացքում, եթե չորսուների և սեղանի միջև շփման գործակիցը µ=0.1 է։ /1 միավոր/

14. 0.45 կգ սառեցված բանջարեղենը հանում են -20°C ջերմաստիձանի սառցարանից և անմիջապես տեղադրում 1.1 կգ եռման ջրով (100°C) լցված է 1 կգ զանգվածով ալյումինե կաթսայի մեջ։ Համակարգի վերջնական ջերմաստիձանը 83° C է։ Ջրի տեսակարար ջերմունակությունը 4200 Ջ/կգ.°C է, ալյումինի տեսակարար ջերմունակությունը՝ 920 Ջ/կգ.°C:

ա/Հաշվեք բանջարեղենի տեսակարար ջերմունակությունը։

/1 միավոր/

բ/ Բանջարեղենով ձաշ պատրաստելու համար 83°C ջերմաստիձանի կաթսան պարունակության հետ միասին դնում են էլեկտրասալիկի վրա, որի հզորությունը 1200 Վտ է։ Ճաշը եփում է այն ժամանակ, երբ ջուրը պակասած կլինի 100 գ-ով։ Ինչքա՞ն ժամանակ կպահանջվի բանջարեղենով ձաշ պատրաստելու համար։ Ջերմային կորուստներն անտեսեք։ Ջրի շոգեգոյացման տեսակարար ջերմությունը՝ 2.3·106 Ջ/կգ։ /1 միավոր/

15.Առարկան տեղադրված է հավաքող ոսպնյակի կիզակետից 4սմ հեռավորության վրա, իսկ նրա իրական պատկերն ստացվել է մյուս կիզակետից 9սմ հեռավորության վրա։

ա/ Կառուցեք տվյալներին համապատասխան բացատրական գծագիր։

/0,5 միավոր/


բ/ Ինչքա՞ն է ոսպնյակի կիզակետային հեռավորությունը։

/1 միավոր/

գ/ Ինչքա՞ն է առարկայի պատկերի խոշորացումը։ /0,5 միավոր/

7-րդ դասարաս /առաջըս փուլ/							
1. Գտնել 2020x(2+0+2+0)-2020(2-0x2-0) արտահայտության արժեքը։							
1) 505	2) 4040	3)	3030	4) այլ պ	4) այլ պատասխան		
2. Միևնույն վանդակներից բաղկացած ուղղանկյունը							
կտրել են երկու մասի։ Մասերից մեկը տրված է նկարում։							
Ո՞րն է երկրորդ մասը։						Նկ.	
1)	2)		3)	4)	<u> </u>		
3. Ինչի՞ հավասար չէ 5 թիվը։							
1) 25 միավոր մակերես ունեցող քառակուսու կողմին							
0\71 1 1 1 (11(() () () 1 () 1 () ()							

- 2) Կետերի քանակին, որոնք շրջանագիծը բաժանում են 5 մասերի 3) ՖԻԶԻԿԱ բառում տարբեր տառերի քանակին
- 4) եռանկյան կողմերի, գագաթների և քառանկյան կողմերի քանակների միջին թվաբանականին
- 4. Քանի՞ տարի հետո եղբայրը երկու անգամ մեծ կլինի քրոջից, եթե նա այժմ 12 տարեկան է և քրոջից մեծ է չորս անգամ։
- 1) 4 2) 2 3) 3 4) այլ պատասխան
- 5. Վեցերորդ դասարանում սովորող Անուշն ու Լիլիթը ընկերություն են անում 1-ին դասարանից։ Նրանք նկատել են, որ ամեն տարի իրենց ծննդյան օրերը տեղի են ունենում շաբաթվա միևնույն օրը։ Անուշը ծնվել է գարնանը։ Ո՞ր ամսին չի կարող ծնված լինել Լիլիթը։
- 2) հուլիս 3) հոկտեմբեր 1) մարտ 4) հունվար Եթե 1մ կողմ ունեցող խորանարդը կտրատեն 1դմ կողմով խորանարդիկների, այնուհետև այդ խորանարդիկները դնեն իրար վրա,
- ապա ստացված «աշտարակի» բարձրությունը կլինի. 3) 10կմ 1) 100ú 2) 1կմ 4) այլ պատասխան
- 7. Արմենը եռանիշ թվի թվանշանները փոփոխում է դրանց տեղը գրելով նրա քառակուսու վերջին թվանշանը /օրինակ՝ 7-ի տեղը գրում է 9, 2-ի տեղը՝ 4/։ Ամենաքիչը քանի՞ թվանշան փոփոխելուց հետո է նա ստացել 465 թիվը, եթե հայտնի է, որ նա գոնե մեկ թվանշան փոփոխել է։



1) 1


2) 2

10. Գտնել արտահայտության արժեքը՝

անգամ։ Ի՞նչ թիվ կգրվի * վանդակում։

$$(1+\frac{1}{2})(1-\frac{1}{3})(1+\frac{1}{4})(1-\frac{1}{5})(1+\frac{1}{6})(1-\frac{1}{7})(1+\frac{1}{8})(1-\frac{1}{9})$$

11. Թվային ուղղի վրա նշված են 1/4 և 2/3 թվերը։ Ո՞ր տառով է նշված 1/2 թիվը։



1) P

2) Q

3) R

4) այլ պատասխան

12. Արմենի գնացքը ըստ չվացուցակի շարժվում է ժամը 20 անց 20 րոպեին։ Նա, կարծելով թե իր ժամացույցը 30 րոպե առաջ է, քայլում էր դեպի կալարան։ Բայց իրականում նրա ժամացույցը հետ էր մնում 20 րոպեով։ Ո՞ր ժամին նա հասավ կառամատույց և նստեց մեկ այլ գնացք, եթե նրան թվում էր, որ նա նստել է իր գնացքը և ձիշտ շարժման ժամին։


1) 1930


 $2)\ 20^{50}$

 $3)21^{00}$

4) 2110

13. A պատկերը կազմված է թղթի 4 շերտերից։ Յուրաքանչյուր շերտի երկարությունը 1սմ-ով ավել է իրենից ձախ տեղադրված շերտի երկարությունից։ B պատկերը կազմված է նույն այդպիսի 4 շերտերից՝ բայց այլ դասավորվածությամբ։ Քանի՞ սմ-ով է A պատկերի պարագիծը փոքր B պատկերի պարագծից։






В 2) 2 3) 3

հատվածի երկարությունը Գտնել AA₁A₂...A₁₀B բեկլալի երկարությունը, եթե բեկյալի

և AB հատվածի **հ**ագումից առաջացել են 5 քառակուսիներ։ A_{10}





- 1) 30 uú
- 2) 40 uú
- 3) 50 uú
- 4) 60 uú
- 15. 4 բնական թվերից յուրաքանչյուրը մեծ է 5-ից և փոքր է 9-ից։ Այդ դեպքում նրանց գումարը կարող է հավասար լինել.
- 1) 21
- 2) 22
- 3) 30
- 4) 33
- 16. Երկու դրական կոտորակների գումարը հավասար է 41/65։ Ինչի՞ է հավասար այդ կոտորակներից մեծի համարիչը, եթե նրանց հայտարարները փոքր են 65-ից։
- 17. Դասարանում անցկացվեց շախմատի առաջնություն տղաների և աղջիկների միջև։ Բոլոր տղաները խաղացին բոլոր աղջիկների հետ մեկական խաղ, ընդամենը՝ 77 խաղ։ Քանի՞ աշակերտ է սովորում այդ դասարանում։
- 18. Երկվորյակներ Արմենի և Անիի ծննդյան օրը նրանց հյուր եկան ընկերները։ Պարզվեց, որ Արմենը ծանոթ է նրանց 80%-ին, Անին 60%-ին, իսկ նրանցից վեցին ծանոթ են երկուսն էլ։ Քանի՞ հյուր էր այցելել, եթե նրանցից յուրաքանչյուրը ծանոթ էր երկվորյակներից առնվազն մեկին։
- 19. Վանդակավոր տետրի էջի վանդակները ներկված են շախմատային կարգով` սև և սպիտակ գույներով։ Այդ էջի վրա առանձնացված է քառակուսի, որը պարունակում է 25 սև գույնի վանդակ։ Քանի՞ վանդակ է տեղավորված այդ քառակուսու կողմի վրա։
- 20. Ի՞նչ թվանշանով է սկսվում ամենափոքր բնական թիվը, որի թվանշանների արտադրյայր հավասար է 120-ի։

8-րդ դասարան /առաջին փուլ/

- 1. a, b, c և d թվերն այնպիսին են, $np \ a 1 = b + 2 = c 3 = d + 4$: Ω րն է այդ թվերից ամենամեծը:
- 1) **a**
- 2) b
- 3) c
- 4) d
- 2. Uhupnid $\angle AOD = 120^{\circ}$, $\angle BOD = 3 \angle AOB$ li $\angle AOC = 2 \angle COD$:


Ինչի՞ է հավասար **∠***BOC*–ն։





քանի կողերով և մի նիստի անկյունագծերով։

Հետևյալ փովածքներից որոնք չեն կարող ստացվել։



14. Արամը մտածեց երկու նոր գործողություն

$$a \circ b = \frac{a^2 + b^2}{8} \quad \text{ls} \quad a * b = \frac{a^2 - b^2}{2} : \text{Phyh}^{\circ} \text{h huduuum} \quad (a \circ b) * (ab):$$

$$1) \frac{(a^2 + b^2)^2}{8} \qquad 2) \frac{a^4 + b^4}{8} \qquad 3) \frac{a^4 - b^4}{8} \qquad 4) \frac{(a^2 - b^2)^2}{8}$$

15. Տոմսավաձառն աշխատում է երեքշաբթի, ուրբաթ և ամսվա կենտ թվերի օրերին։ Ինչպիսի՞ ամենաշատ քանակով հաջորդող օրերի նա կարող է աշխատել։

- 16. Երբ ո բնական թիվը բարձրացրեցին չորս աստիձան, արդյունքում թիվը կրկնակի մեծացավ։ Քանի՞ անգամ կմեծանա ո թիվը, եթե այն բարձրացնեն տասը աստիձան։
- 17. Ինչի՞ է հավասար n-ր, եթե 1·2·3·...·n=2¹⁵·3⁶·5³·7²·11·13։
- 18. Ծաղկի խանութում կային 90 կարմիր, 126 սպիտակ և 60 դեղին վարդեր։ Օգտագործելով բոլոր վարդերը խանութի աշխատողը ամենաշատը քանի՞ միատեսակ փունջ կարող է հավաքել։
- 19. Գերմանացի մաթեմատիկոսներից մեկը n^2 թվականին դարձավ ո տարեկան։ Ω ր թվականին էր նա ծնվել, եթե նա մահացել է 840 թվին չապրելով մեկ դար։
- 20. Երկու մեքենաներ գնում են ասֆալտապատ ձանապարհով 80կմ/ժ արագությամբ՝ պահպանելով իրարից 24 մ հեռավորություն։ Երբ ասֆալտապատ ձանապարհից մեքենան անցում է կատարում հողային ձանապարհի, նրա արագությունը կտրուկ ընկնում է և դառնում 50 կմ/ժ։ Քանի՞ մետր կլինի մեքենաների միջև եղած հեռավորությունը հողային ձանապարհի վրա։

1. Հաշվել արտահայտության արժեքը՝

$$4,6: \left| 3 \cdot \frac{5}{9} - 1 \right| + \frac{28 + 4 \cdot \left(1, 5 \cdot \frac{3}{2} + \frac{1}{2}\right)}{1 - \frac{4}{5}}$$

- 2. Գտնել ամենափոքր բնական թիվը, որը և՛ $1\frac{7}{11}$ -ի բաժանելիս, և՛ $2\frac{4}{13}$ -ի բաժանելիս, և՛ $3\frac{3}{4}$ -ի բաժանելիս արդյունքում ստացվում է բնական թիվ։
- 3. Հետիոտնի և հեծանվորդի արագությունները հարաբերում են ինչպես 2: 7, իսկ հետիոտնի և մոտոցիկլիստի արագությունները հարաբերում են ինչպես 1: 14։ Գտնել հեծանվորդի արագությունը, եթե հայտնի է, որ մոտոցիկլիստի արագությունը հետիոտնի արագությունից մեծ է 39կմ/ժ-ով։
- **4.** Իրար կողք գրեցին 120 հաջորդական բնական թվեր, ընդհանուր առմամբ օգտագործելով 399 թվանշան։ Գտնել այդ թվերից ամենափոքրը։
- 5. Տրակտորիստը 6 օրում վարեց չորս տարբեր հողակտոր, ամեն օր աշխատելով 8ժ և վարելով նույն քանակությամբ հող։ Հայտնի է, որ առաջին, երկրորդ և երրորդ հողակտորների մակերեսները հարաբերում են ինչպես $\mathbf{1}:\frac{2}{3}:\mathbf{1}\frac{1}{3}$, իսկ չորրորդ հողակտորի մակերեսը 54հա է, որը կազմում է ամբողջ

վարած հողի 20%-ը։ Քանի՞ ժամ աշխատեց տրակտորիստը առաջին հողակտորը վարելու համար։

- 6. Տատիկն ունի 3 թոռնիկ։ Ամեն տարվա սեպտեմբերին նա իր յուրաքանչյուր դպրոցական թոռնիկին նվիրում է այնքան գիրք, որ դասարանում որ սովորում է թոռնիկը (1-ին դասարանցուն 1 գիրք, 2-րդ դասարանցուն երկու գիրք և այլն)։ Ընդհանուր առմամբ տատիկը նվիրել է 27 գիրք։ Գտնել, թե ո՞ր դասարանում է սովորում թոռնիկներից յուրաքանչյուրը (հայտնի է, որ նրանցից ոչ մի երկուսը չեն սովորում նույն դասարանում և նրանցից ոչ մեկը նույն դասարանում չի մնացել)։
- 7. Դպրոցի բակում կա երկու միատեսակ լողավազան, որոնք լցվում են երեք միատեսակ ծորակներով։ Ընդ որում երկու ծորակները միացված են առաջին լողավազանին, իսկ երրորդ ծորակը՝ երկրորդ լողավազանին։ Բոլոր ծորակները միաժամանակ բացեցին։ Այն բանից հետո, երբ լցվել էր առաջին լողավազանի 40%-ը, առաջին լողավազանը լցնող ծորակներից մեկն փակեցին և սպասեցին, մինչև լողավազանները լցվեն։ Պարզել, թե

քանի[°] ժամում լցվեց լողավազաններից յուրաքանչյուրը, եթե հայտնի է, որ առաջին լողավազանը լցվեց երկրորդ լողավազանից 7ժ ավելի շուտ։

8. Քրիստոֆեր Ռոբինը Վինի Թուխին և Դնչիկին հրավիրել էր իր տուն՝ ծննդյան օրը միասին տոնելու։ Վինի Թուխն ու Դնչիկը նախօրոք հանդիպեցին, իանութում նվեր առան և ժամը 10։45-ին միասին քայլեցին դեպի Քրիստոֆերի տուն։ Երբ անցել էին ձանապարհի քառորդ մասը, Վինի Թուխը հիշեց, որ նվերը թողել է խանութում։ Որպեսզի միասին չուշանան ու Քրիստոֆերը չանհանգստանա, նրանք որոշեցին, որ Դնչիկը կշարունակի ձանապարհը, իսկ Վինի Թուխը կվերադառնա նվերի հետևից։ Արդյունքում Դնչիկը պայմանավորված ժամից 15ր շուտ հասավ, իսկ Վինի Թուխը պայմանավորված ժամից 30ր ուշ։ Պարզել, թե ժամը քանիսի՞ն էր նրանց հրավիրել Քրիստոֆեր Ռոբինը, եթե Վինի Թուխը և Դնչիկը շարժվում են նույն արագությամբ։

8-րդ դասարան /երկրորդ փուլ/

- 1. $\left(-2\frac{2}{3}x^2y^3\right)^4\cdot \left(-2\frac{1}{4}x^3y\right)^3$ արտահայտությունը ներկայացնել կատարյալ տեսքով և գտնել ստացված միանդամի աստիձանն ու գործակիցը։
- 2. Ապացուցել, որ y=x+1, y=4-2x և y=3x-1 ուղիղներն ունեն ձիշտ մեկ ընդհանուր կետ։
- 3. Մեքենաների թողարկման պատվերը գործարանը պետք է կատարեր 16 օրում։ Օրական պլանը կատարելով 130%-ով ՝ գործարանը ժամկետից 3 օր շուտ ոչ միայն կատարեց պատվերը, այլն 9 մեքենա ավելի թողարկեց։ Օրական քանի՞ մեքենա թողարկեց գործարանը։
- 4. Շախմատային մրցաշարի մասնակիցների թվում կար երկու կին։ Մրցամարտի յուրաքանչյուր մասնակից մյուսների հետ խաղաց երկուական խաղ։ Տղամարդկանց՝ միմյանց հետ կայացած խաղերի թիվը 66-ով ավելի էր կանանց հետ անցկացրած նրանց խաղերի թվից։ Քանի՞ հոգի էին մասնակցում մրցամարտին։
- 5. Քանի՞ եղանակով է հնարավոր 1, 2, 3, ...,20 թվերից ընտրել երեքն այնպես, որ նրանց արտադրյալը բաժանվի 16-ի և չբաժանվի 32-ի։
- 6. ա) n⁴-3n²+9 արտահայտությունը վերլուծել արտադրիչների,
- բ) ո-ի ո $^{\circ}$ ր բնական արժեքների դեպքում ո 4 -3ո 2 +9 արտահայտության արժեքը պարզ թիվ է։

- 7. ABC եռանկյան B գագաթին առընթեր արտաքին անկյան կիսորդը զուգահեռ է AC կողմին։ Հայտնի է, որ ∠ABC=36⁰։ A անկյան կիսորդը BC կողմի հատում է D կետում։ Ապացուցել, որ AD=AC։
- 8. Դիցուք AF-ը ABC եռանկյան միջնագիծն է, D-ն AF-ի միջնակետը, իսկ E-ն CD ուղղի և AB կողմի հատման կետն է։ Հայտնի է, որ BD=BF և AE=5սմ։ Գտնել DE հատվածի երկարությունը։


10-րդ դասարան Մաթեմատիկա

- 1. Լուծել համակարգը՝ $\begin{cases} (x-2)(y-5) = 0 \\ x^4 2y^2 = 14 \end{cases}$
- 2. Գտնել $y = ax^2 + bx + c$ պարաբոլի հավասարումը, եթե հայտնի է, որ այն անցնում է A(-1,5) կետով և նրա գագաթը B(1,1) կետն է։
- 3. Օդանավակայանից դուրս եկավ ինքնաթիռն ու շարժվեց դեպի հարավ։ Մեկ ժամ անց նույն օդանավակայանից մեկ այլ ինքնաթիռ շարժվեց դեպի արևմուտք։ Երկրորդ ինքնաթիռի շարժվելուց 2 ժամ անց ինքնաթիռների միջն հեռավորությունը 2400կմ էր։ Գտնել ինքնաթիռների արագությունները, եթե հայտնի է, որ առաջին ինքնաթիռի արագությունը հարաբերում է երկրորդ ինքնաթիռի արագությանը ինչպես 8 ։ 9:
- 4. Երկու տակառ պարունակում են ջրի և սպիրտի խառնուրդ։ Առաջին տակառում ջուրն ու սպիրտը հարաբերում են ինչպես 5։2, իսկ երկրորդ տակառում հարաբերում են ինչպես 4։5։ Այդ տակառներից ի՞նչ հարաբերությամբ լուծույթներ է պետք խառնել, որպեսզի ստացված խառնուրդում ջրի և սպիրտի քանակները հարաբերեն ինչպես 4։3։
- 5. Դիցուք x_1 և x_2 թվերը $2x^2-2x-7=0$ հավասարման արմատներն են։ Կազմել քառակուսի հավասարում, որի արմատները կլինեն x_1+2x_2 և x_1+1 թվերը։
- 6. Գտնել բոլոր հնարավոր A բնական թվերը, որոնց համար $\overline{2A1}:\overline{1A2}=21:12$,

- որտեղ վերևի գրած գծիկը նշանակում է, որ թվերն իրար կցագրած են։
- 7. Դիցուք ABCD սեղանի հիմքերի երկարություններն են 3սմ և 5սմ, իսկ անկյունագծերը կազմում են 60 աստիձանի անկյուն։ Գտնել անկյունագծերից մեկի երկարությունը, եթե հայտնի է, որ մյուս անկյունագծի երկարությունը 8սմ է։
- 8. Դիցուք $AB=CD=4\sqrt{3}$ սրունքներով ABCD հավասարասրուն սեղանին ներգծված է 3 շառավորվ շրջանագիծ։ Գտնել՝
 - ա) ABCD սեղանին արտագծած շրջանագծի շառավիղը,
 - r) ABCD սեղանին արտագծած և ներգծած շրջանագծերի կենտրոնների հեռավորությունը։

Ֆիզիկա *Թեսթային առաջադրանքներ*

1. Նկարում պատկերված շշի բերանը ամուր փակող խցանի միջով իջեցված է երկու ծայրը բաց ապակյա խողովակ։ Շշի հատակին և խողովակի մեջ ջուր կա։ Ինչպե՞ս կփոխվի ջրի մակարդակը խողովակում, եթե մթնոլորտային Ճնշումը փոքրանա. /1 միավոր/



- 1) կիջնի,
- 2) չի փոխվի,
- 3) կբարձրանա,
- 4) ամբողջ ջուրը դուրս կգա և կթափվի։
- 2. Նկարում պատկերված են միևնույն զանգվածներով մարմինների արագության ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկները։ Ω ր մարմնի վրա ազդող համազոր ուժն է ավելի մեծ. /1 միավոր/



- 1) առաջին,
- 2) երկրորդ,
- 3) հավասար են,
- 4) գրաֆիկից հնարավոր չէ որոշել։
- 3. Ո՞րն է ձիշտ շարունակությունը։ /1 միավոր/

Հալման ընթացում բյուրեղային մարմնի ...

- 1) և՛ ներքին էներգիան, և՛ ջերմաստիձանն աձում են,
- 2) և՛ ներքին էներգիան, և՛ ջերմաստիձանը մնում են անփոփոխ,
- 3) ջերմաստիձանն աձում է, իսկ ներքին էներգիան մնում է անփոփոխ,


- 4) ներքին էներգիան մեծանում է, իսկ ջերմաստիձանը մնում է անփոփոխ։
- 4. Դրականապես լիցքավորված մետաղե գունդը պղնձե լարով միացրել են նույնատիպ չեզոք գնդի։ Ի՞նչ մասնիկներ կտեղափոխվեն լարով.

/1 միավոր/

- 1) պրոտոններ,
- 2) նեյտրոններ,
- 3) էլեկտրոններ,
- 4) էլեկտրոններ և պրոտոններ
- 5. Ուղղագիծ հոսանքակիր հաղորդչին մոտ գտնվող մագնիսական սլաքը շրջվեց 180°-ով։ Ինչի՞ հետևանքով դա տեղի ունեցավ. /1 միավոր/
- 1) մագնիսական սլաքն ապամագնիսացավ,
- 2) մագնիսական սլաքը գերմագնիսացավ,
- 3) հաղորդալարում փոփոխվեց հոսանքի ուժի արժեքը,
- 4) հաղորդալարում փոփոխվեց հոսանքի ուժի ուղղությունը։
- 6. Աղջիկը հարթ հայելու մեջ տեսավ տղայի աչքերը։ Կտեսնի՞ արդյոք տղան աղջկա աչքերը. /1 միավոր/
- 1) n´չ, չի տեսնի,
- 2) այո՛, միանշանակ կտեսնի,
- 3) կախված է այն բանից, թե ինչ պայմաններում է (մո՞ւթ, թե՞ լուսավոր) գտնվում տղան,
- 4) կախված է այն բանից, թե ինչ պայմաններում է (մո՞ւթ, թե՞ լուսավոր) գտնվում աղջիկը։

Որակական հարցեր

7. Ո՞ր կողմ է ուղղված սայլակի հետ շարժվող չորսուի վրա ազդող շփման ուժը հետևյալ երկու դեպքերում. /1 միավոր/ա/ սայլակը շարժվում է արագանալով,




բ/սայլակը շարժվում է ուղղագիծ և հավասարաչափ։

Պատասխանը հիմնավորե՛ք։

8.Միևնույն H բարձրությունից նետում են երեք մարմին միևնույն V_0 սկզբնական արագություններով. առաջինը՝ դեպի վեր, երկրորդը՝ դեպի ներքև, երրորդը՝ հորիզոնական ուղղությամբ։ Ո՞ր մարմինը կհարվածի գետնին ավելի մեծ արագությամբ։ Դիմադրության ուժերն անտեսեք։ Պատասխանը հիմնավորե՛ք։ /1 միավոր/

9.Նկարում պատկերված սխեմայում լամպերն ունեն նույն դիմադրությունը։ Ինչպե՞ս կփոխվեն 1 և 2 լամպերի պայծառությունները, երբ 3 լամպի պարուրակը կտրվի։ Շղթայի սեղմակների միջև



լարումը հաստատուն է։ Պատասխանը հիմնավորե $\mathbf{\hat{p}}$ ։ /1 միավոր/

10. Նկարում ցույց են տրված AB առարկայի և CD հայելու դիրքերը։ Կառուցումով ցույց տվեք այն տիրույթը, որտեղից կերևա հայելում առարկայի պատկերն ամբողջությամբ։ /1 միավոր/



Խնդիրներ

11. Երբ 20 մ/վ հաստատուն արագությամբ շարժվող ավտոմեքենան անցավ կանգնած մոտոցիկլի մոտով, վերջինս սկսեց շարժվել 2 մ/վ 2 արագացումով։

ա/ Կառուցեք երկու մարմինների արագության` ժամանակից կախվածության գրաֆիկներն այն պահից սկսած, երբ ավտոմեքենան անցավ մոտոցիկլի մոտով։ /0.5 միավոր/

բ/ Այդ պահից ինչքա՞ն ժամանակ հետո մոտոցիկլը հասավ մեքենային։ /0.5 միավոր/

գ/ Այդ պահից սկսած ինչքա՞ն ժամանակ հետո է մարմինների հեռավորությունը եղել 75 մ։ /1 միավոր/

12. Լմում ջրի մակերևույթին լողում է 500 կգ/մ 3 խտությամբ փայտե չորսու։ Ջրի խտությունը համարեք 1000 կգ/մ 3 :

ա/ Չորսուի ծավալի n° ր մասն է սուզված ջրում։ /0.5 միավոր/

բ/ Գտեք չորսուն ջրի տակ սուզված պահելու համար անհրաժեշտ ուժի և չորսուի ծանրության ուժի հարաբերությունը։ /0.5 միավոր/



- q/ Ո՞ր դեպքում ավելի շատ աշխատանք կկատարվի. երբ չորսուն դանդաղ բարձրացնենք այնքան, որ նրա ստորին եզրը հպվի ջրի մակերևույթին, թե՞ երբ չորսուն դանդաղ իջեցնենք այնքան, որ չորսուի վերին եզրը հասնի ջրի մակերևույթին։ /1 միավոր/
- 13. $m_1=2$ կգ և $m_2=3$ կգ զանգվածներով երկու բեռ միացված են իրար զսպանակով։ Երբ համակարգը կախված է վերևի բեռից, զսպանակի երկարությունը $l_1=0,5$ մ է։ Համակարգը պատվանդանին դնելու դեպքում զսպանակի երկարությունը դառնում է $l_2=0,3$ մ։

ա/ Որքա՞ն է զսպանակի առաձգականության ուժերի հարաբերությունը առաջին և երկրորդ դեպքերում։

/0.5 միավոր/

բ/ Որքա՞ն է զսպանակի երկարությունը չձևափոխված վիձակում։

/1 միավոր/

գ/ Որքա՞ն է զսպանակի կոշտությունը։ /0.5 միավոր/

14. 10 գ 0°C ջերմաստիձանի սառույց պարունակող կալորաչափի մեջ լցնում են 20°C ջերմաստիձանի ջուր։ Ջրի տեսակարար ջերմունակությունը՝ 4200 Ջ/կգ.°C, սառույցի հալման տեսակարար ջերմությունը՝ 340000 Ջ/կգ։ Կալորաչափի ջերմունակությունն ու ջերմային կորուստներն անտեսեք։

ա/Ի՞նչ նվազագույն զանգվածով ջուր պետք է լցնել կալորաչափի մեջ սառույցն ամբողջությամբ հայեցնելու համար։ /0.5 միավոր/


r/ Ստացեք կալորաչափի պարունակության վերջնական ջերմաստիձանի՝ լցված ջրի զանգվածից կախվածության բանաձևը։

/1 միավոր/

գ/ Կառուցեք կալորաչափի պարունակության վերջնական ջերմաստիձանի՝ լցված ջրի զանգվածից կախվածության որակական գրաֆիկը։ /0.5 միավոր/

15. Բանալու բաց և փակ դիրքերում շղթայի AB տեղամասում անջատվում է նույն հզորությունը։ Աղբյուրի լարումը հաստատուն է, R_0 =30 Oմ։

ա/ Ինչքա՞ն է հոսանքի ուժերի հարաբերությունը շղթայում՝ բանալու բաց և փակ դիրքերում։ /1 միավոր/ բ/ Ինչքա՞ն է R_x դիմադրությունը։ /1 միավոր/



2020թ.

7-րդ դասարան Տարբերան 1

- **Տարբերակ 1** 1. Հաշվել արտահայտության արժեքը` $2\frac{3}{5} \cdot 0.7 \left|-1.3:(-3\frac{1}{4}) 4.8\right|$ ։
- 2. Երկրաչափական պատկերը կազմված է սեղանի վրա դրված 10սմ կողմով խորանարդիկներից /տես նկ./։ Հայտնի է, որ 1կգ ներկով կարելի է ներկել 9 մ² մակերևույթ։ Քանի՞ գրամ ներկ է հարկավոր տվյալ պատկերի մակերևույթը ներկելու համար։ (Մեղանի հետ շփման մակերևույթը հնարավոր չէ ներկել)։



- 3. Երկու ամաններից յուրաքանչյուրը պարունակում է սպիրտի լուծույթ։ Երբ առաջին ամանի լուծույթի ½-ը լցրեցին երկրորդ ամանի մեջ, ապա երկրորդ ամանում ստացվեց 240գ լուծույթ։ Ստացված լուծույթում սպիրտի և ջրի քանակները հարաբերում են իրար այնպես, ինչպես 1։3։ Առաջին ամանում մնաց 120գ 70%-անոց լուծույթ։ Քանի՞ տոկոսանոց էր երկրորդ ամանի սկզբնական լուծույթը։
- 4. Ավտոբուսում գտնվող ուղևորը պատուհանից նկատեց նույն ուղղությամբ ոտքով քայլող ընկերոջը։ Ընկերոջը նկատելուց ուղիղ 3 րոպե հետո նա կանգառում իջավ և ոտքով շարժվեց ընկերոջն ընդառաջ։ Ավտոբուսից իջնելուց քանի՞ րոպե հետո ուղևորը կհասնի ընկերոջը, եթե նա շարժվում է ընկերոջից 40% ավել արագությամբ, իսկ ավտոբուսից՝ 7 անգամ դանդաղ։
- 5. 711 և 595 թվերը միևնույն բնական թվի վրա բաժանելիս ստացվում են համապատասխանաբար 11 և 7 մնացորդներ։ Գտնել բաժանարարի հնարավոր արժեքները։
- 6. Եռանիշ թիվը և նրա թվանշանների տեղափոխումից ստացված թվերը 7-ի բաժանելիս ստացվում են 1,2,3,4,5,6 մնացորդները։ Գտնել այդպիսի ամենափոքր թվի պարզ բաժանարարների գումարը։
- 7. Քանի՞ վեցանիշ թիվ կա, որոնք բաժանվում են 9-ի և որոնց գրառման մեջ միաժամանակ մասնակցում են միայն 0, 2 և 3 թվանշանները։
- 8. Հնարավո $^{\circ}$ ր է արդյոք 15x15 չափսերով քառակուսու 225 վանդակներից յուրաքանչյուրում մեկական տեղադրել 1, 2 և 3 թվերն այնպես, որ բոլոր

տողերում, բոլոր սյուներում և երկու մեծ անկյունագծերում եղած թվերի գումարները լինեն իրարից տարբեր։

- **Տարբերակ 2** 1. Հաշվել արտահայտության արժեքը` $3\frac{2}{5}\cdot 0,9-\left|-1,7:(-4\frac{1}{4})-5,7\right|$ ։
- 2. Երկրաչափական պատկերը կազմված է սեղանի վրա դրված 10սմ կողմով խորանարդիկներից /տես նկ./։ Հայտնի է, որ 1կգ ներկով կարելի է ներկել 11 մ² մակերևույթ։ Քանի՞ գրամ ներկ է հարկավոր տվյալ պատկերի մակերևույթը ներկելու համար։ (Մեղանի հետ շփման մակերևույթը հնարավոր չէ ներկել)։



- 3. Երկու ամաններից յուրաքանչյուրը պարունակում է սպիրտի լուծույթ։ Երբ առաջին ամանի լուծույթի $\frac{1}{4}$ -ը լցրեցին երկրորդ ամանի մեջ, ապա երկրորդ ամանում ստացվեց 230գ լուծույթ։ Ստացված լուծույթում սպիրտի և ջրի քանակները հարաբերում են իրար այնպես, ինչպես 1:4: Առաջին ամանում մնաց 90գ 80%-անոց լուծույթ։ Քանի՞ տոկոսանոց էր երկրորդ ամանի սկզբնական լուծույթը։
- 4. Ավտոբուսում գտնվող ուղևորը պատուհանից նկատեց հակառակ ուղղությամբ ոտքով քայլող ընկերոջը։ Ընկերոջը նկատելուց ուղիղ 2 րոպե հետո նա կանգառում իջավ և ոտքով շարժվեց ընկերոջ հետևից։ Ավտոբուսից իջնելուց քանի՞ րոպե հետո ուղևորը կհասնի ընկերոջը, եթե շարժվում է ընկերոջից 2 անգամ արագ, իսկ ավտոբուսի արագությունից 75%-ով դանդաղ։
- 5. 515 և 535 թվերը միևնույն բնական թվի վրա բաժանելիս ստացվում են համապատասխանաբար 11 և 7 մնացորդներ։ Գտնել բաժանարարի հնարավոր արժեքները։
- 6. Եռանիշ թիվը և նրա թվանշանների տեղափոխումից ստացված թվերը 7-ի բաժանելիս ստացվում են 1,2,3,4,5,6 մնացորդները։ Գտնել ալդպիսի ամենափոքր թվի պարզ բաժանարարների արտադրյայր։
- 7. Քանի՞ վեցանիշ թիվ կա, որոնք բաժանվում են 9-ի և որոնց գրառման մեջ միաժամանակ մասնակցում են միայն 0, 1 և 3 թվանշանները։

8. Հնարավո՞ր է արդյոք 17x17 չափսերով քառակուսու 289 վանդակներից յուրաքանչյուրում մեկական տեղադրել 1, 2 և 3 թվերն այնպես, որ բոլոր տողերում, բոլոր սյուներում և երկու մեծ անկյունագծերում եղած թվերի գումարները լինեն իրարից տարբեր։

8-րդ դասարան Տարբերակ 1


- 1. Գտնել p³-8q³ արտահայտության արժեքը, եթե p-2q=10 և pq=40։
- 2. $4a^4 5a^2 4a 3$ բազմանդամը ներկայացնել երկու երկրորդ աստիձանի բազմանդամների արտադրյալի տեսքով։
- 3. Քանի[°] միավոր աջ կամ ձախ պետք է զուգահեռ տեղափոխել y=3x ֆունկցիայի գրաֆիկը y= 3x+12 ֆունկցիայի գրաֆիկը ստանալու համար։
- 4. Դիմորդների որոշակի խումբ ընդունելության քննության համար քննություն հանձնեց մաթեմատիկայից, ֆիզիկայից և հայոց լեզվից։ Քննությունից քսան միավոր ստացան՝ մաթեմատիկայից 96 դիմորդ, ֆիզիկայից՝ 74 դիմորդ, հայոց լեզվից՝ 84 դիմորդ։ Ընդ որում մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի քննություններից գոնե մեկից քսան միավոր ստացան 150 դիմորդ, մաթեմատիկայի և հայոց լեզվի քննություններից գոնե մեկից՝ 152 դիմորդ, ֆիզիկա և հայոց լեզվի քննություններից գոնե մեկից՝ 132 դիմորդ, իսկ բոլոր երեք քննություններից քսան միավոր ստացան 8 դիմորդ։ Քանի՞ դիմորդ ստացավ քսան միավոր ձիշտ մեկ առարկայի քննությունից։
- 5. 160 հա մակերեսով դաշտը վարելու համար 4 օր աշխատեց միևնույն հզորությամբ տրակտորների մի խումբ։ Այնուհետև նրանց միացավ նույն հզորությամն ևս մեկ տրակտոր, որի շնորհիվ խմբի արտադրողականությունը մեծացավ $16\frac{2}{3}\%$ -ով, և աշխատելով ևս 8 օր նրանք ավարտեցին աշխատանքը։ Քանի՞ հեկտար վարեցին տրակտորները առաջին վեց օրվա ընթացքում։
- 6. Քանի[°] ձևով է հնարավոր 6930 թիվը ներկայացնել երկու փոխադարձաբար պարզ թվերի արտադրյալի տեսքով։ (x·y և y·x ներկայացման ձևերը համարել նույնը)։

Հիշեցում։ Երկու բնական թվեր համարվում են փոխադարձաբար պարզ, եթե նրանք չունեն 1 թվից տարբեր այլ ընդհանուր բաժանարար։ Օրինակ՝ 15-ր և 28-ր ։

7. Օ-ն շրջանագծի կենտրոնն է։ Հայտնի է, որ OR=QP, ∠AOR=60⁰:

Գտնել ∠APR-ը։ (Տես նկարը)։

8. AM-ը ABC եռանկյան միջնագիծն է։ Գտնել BAM անկյան աստիճանային չափը, եթե ∠ABC=1050 և ∠ACB=300։




Տարբերակ 2

- 1. Գտնել p³-27q³ արտահայտության արժեքը, եթե p-3q=10 և pq=60:
- 2. $4a^4 5a^2 + 4a 3$ բազմանդամը ներկայացնել երկու երկրորդ աստի Δ անի բազմանդամների արտադրյալի տեսքով։
- 3. Քանի՞ միավոր աջ կամ ձախ պետք է զուգահեռ տեղափոխել y=4x ֆունկցիայի գրաֆիկը y= 4x-12 ֆունկցիայի գրաֆիկը ստանալու համար։
- 4. Դիմորդների որոշակի խումբ ընդունելության քննության համար քննություն հանձնեց մաթեմատիկայից, ֆիզիկայից և հայոց լեզվից։ Քննությունից քսան միավոր ստացան՝ մաթեմատիկայից 92 դիմորդ, ֆիզիկայից՝ 73 դիմորդ, հայոց լեզվից՝ 82 դիմորդ։ Ընդ որում մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի քննություններից գոնե մեկից քսան միավոր ստացան 145 դիմորդ, մաթեմատիկայի և հայոց լեզվի քննություններից գոնե մեկից՝ 146 դիմորդ, ֆիզիկա և հայոց լեզվի քննություններից գոնե մեկից՝ 129 դիմորդ, իսկ բոլոր երեք քննություններից քսան միավոր ստացան 8 դիմորդ։ Քանի՞ դիմորդ ստացավ քսան միավոր ձիշտ մեկ առարկայի քննությունից։
- 5. 150 հա մակերեսով դաշտը վարելու համար 4 օր աշխատեց միևնույն հզորությամբ տրակտորների մի խումբ։ Այնուհետև նրանց միացավ նույն հզորությամն ևս մեկ տրակտոր, որի շնորհիվ խմբի արտադրողականությունը մեծացավ 20%-ով, և աշխատելով ևս 5 օր նրանք ավարտեցին աշխատանքը։ Քանի՞ հեկտար վարեցին տրակտորները առաջին վեց օրվա ընթացքում։
- 6. Քանի[°] ձևով է հնարավոր 5460 թիվը ներկայացնել երկու փոխադարձաբար պարզ թվերի արտադրյալի տեսքով։ (x·y և y·x ներկայացման ձևերը համարել նույնը)։

Հիշեցում։ Երկու բնական թվեր համարվում են փոխադարձաբար պարզ, եթե նրանք չունեն 1 թվից տարբեր այլ ընդհանուր բաժանարար։ Օրինակ՝ 15-ր և 28-ր ։

7. Օ-ն շրջանագծի կենտրոնն է։ Հայտնի է, որ OR=QP, ∠AOR=45º։ Գտնել ∠APR-ը։ (Տես նկարը)։

8. AM-ը ABC եռանկյան միջնագիծն է։ Գտնել BAM անկյան աստիձանային չափր, եթե \angle ABC=15^o և \angle ACB=30^o:



Մաթեմատիկա-10 Տարբերակ 1

1. Նշել **a**-ի ի՞նչ արժեքների դեպքում արտահայտությունն իմաստ ունի և պարզեցնել այն.

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2a+1}} - \frac{1}{\sqrt{2a-1}}\right) \cdot \frac{\sqrt{2a+1}\sqrt{4a^2-1}}{(2a-1)\sqrt{2a+1}-(2a+1)\sqrt{2a-1}}:$$

- 2. Հայտնի է, որ $x^2 5x + a = 0$ հավասարման արմատները 1-ով փոքր են $x^2 7x + 3a 6 = 0$ հավասարման արմատներից։ Գտնել a թիվը և յուրաքանչյուր հավասարման արմատները։
- 3. A կետից նույն ուղղությամբ միաժամանակ շարժվում են երկու մարմին, որոնցից առաջինը 15մ/վ հաստատուն արագությամբ։ Երկրորդ մարմինը առաջին վայրկյանում անցնում է 5մ, իսկ յուրաքանչյուր հաջորդ վայրկյանում 2մ ավելի, քան նախորդում։ Քանի՞ վայրկյան հետո մարմինները կհանդիպեն, եթե հայտնի է, որ այդ ժամանակը արտահայտվում է բնական թվով։

4. Լուծել համախումբը.
$$\begin{bmatrix} \frac{x-5}{|x-1|-4} = 1 \\ \sqrt{x-5} \le 1 \end{bmatrix}$$

- 5. Ոչ զրոյական և իրարից տարբեր թվանշաններով գրվող եռանիշ թվի և նրա թվանշանների տեղափոխումից ստացված բոլոր եռանիշ թվերի գումարը հավասար է 2220։ Գտնել այդպիսի եռանիշ թվերի քանակը։
- 6. 63սմ պարագծով ABC եռանկյան AD կիսորդը BC կողմը բաժանում է BD=6սմ և DC=8սմ երկարությամբ մասերի։ D կետից AC կողմին տարված զուգահեռ ուղիղը AB կողմը հատում է E կետում։ Գտնել DE հատվածի երկարությունը։
- 7. Շրջանագծից դուրս գտնվող A կետից շրջանագծին տարված են AB շոշափողը և AM հատողը, որի արտաքին մասը AC-ն է։ Հայտնի է, որ AM=3-AC, AB=6սմ, իսկ $\angle BAM = 30$ $^{\circ}$ ։ Գտնել BM հատվածի երկարությունը։

Տարբերակ 2

1. Նշել \mathbf{a} -ի ի՞նչ արժեքների դեպքում արտահայտությունն իմաստ ունի և պարզեցնել այն.

$$\left(\frac{1}{\sqrt{3a+1}} - \frac{1}{\sqrt{3a-1}}\right) \cdot \frac{\sqrt{3a+1}\sqrt{9a^2-1}}{(3a-1)\sqrt{3a+1} - (3a+1)\sqrt{3a-1}}:$$

- 2. Հայտնի է, որ $x^2-7x+a=0$ հավասարման արմատները 1-ով փոքր են $x^2-9x+4a-7=0$ հավասարման արմատներից։ Գտնել a թիվը և յուրաքանչյուր հավասարման արմատները։
- 3. A կետից նույն ուղղությամբ միաժամանակ շարժվում են երկու մարմին, որոնցից առաջինը 17մ/վ հաստատուն արագությամբ։ Երկրորդ մարմինը առաջին վայրկյանում անցնում է 6մ, իսկ յուրաքանչյուր հաջորդ վայրկյանում 2մ ավելի, քան նախորդում։ Քանի՞ վայրկյան հետո մարմինները կհանդիպեն, եթե հայտնի է, որ այդ ժամանակը արտահայտվում է բնական թվով։

սարարսակը գուտու և արտահայտվում է բնական թվով։ 4. Լուծել համախումբը. $\begin{bmatrix} \frac{x+7}{|x+1|-6} = -1 \\ \sqrt{x+16} \le 3 \end{bmatrix}$

- 5. Ոչ զրոյական և իրարից տարբեր թվանշաններով գրվող եռանիշ թվի և նրա թվանշանների տեղափոխումից ստացված բոլոր եռանիշ թվերի գումարը հավասար է 2442։ Գտնել այդպիսի եռանիշ թվերի քանակը։
- 6. 65սմ պարագծով ABC եռանկյան AD կիսորդը BC կողմը բաժանում է BD=6սմ և DC=9սմ երկարությամբ մասերի։ D կետից AC կողմին տարված զուգահեռ ուղիղը AB կողմը հատում է E կետում։ Գտնել DE հատվածի երկարությունը։
- 7. Շրջանագծից դուրս գտնվող A կետից շրջանագծին տարված են AB շոշափողը և AM հատողը, որի արտաքին մասը AC-ն է։ Հայտնի է, որ AM=3·AC, AB=9սմ, իսկ $\angle BAM = 30^\circ$ ։ Գտնել BM հատվածի երկարությունը։

ՖԻԶԻԿԱ-10 Տարբերակ 1

1. Մրցման ժամանակ մի մարմինը մեկնարկում է մյուսից 10 վ հետո։

ա/ Առաջինի շարժումը սկսելուց ինչքա՞ն ժամանակ հետո նրանց հեռավորությունը կլինի 40 մ, եթե մարմինները շարժվում են դադարի վիձակից՝ նույն 0,2 մ/վ 2 արագացումով։ /1 միավոր/

r/ Կհասցնի՞ արդյոք երկրորդ մարմինը հասնել առաջինին մինչև եզրագծին հասնելը, եթե մրցուղու երկարությունը 100 մ է, առաջինը մեկնարկում է դադարի վիճակից 0,2 u/d^2 արագացումով, իսկ երկրորդը՝ 0,4 u/d^2 արագացումով։ /1 միավոր/

գ/ Ի՞նչ նվազագույն արագացումով պետք է մեկնարկի երկրորդ մարմինը, որպեսզի հասնի առաջինին՝ մինչև վերջինս կհատի եզրագիծը, եթե մրցուղու երկարությունը 100 մ է, և առաջինը մեկնարկում է դադարի վիձակից 0.2 մ/վ² արագացումով։ /0.5 միավոր/

2. Նույն ρ խտությամբ նյութից պատրաստված V₁ ու V₂ ծավալներով երկու գնդիկ կախված են ℓ երկարությամբ անկշիռ լծակի ծայրերից։ Լծակը գտնվում է հավասարակշռության վիձակում։



ա/ Առաջին գնդից ի՞նչ հեռավորության վրա է գտնվում հենարանը։ /0.5 միավոր/


բ/ Առաջին գնդիկն իջեցնում են ρ₀ խտությամբ հեղուկի մեջ։ Ինչքանո՞վ պետք է տեղաշարժել հենարանը՝ լծակի հավասարակշռությունը վերականգնելու համար։ /1 միավոր/



գ/ Կխախտվի՞ արդյոք լծակի հավասարակշռությունը (ա/ կետում նշված), եթե երկու գնդիկն էլ միաժամանակ իջեցնեն ρ₀ խտությամբ հեղուկի մեջ։ Պատասխանը հիմնավորեթ հաշվարկով։ /1 միավոր/

3. Մեղանի հորիզոնական, ողորկ մակերևույթին դրված են անկշիռ թելով կապված երկու մարմին։ Երբ թելի երկայքով ուղղված F=20 Ն ուժով

ազդում են երկրորդ մարմնի վրա, թելի լարման ուժը լինում է T₁=8 Ե (տե՛ս նկ.)։



ա/Ինչքա՞ն է m²/m1 հարաբերությունը։ /1 միավոր/

ր/ Ինչքա՞ն կլինի թելի լարման ուժը, երբ F=20 U ուժն ազդի առաջին մարմնի վրա։ 1 միավոր/

գ/ Ի՞նչ առավելագույն ուժով կարելի է ազդել առաջին մարմնի վրա՝ նկարում պատկերված ուղղությամբ, եթե թելը դիմանում է $T_{\text{un}}=15$ Ն առավելագույն լարման ուժին։ /0,5 միավոր/

4.Կալորաչափում կա m $_{\odot}$ 4 կգ զանգվածով սառույց։ Սառույցի վրա m $_{\odot}$ 5 կգ ջուր ավելացնելիս սառույցի զանգվածը չի փոխվում, իսկ m $_{\odot}$ 1 կգ նույն ջրից ավելացնելիս սառույցի զանգվածը պակասում է m $_{\odot}$ 0,1 կգ-ով։ Սառույցի տեսակարար ջերմունակությունը 2100 $_{\odot}$ 0, ջրի

տեսակարար ջերմունակությունը՝ 4200 Ջ/կգ.°C, սառույցի հալման տեսակարար ջերմությունը՝ 340000 Ջ/կգ։ Կալորաչափի ջեմունակությունն անտեսել։

ա/ Որոշե՛ք ջրի սկզբնական ջերմաստիձանը։ /1 միավոր/ բ/ Որոշեք սառույցի սկզբնական ջերմաստիձանը։ /0,5 միավոր/ գ/ Ինչքա՞ն առավելագույն զանգվածով ջուր լցնելու դեպքում սառույցի զանգվածր կավելանա լցրած ջրի զանգվածի չափով։ /1 միավոր/

5. Նկարում պատկերված սխեմայում ամպերաչափն իդեալական է։

ա/ Քանի՞ անգամ կմեծանա ամպերաչափի ցուցմունքը շղթայի K բանալին փակելուց հետո։ Շղթայի սեղմակներին լարումը չի փոխվում։ /1 միավոր/

բ/ Բանալու փոխարեն միացնում են ևս մեկ իդեալական ամպերաչափ։ Ինչքա՞ն կլինի ամպերաչափերի ցուցմունքների հարաբերությունը։ /1,5 միավոր/

Տարբերակ 2

1. Մրցման ժամանակ մի մարմինը մեկնարկում է մյուսից 10 վ հետո։

ա/ Առաջինի շարժումը սկսելուց ինչքա՞ն ժամանակ հետո նրանց հեռավորությունը կլինի 40 մ, եթե մարմինները շարժվում են դադարի վիճակից՝ նույն 0,2 մ/վ² արագացումով։ /1 միավոր/

բ/ Կհասցնի[°] արդյոք երկրորդ մարմինը հասնել առաջինին մինչև եզրագծին հասնելը, եթե մրցուղու երկարությունը 100 մ է, առաջինը մեկնարկում է դադարի վիձակից 0,2մ/վ² արագացումով, իսկ երկրորդը՝ 0,4 մ/վ² արագացումով։ /1 միավոր/

գ/ Ի՞նչ նվազագույն արագացումով պետք է մեկնարկի երկրորդ մարմինը, որպեսզի հասնի առաջինին՝ մինչև վերջինս կհատի եզրագիծը, եթե մրցուղու երկարությունը 100 մ է, և առաջինը մեկնարկում է դադարի վիճակից 0.2 մ/վ 2 արագացումով։ /0.5 միավոր/

2. Նույն ρ խտությամբ նյութից պատրաստված V₁ ու V₂ ծավալներով երկու գնդիկ կախված են ℓ երկարությամբ անկշիռ լծակի ծայրերից։ Լծակը գտնվում է հավասարակշռության վիձակում։



ա/ Առաջին գնդից ի՞նչ հեռավորության վրա է գտնվում հենարանը։ /0,5 միավոր/


բ/ Առաջին գնդիկն իջեցնում են թ₀ խտությամբ հեղուկի մեջ։ Ինչքանո՞վ պետք է տեղաշարժել հենարանը՝ լծակի հավասարակշռությունը վերականգնելու համար։ /1 միավոր/

ıp:

գ/ Կխախտվի՞ արդյոք լծակի հավասարակշռությունը (ա/ կետում նշված), եթե երկու գնդիկն էլ միաժամանակ իջեցնեն po խտությամբ հեղուկի մեջ։ Պատասխանը հիմնավորեք հաշվարկով։ /1 միավոր/

3. Մեղանի հորիզոնական, ողորկ մակերնույթին դրված են անկշիռ թելով կապված երկու մարմին։ Երբ թելի երկայքով ուղղված F=20 Ն ուժով ացում են երկրորո

ազդում են երկրորդ մարմնի վրա, թելի լարման ուժը լինում է T₁=8 Ն (տե՛ս նկ.)։



ա/Ինչքա՞ն է m²/mւ հարաբերությունը։ /1 միավոր/

ր/ Ինչքա՞ն կլինի թելի լարման ուժը, երբ F=20 U ուժն ազդի առաջին մարմնի վրա։ 1 միավոր/


գ/ Ի՞նչ առավելագույն ուժով կարելի է ազդել առաջին մարմնի վրա՝ նկարում պատկերված ուղղությամբ, եթե թելը դիմանում է Tաո=15 Ն առավելագույն լարման ուժին։ /0,5 միավոր/

4. Կալորաչափում կա m₀=4 կգ զանգվածով սառույց։ Սառույցի վրա m₁=0,5 կգ ջուր ավելացնելիս սառույցի զանգվածը չի փոխվում, իսկ m₂=1 կգ նույն ջրից ավելացնելիս սառույցի զանգվածը պակասում է m´=0,1 կգ-ով։ Սառույցի տեսակարար ջերմունակությունը՝ 2100 Ձ/կգ.օС, ջրի տեսակարար ջերմունակությունը՝ 4200 Ձ/կգ.օС, սառույցի հալման տեսակարար ջերմությունը՝ 340000 Ձ/կգ։ Կալորաչափի ջեմունակությունն անտեսել։

ա/ Որոշե՛ք ջրի սկզբնական ջերմաստիձանը։ /1 միավոր/ բ/ Որոշեք սառույցի սկզբնական ջերմաստիձանը։ /0,5 միավոր/ գ/ Ինչքա՞ն առավելագույն զանգվածով ջուր լցնելու դեպքում սառույցի զանգվածր կավելանա լցրած ջրի զանգվածի չափով։ /1 միավոր/

5. Նկարում պատկերված սխեմայում ամպերաչափն իդեալական է։

ա/ Քանի՞ անգամ կմեծանա ամպերաչափի ցուցմունքը շղթայի K բանալին փակելուց հետո։ Շղթայի սեղմակներին լարումը չի փոխվում։ հետո։ Շղթայի սեղմակներին լարումը չի փոխվում։ /1 միավոր/



r/ Բանալու փոխարեն միացնում են ևս մեկ իդեալական ամպերաչափ։ Ինչքա՞ն կլինի ամպերաչափերի ցուցմունքների հարաբերությունը։ /1,5 միավոր/