Retard mental

Le chakra coronal, le chakra frontal, l'ajna, le chakra mineur dc la nuque et le chakra de la gorge sont grisâtres et hypo actifs. Le chakra de base et le chakra du sexe sont affectés et doivent être traités car les chakras supérieurs nécessitent et utilisent l'énergie transmutée du chakra de base et du chakra du sexe.

1. Faites le sondage du patient, puis répétez le durant le traitement.

2. Appliquez deux fois le balayage général.

3. Appliquez le balayage local de toute la tête, des chakras coronal, frontal, de l'ajna, du chakra mineur de la nuque, des chakras mineurs des mâchoires, du chakra de la gorge et de son mineur secondaire en alternant du vert clair-blanc et du violet ordinaire clair-blanc. Cela doit être effectué d'une façon minutieuse.

4.Projetez les chakras coronal, frontal, l'ajna, le chakra de la gorge avec du vert clair-blanc, puis avec une plus grande quantité de violet ordinaire clair-blanc.

5.Quand vous projetez le violet ordinaire clair-blanc, en même temps, exprirnez la volonté que les chakras deviennent plus grands. Projetez le chakra mineur de la nuque, les chakras mineurs des mâchoires et le chakra mineur secondaire de la gorge avec du vert clair-blanc, puis avec du violet ordinaire clair-blanc.
6. Appliquez le balayage local du chakra cardiaque antérieur et postérieur. Projetez le chakra cardiaque postérieur avec du vert clair-blanc, puis avec une plus grande quantité de violet ordinaire clair-blanc.
7. Appliquez le balayage local du chakra du plexus solaire antérieur et postérieur. Projetez du prana blanc sur le chakra du plexus solaire antérieur.

8. Appliquez le balayage local du chakra du nombril. Projetez du rouge clair-blanc.

9. Appliquez le balayage local minutieux du chakra du sexe et du chakra de base en alternant du vert clair-blanc et de l'orange clair-blanc. Projetez du rouge clair-blanc.

10. Appliquez le balayage local des bras et des jambes en alternant du vert clair-blanc et de l’orange clair-blanc. Projetez les chakras mineurs des bras et des jambes avec du rouge clair-blanc.

11. Stabilisez et relâchez l’énergie projetée.

12. Répétez le traitement trois fois par semaine pendant plusieurs années. Le traitement doit être intégré par un programme spécial de ré-éducation.

Cette procédure peut être effectuée une ou deux fois par semaine sur les personnes plus âgées comme traitement correctif ou préventif contre la sénilité.