

# Вопросы, освещаемые в курсе «Квантовая механика»

## Лекция 1.

Введение в курс квантовой механики

Очевидная неприменимость классической физики, механики и электродинамики, для описания микрообъектов, атомов, молекул, электронов и излучения. Проблема равновесного теплового излучения. Проблема устойчивости вещества.

Дискретность в микромире. Спектральные линии. Опыты Франка и Герца.

Дискретность в классической физике. Аналогия с задачами на собственные значения. Колебания струны, волновое уравнение, граничные условия.

Необходимость волнового описания микрочастиц.

Экспериментальные указания на волновые свойства микрообъектов. Дифракция электронов. Опыты Дэвиссона и Джермера

Волновая и геометрическая оптика. Описание волновых полей в пределе  $\lambda \rightarrow 0$  как потоков частиц. Идея Де-Бройля о построении квантовой или волновой

механики. Основная мысль: **Новая волновая механика соотносится с классической механикой, также как волновая оптика с геометрической.** Элементы классической механики: принцип наименьшего действия, функция Лагранжа, действие как функция координат, соотношения  $\partial S / \partial t = -H$ ,  $\nabla S = \mathbf{p}$ . Запись

принципа наименьшего действия через функцию Гамильтона. Уравнение Гамильтона-Якоби.

Уравнение Гамильтона-Якоби для  $H = E = \text{const}$

Укороченное действие. Действие свободно движущейся частицы  $S = (\mathbf{p}\mathbf{r}) - Et$

## Лекция 2

Волновое уравнение в классической физике. Монохроматические волны. Уравнение

Гельмгольца. Приближение геометрической оптики. Соотношения  $\partial \theta / \partial t = -\omega$  и  $\nabla \theta = \mathbf{k}$ ,

- Аналогия эйконал-действие,  $\theta = S/\hbar$
- Уравнение эйконала- уравнение Гамильтона-Якоби
- Принцип наименьшего действия - принцип Ферма
- Соотношения Де-Бройля: Энергия - частота,  $E = \hbar\omega$  и импульс - волновой вектор  $\mathbf{p} = \hbar\mathbf{k}$
- Дисперсионное соотношение - соотношение энергия - импульс.

Восстановление волнового уравнения для свободной частицы по его виду в  $\omega, \mathbf{k}$  представлении или, что то же самое - по дисперсионному соотношению.

Классическое и квантовое описание свободного движения частицы  $E = \hbar\omega$ ,  $\mathbf{p} = \hbar\mathbf{k}$

Уравнение Шредингера для свободной нерелятивистской частицы.

## Лекция 3

Восстановление уравнения Шредингера по уравнению Гамильтона-Якоби. Уравнение Шредингера - 1926 год.

Физические величины в классике и квантовой механике. Необходимость введения физических величин как операторов, на примере операторов импульса и Гамильтона.

Интерпретация волновой функции. Амплитуда вероятности. Принцип суперпозиции. Сложение амплитуд. Корпускулярно-волновой дуализм. Отражение от полупрозрачного зеркала. Мысленный эксперимент с двумя щелями.

## Лекция 5

Мысленный эксперимент с двумя щелями. Амплитуда перехода. Амплитуда перехода как функция Грина уравнения Шредингера. Интерференция амплитуд. Аналогия с принципом Гюйгенса-Френеля. Исчезновение интерференции при нарушении когерентности. Распределение вероятностей для координаты и для импульса. Переход в  $k$  - представление.

Преобразование Фурье как разложение по собственным функциям оператора импульса. Интерпретация собственных значений операторов как наблюдаемых физических величин.

## Лекция 6

Свободное движение частицы. Решение методом Фурье. Квазимонохроматический пакет. Огибающая и заполнение. Групповая скорость. Соотношения неопределенности. Прямоугольный и Гауссов пакеты. Доказательство соотношений  $\int |\psi(x)|^2 d^3x = \int |\psi(k)|^2 d^3k$  и  $\int k |\psi(k)|^2 d^3k = \int \psi(x)^* (-i\nabla) \psi(x) d^3x$ .

Дельта-функция как ядро единичного оператора. Различные представления дельта-функций.

Доказательство  $\int_{-\infty}^{\infty} e^{i\alpha x} dx = 2\pi\delta(\alpha)$  методом гауссовой регуляризации. Вычисление гауссовых интегралов. Уравнение Шредингера для свободной нерелятивистской частицы. Решение методом Фурье. Волновой пакет. Принцип неопределенности. Некоммутативность операторов импульса и координаты. От каких переменных зависит волновая функция.

Понятие полного набора. Отсутствие траектории.

## Лекция 7

Формальная схема квантовой механики. Разложение по собственным функциям. Собственные значения физической величины.

Средние физических величин  $\bar{A} = \int \psi(x)^* \hat{A} \psi(x) d^3x$

Немного математики. Воспоминания о мат-физике и новый взгляд.

Общая теория операторов физических величин. Задачи на собственные значения. Квантовые числа. Что значит "физическая величина имеет определенное значение".

Дискретный и сплошной спектры. Разложение по собственным функциям какого-либо оператора. Обозначения Дирака.

## Лекция 8

Общий вид оператора. Интегральное представление

Транспонированный, комплексно-сопряженный и эрмитово сопряженный оператор

Эрмитовость-определение. Действительность средних и собственных значений эрмитового оператора.

Ортогональность и

Нормированность векторов, соответствующих разным собственным значениям.

Волновые функции как вектора. Скалярное произведение функций.

## Лекция 9

Разложение функций по собственным функциям оператора. Базисные функции и разложения. Вычисление коэффициентов.

Операторы как матрицы. Непрерывные и дискретные индексы. Ядро интегрального оператора. Представления операторов умножения и дифференцирования как матриц. Обозначения Дирака. Абстрактные вектора и абстрактные операторы. Представления и переход к различным базисам.

Измерение в квантовой механике. Измерение - "разложение" по собственным функциям прибора.

## **Лекция 10**

Опять про операторы. Произведение операторов. Сопряжение произведения

## **Лекция 11**

Особенности разложений в случае сплошного спектра

## **Лекция 12**

Формальное введение уравнения Шредингера. Переход к классике. Уравнение Гамильтона-Якоби. Оператор производной по времени от физической величины. Коммутатор и скобка Пуассона. Зависящие и не зависящие от времени стационарные состояния.

## **Лекция 13**

Матрицы операторов. Вычисления средних

## **Лекция 14**

Коммутируемость операторов и существование общих собственных функций. Необходимость и достаточность. Еще раз о переходе к различным базисам. Преобразования операторов и векторов состояний. Унитарные операторы - операторы сохраняющие ортонормированность. Функции от матриц и операторов. Определение. Доказательство унитарности оператора  $\hat{S} = \exp\{i\hat{R}\}$ , где  $\hat{R}$ -эрмитов

## **Лекция 15**

Преобразование базисов. Унитарные операторы. Сохранение нормировки. Решение задачи как приведение к диагональному виду. Нахождение матрицы приведения к диагональному виду. Доказательство, что она представляет строку собственных векторов

## **Лекция 16**

Нестационарное уравнение Шредингера. Оператор эволюции  $U = \exp\left\{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}t\right\}$ . Функция Грина. Функции от операторов. Построение оператора эволюции путем разложения по собственным функциям стационарного уравнения. Оператор производной физической величины по времени. Представление Гейзенберга. Уравнения Гейзенберга.