# Analyse

Fonctions de deux

variables

## Question 1/12

Extremum local Extremum global

#### Réponse 1/12

Maximum local: 
$$\forall X \in D \subset \mathbb{R}^2, \ f(X) \leqslant f(X_0)$$

$$\text{Maximum global:}$$

$$\exists V \in \mathcal{V}(X_0), \ \forall X \in D \cap V, \ f(X) \leqslant f(X_0)$$

$$\text{Extremum: maximum ou minimum}$$

#### Question 2/12

Dérivée directionnelle

#### Réponse 2/12

 $D_u(f)$  avec u unitaire

#### Question 3/12

Condition nécessaire pour un extremum local

# Réponse 3/12

$$\nabla f(X_0) = 0$$

#### Question 4/12

$$\frac{\partial}{\partial u}(f(\varphi(u,v),\psi(u,v)))$$

# Réponse 4/12

Si 
$$f$$
 est  $C^1$ 

$$\frac{\partial}{\partial x} (f(\varphi(u, v), \psi(u, v))) \frac{\partial}{\partial u} (\varphi(u, v))$$

$$+ \frac{\partial}{\partial y} (f(\varphi(u, v), \psi(u, v))) \frac{\partial}{\partial u} (\psi(u, v))$$

# Question 5/12

# $\nabla f(X)$

# Réponse 5/12

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} (f(X)) \\ \frac{\partial}{\partial y} (f(X)) \end{pmatrix}$$

#### Question 6/12

Expression de la dérivée le long d'un vecteur

$$u = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$
 avec  $\nabla$ 

# Réponse 6/12

$$D_{u}(f) = \langle \nabla f(X), u \rangle$$
$$= a \frac{\partial}{\partial x} (f(X)) + b \frac{\partial}{\partial y} (f(X))$$

#### Question 7/12

Dérivée selon un vecteur  $\boldsymbol{u}$ 

#### Réponse 7/12

$$D_u(f) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(f(X + tu))$$

#### Question 8/12

Règle de la chaîne

# Réponse 8/12

Si 
$$f$$
 est  $C^1$   
Si  $\gamma(t) = (x(t), y(t))$   

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(f(x(t), y(t)))$$

$$= x'(t)\frac{\partial}{\partial x}(f(\gamma(t))) + y'(t)\frac{\partial}{\partial y}(f(\gamma(t)))$$

$$= \langle \gamma'(t), \nabla f(\gamma(t)) \rangle$$

#### Question 9/12

DL d'une fonction de deux variables

#### Réponse 9/12

$$f(X_0 + H) = P(h, k) + o(||H||^n)$$

#### Question 10/12

Ligne de niveau de f de hauteur a

#### Réponse 10/12

$$\left\{ (x,y) \in \mathbb{R}^2, f(x,y) = a \right\}$$

## Question 11/12

Point critique

# Réponse 11/12

$$\nabla f(X_0) = 0$$

#### Question 12/12

 $\mathrm{DL}_1$  de f(x,y) au voisinage de  $X_0$ 

#### Réponse 12/12

$$f(X_0) + (x - x_0) \frac{\partial}{\partial x} (f(X_0))$$

$$+ (y - y_0) \frac{\partial}{\partial y} (f(X_0))$$

$$= f(X_0) + \langle X - X_0, \nabla f(X_0) \rangle + o(\|X - X_0\|)$$