

Surfaces de Riemann

Fonctions elliptiques

Question 1/36

CNS pour que $D = \sum_{P \in \mathbb{C}/\Lambda} n_P [P]$ soit un
diviseur principal

Réponse 1/36

$$\sum_{P \in \mathbb{C}/\Lambda} n_P = 0 \text{ et } \sum_{P \in \mathbb{C}/\Lambda} n_P P \in \Lambda$$

Ou bien $D \in I_{\Lambda}^2$

Question 2/36

Propriétés des fonctions méromorphes sur une surface de Riemann connexe compacte

Réponse 2/36

Il existe une fonction méromorphe f non constante sur X , et pour toute telle fonction f , $\mathcal{M}(X)/\mathbb{C}(f)$ est finie

Question 3/36

$f: U \rightarrow \mathbb{C}$ est holomorphe pour U un ouvert
d'une surface de Riemann X

Réponse 3/36

$f \circ \varphi_i^{-1} : \varphi_i(U \cap U_i) \rightarrow \mathbb{C}$ est holomorphe pour
toute carte (U_i, φ_i)

Question 4/36

Propriétés de $\deg: \mathbb{Z}[G] \rightarrow \mathbb{Z}$

Réponse 4/36

$\deg: \sum_{g \in G} n_g [g] \mapsto \sum_{g \in G} n_g$ est un morphisme de
groupes

Question 5/36

Théorème de l'image ouverte
Conséquences selon les propriétés de X

Réponse 5/36

Si $f : X \rightarrow Y$ est holomorphe non constante
alors f est ouverte

En particulier, si X est compacte connexe et f
est non constante alors Y est compacte et f est
surjective

Question 6/36

f a un pôle en P

Réponse 6/36

$f \circ \varphi^{-1}$ a un pôle en $\varphi(P)$

Question 7/36

$$\text{ord}_P(f)$$

Réponse 7/36

$$\mathrm{ord}_{\varphi(P)}(f \circ \varphi^{-1})$$

Question 8/36

CNS pour avoir des fonctions holomorphes
entre surfaces de Riemann $f: X \rightarrow Y$
 $((U_i, \varphi_i))_{i \in I}$ et $((V_j, \psi_j))_{j \in J}$ atlas respectifs de
 X et Y

Réponse 8/36

f est continue et pour tout $V \subseteq X$,

$$g \in \mathcal{O}_Y(V), g \circ f \in \mathcal{O}_X(f^{-1}(V))$$

$f|_{U_i}$ est holomorphe pour tout $i \in I$ avec

$(U_i)_{i \in I}$ un recouvrement ouvert de X

f est continue et $f|_{f^{-1}(V_j)}$ est holomorphe pour

tout $j \in J$ avec $(V_j)_{j \in J}$ un recouvrement
ouvert de Y

Question 9/36

Idéal d'augmentation de $\mathbb{Z}[G]$

Réponse 9/36

$$I_G = \ker(\deg)$$

Question 10/36

Diviseurs principaux

Réponse 10/36

$$\operatorname{div}(\mathbb{C}(\Lambda)^{\times}) \subseteq \mathbb{Z}[\mathbb{C}/\Lambda]$$

Question 11/36

Fonction méromorphe sur X

Réponse 11/36

Donnée de $S \subseteq X$ fermée et discrète, ainsi que
de $f: X \setminus S \rightarrow \mathbb{C}$ holomorphe et méromorphe
en tout point de S

Question 12/36

Structure de $\mathcal{M}(X)$

Réponse 12/36

Si X est connexe, $\mathcal{M}(X)$ est un corps contenant \mathbb{C}

Question 13/36

Propriété topologique de $\pi: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}/\Lambda$

Réponse 13/36

π est une application ouverte

Pour $r > 0$ tel que $D(0, r) \cap \Lambda = \{0\}$, $\pi|_{D(z_0, \frac{r}{2})}$
est un homéomorphisme

Question 14/36

$$\mathcal{O}_X(U) \text{ pour } U \subseteq X$$

Réponse 14/36

Fonctions $f:U \rightarrow \mathbb{C}$ holomorphes

Question 15/36

Théorème d'Abel–Jacobi

Réponse 15/36

$$\text{Pic}^0(\mathbb{C}/\Lambda) \cong \mathbb{C}/\Lambda \text{ via}$$
$$\left[\sum_{P \in \mathbb{C}/\Lambda} n_P [P] \right] \mapsto \sum_{P \in \mathbb{C}/\Lambda} n_P P \text{ et } [P] - [0] \mapsto P$$

Question 16/36

Ensemble en bijection avec $\mathcal{M}(X)$ pour X
connexe

Réponse 16/36

$\mathcal{M}(X)$ est en bijection avec les applications holomorphes $X \rightarrow \mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ via $f \mapsto \widehat{f}$ avec \widehat{f} qui vaut la limite de f au voisinage des singularités illusoires et $\widehat{f}(P) = \infty$ aux pôles de f

Question 17/36

f a une singularité essentielle en P

Réponse 17/36

$f \circ \varphi^{-1}$ a une singularité essentielle en $\varphi(P)$

Question 18/36

(U, φ) et (V, ψ) sont compatibles

Réponse 18/36

$\psi \circ \varphi^{-1} : \varphi(U \cap V) \rightarrow \psi(U \cap V)$ est un
biholomorphisme

Comme $\psi \circ \varphi^{-1}$ est bijective, cela revient à
avoir $\psi \circ \varphi^{-1}$ holomorphe

Question 19/36

Surface de Riemann

Réponse 19/36

Espace topologique séparé non vide muni d'un
atlas complexe

Question 20/36

Carte complexe d'un espace topologique X

Réponse 20/36

(U, φ) avec $U \subseteq X$ ouvert et $\varphi: U \rightarrow V$ un homéomorphisme sur un ouvert V de \mathbb{C}

Question 21/36

f a un zéro (d'ordre k) en P

Réponse 21/36

$f \circ \varphi^{-1}$ a un zéro (d'ordre k) en $\varphi(P)$

Question 22/36

$$\mathrm{Pic}^0(\mathbb{C}/\Lambda)$$

Réponse 22/36

$$I_{\Lambda} / \operatorname{div}(\mathbb{C}(\Lambda)^{\times})$$

Question 23/36

$$\operatorname{div}(f)$$

Réponse 23/36

$$\sum_{P \in \mathbb{C}/\Lambda} \text{ord}_P(f)[P] \in \mathbb{Z}[\mathbb{C}/\Lambda]$$

Question 24/36

$f : X \rightarrow Y$ est un isomorphisme (ou biholomorphisme) de surfaces de Riemann

Réponse 24/36

Il existe une fonction holomorphe $g: Y \rightarrow X$
telle que $f \circ g = \text{id}_X$ et $g \circ f = \text{id}_Y$

Question 25/36

Pôles d'une fonction elliptiques

Réponse 25/36

Une fonction elliptique a deux pôles, comptés avec multiplicité

Question 26/36

Sommes particulières pour les fonctions
elliptiques

Réponse 26/36

$$\sum_{P \in \mathbb{C}/\Lambda} \operatorname{Res}_P(f) = 0$$

$$\sum_{P \in \mathbb{C}/\Lambda} \operatorname{ord}_P(f) = 0$$

$$\sum_{P \in \mathbb{C}/\Lambda} P \operatorname{Res}_P(f) \in \Lambda$$

Question 27/36

Propriétés des fibres de $f: X \rightarrow Y$ holomorphe

Réponse 27/36

Si X est connexe et f est non constante alors
 $f^{-1}(\{a\})$ est une partie discrète et fermée de
 X pour tout $a \in Y$

Si X est compact alors les fibres sont finies

Question 28/36

$f : X \rightarrow Y$ est une fonction holomorphe entre
surfaces de Riemann

$((U_i, \varphi_i))_{i \in I}$ et $((V_j, \psi_j))_{j \in J}$ atlas respectifs de
 X et Y

Réponse 28/36

f est continue et, pour tout $j \in J$,
 $\psi_j \circ f : f^{-1}(V_j) \rightarrow \mathbb{C}$ est holomorphe

Question 29/36

CNS pour que $f: X \rightarrow Y$ soit un isomorphisme

Réponse 29/36

f est holomorphe et bijective

Question 30/36

CNS pour avoir $f: \Omega \setminus \{P\} \rightarrow \mathbb{C}$
holomorphe/méromorphe

Réponse 30/36

f s'étend en une fonction holomorphe

$$\hat{f}: \Omega \rightarrow \mathbb{P}^1(\mathbb{C})$$

f a un pôle en P si et seulement si $f(P) = \infty$

Question 31/36

$$\mathrm{Pic}(\mathbb{C}/\Lambda)$$

Réponse 31/36

$$\mathbb{Z}[\mathbb{C}/\Lambda] / \operatorname{div}(\mathbb{C}(\Lambda)^{\times})$$

Question 32/36

Atlas complexe d'un espace topologique X

Réponse 32/36

Famille de cartes compatibles $((U_i, \varphi_i))_{i \in I}$ avec

$$X = \bigcup_{i \in I} U_i$$

Question 33/36

f est holomorphe en P

Réponse 33/36

$f \circ \varphi^{-1}$ est holomorphe en $\varphi(P)$

Question 34/36

f est méromorphe en P

Réponse 34/36

$f \circ \varphi^{-1}$ est méromorphe en $\varphi(P)$

Question 35/36

Principe du prolongement analytique

Réponse 35/36

Si $f, g: X \rightarrow Y$ sont holomorphes et X est connexe avec $f \neq g$, alors $\{x \in X, f(x) = g(x)\}$ est une partie discrète et fermée de X

En contraposant, si $\{x \in X, f(x) = g(x)\}$ a un point d'accumulation dans X alors $f = g$

Question 36/36

f a un pôle (d'ordre k) en P

Réponse 36/36

$f \circ \varphi^{-1}$ a un pôle (d'ordre k) en $\varphi(P)$