

# Лекция 8

## Снижение размерностей

Габдуллин Р.А., Макаренко В.А.

МГУ им. М.В. Ломоносова

9 марта 2021

# Снижение размерности данных

Цель:

- Построить меньшее количество признаков на основе исходных, сохранив при этом максимум информации.

Для чего это нужно:

- Ускоряем процесс обучения/инференса.
- Используем меньше памяти для хранения признаков.
- Боремся с проклятием размерности.
- Боремся с мультиколлинеарностью.
- Можем визуализировать данные.

# Метод главных компонент (Principal component analysis)




Рис.: Источник: [medium.com](https://medium.com)

# Метод главных компонент. Постановка задачи

Исходное признаковое описание объекта  $x \in X$ :

$$f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x).$$

Новое признаковое описание объекта  $x \in X$ :

$$g_1(x), g_2(x), \dots, g_m(x).$$

Требования:

- $m \leq n$ .
- $\hat{f}_j(x) = \sum_{k=1}^m g_k(x) u_{j,k}, \quad 1 \leq j \leq n, \quad x \in X.$
- $\sum_{i=1}^{\ell} \sum_{j=1}^n (f_j(x_i) - \hat{f}_j(x_i))^2 \rightarrow \min_{\{g_k(x_i)\}, \{u_{j,k}\}}$

# Метод главных компонент. Постановка задачи

Матрицы признаков (старая и новая):

$$F_{\ell \times n} = \begin{pmatrix} f_1(x_1) & \dots & f_n(x_1) \\ \dots & \dots & \dots \\ f_1(x_\ell) & \dots & f_n(x_\ell) \end{pmatrix}, \quad G_{\ell \times m} = \begin{pmatrix} g_1(x_1) & \dots & g_m(x_1) \\ \dots & \dots & \dots \\ g_1(x_\ell) & \dots & g_m(x_\ell) \end{pmatrix},$$

Матрица линейного преобразования:

$$U_{n \times m} = \begin{pmatrix} u_{1,1} & \dots & u_{1,m} \\ \dots & \dots & \dots \\ u_{n,1} & \dots & u_{n,m} \end{pmatrix}, \quad \hat{F} = GU^T.$$

Цель:

$$\sum_{i=1}^{\ell} \sum_{j=1}^n (f_j(x_i) - \hat{f}_j(x_i))^2 = \|F - GU^T\|^2 \rightarrow \min_{G,U}.$$

## Теорема

Если  $m \leq \text{rank } F$ , то минимум  $\|F - GU^T\|^2$  достигается, когда столбцы  $U$  – это собственные векторы матрицы  $F^T F$ , соответствующие  $m$  максимальным собственным значениям  $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ , а матрица  $G = FU$ .

При этом:


- Матрица  $U$  ортонормирована:  $U^T U = I_m$ .
- Матрица  $G$  ортогональна:  $G^T G = \Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_m)$ .
- $U\Lambda = F^T F U$ ,  $G\Lambda = FF^T G$ .
- $\|GU^T - F\|^2 = \|F\|^2 - \text{tr } \Lambda = \sum_{j=m+1}^n \lambda_j$ .

# Выбор количества новых признаков

Упорядочиваем с.з.  $F^T F$  по убыванию:  $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n \geq 0$ .

$$E_m = \frac{\|GU^T - F\|^2}{\|F\|^2} = \frac{\lambda_{m+1} + \dots + \lambda_n}{\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n}.$$

Критерий «крутого склона»: находим  $m$  такое, что  $E_{m-1} \gg E_m$ .




# Сингулярное разложение (SVD)

Любая вещественная матрица  $A_{n \times d}$  разложима следующим образом:

$$A = U \Sigma V^T,$$

где  $U_{n \times n}$ ,  $V_{d \times d}$  – ортогональные матрицы,  $\Sigma_{n \times d}$  – диагональная матрица.





Сингулярное разложение:

$$F = VDU^T.$$

Если взять  $m = n$ , то

- $\|GU^T - F\| = 0$ .
- Представление  $\hat{F} = GU^T = F$  точное и совпадает с сингулярным разложением при  $G = VD, \Lambda = D^2$ :

$$F = GU^T = V\sqrt{\Lambda}U^T; \quad U^T U = I_m; \quad V^T V = I_m$$

- Линейное преобразование  $U$  работает в обе стороны:

$$F = GU^T, \quad G = FU.$$

Поскольку новые признаки некоррелированы ( $G^T G = \Lambda$ ), преобразование  $U$  называется декоррелирующим (или преобразованием Карунена-Лоэва).

# Нелинейные методы снижения размерности




Рис.: Источник: [science.sciencemag.org](http://science.sciencemag.org)

# Multidimensional scaling (MDS)

Цель: при снижении размерности сохранить попарные расстояния  $d_{i,j}$  между объектами

Исходное признаковое описание объектов:

$$x_1, x_2, \dots, x_\ell.$$

Новое признаковое описание объектов:

$$\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \dots, \tilde{x}_\ell.$$

Задача оптимизации:

$$\sum_{i < j}^{\ell} (\|\tilde{x}_i - \tilde{x}_j\| - d_{i,j})^2 \rightarrow \min.$$

# t-distributed stochastic neighbor embedding (t-SNE)

Условная вероятность соседства двух точек в исходном признаковом пространстве:

$$p_{j|i} = \frac{\exp(-\|x_i - x_j\|^2 / 2\sigma_i^2)}{\sum_{k \neq j} \exp(-\|x_i - x_k\|^2 / 2\sigma_i^2)}.$$

Вероятность в исходном пространстве признаков:

$$p_{i,j} = \frac{p_{i|j} + p_{j|i}}{2\ell}.$$

В новом пространстве:

$$q_{i,j} = \frac{(1 + \|y_i - y_j\|^2)^{-1}}{\sum_{k \neq l} (1 + \|y_k - y_l\|^2)^{-1}}$$

Задача оптимизации:

$$\sum_i \text{KL}(P_i \| Q_i) = \sum_i \sum_{j \neq i} p_{i,j} \log \left( \frac{p_{i,j}}{q_{i,j}} \right) \rightarrow \min_{y_1, \dots, y_\ell}.$$