

Übung 8

RANS - Herleitung von Modellkonstanten

Aufgabe 1: Kolmogorov Längenmaß

Leite den Zusammenhang zwischen dem integralen Längenmaß l , der Kolmogorov-Länge η und der turbulenten Reynoldszahl Re_t her.

Aufgabe 2: Herleitung von c_{ε_2} des $k - \varepsilon$ Modells

Gegeben sind die Gleichungen des $k - \varepsilon$ Modells:

$$\begin{aligned}\frac{\partial k}{\partial t} + \langle u_j \rangle \frac{\partial k}{\partial x_j} &= 2\nu_t \langle S_{ij} \rangle \langle S_{ij} \rangle - \varepsilon + \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\left(\nu + \frac{\nu_t}{\sigma_k} \right) \frac{\partial k}{\partial x_j} \right] \\ \frac{\partial \varepsilon}{\partial t} + \langle u_j \rangle \frac{\partial \varepsilon}{\partial x_j} &= \frac{\varepsilon}{k} (c_{\varepsilon_1} P_k - c_{\varepsilon_2} \varepsilon) + \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\left(\nu + \frac{\nu_t}{\sigma_\varepsilon} \right) \frac{\partial \varepsilon}{\partial x_j} \right]\end{aligned}$$

und die Bedingungen für homogene, isotrope Turbulenz:

$$\begin{aligned}\langle u_i \rangle &= 0 \\ \frac{\partial \langle \cdot \rangle}{\partial x_i} &= 0\end{aligned}$$

- (a) Leiten Sie eine analytische Lösung für k und ε für den asymptotischen Grenzfall großer Zeiten her.
- (b) Die turbulente Strömung hinter einem Gitter (bspw. in einem Windkanal) kann als homogen und isotrop angesehen werden. Experimentelle Daten für den Parameter n in den Gleichungen

$$k = k_0 \left(\frac{t}{t_0} \right)^{-n} ; \varepsilon = \varepsilon_0 \left(\frac{t}{t_0} \right)^{-m}$$

legen einen Wert von $n \approx 1,08 \dots 1,2$ nahe. Geben Sie mit dieser Information und der oben hergeleiteten Gleichung die Modellkonstanten c_{ε_2} an.

- (c) Klingt die Dissipation schneller oder langsamer als die turbulente kinetische Energie ab?
- (d) Wie verhält sich die turbulente Reynoldszahl mit der Zeit wenn man bedenkt, dass $n \approx 1$ ist?