

CAPÍTULO I ? Introdução à Iridologia

A iridologia é uma técnica de avaliação holística que utiliza a observação da íris ocular para identificar padrões constitucionais e tendências de funcionamento orgânico. Bernard Jensen, considerado o pai da iridologia americana moderna, sistematizou o mapeamento setorial baseado na divisão da íris em 12 horas, espelhando o relógio. Esta divisão permite associar cada região a sistemas e órgãos específicos do corpo humano. Os textos clássicos de Jensen, Birello, Lo Rito e outros autores europeus fornecem o vocabulário canônico que o pipeline RAG deste projeto indexa.

A íris contém milhares de fibras cuja densidade, coloração e padrão indicam a constituição do indivíduo. As três constituições primárias ? linfática, biliar e hematogina ? descrevem padrões de resposta sistêmica que dialogam com escolas de naturologia e antropomedicina.

1.1 Setor 7 ? Fígado

O setor 7 corresponde anatomicamente ao fígado, vesícula biliar e conduto hepático no olho direito. Sinais como lacunas abertas e raios solaris nesta região sugerem padrões funcionais que merecem investigação na anamnese, sem caracterizar afirmação clínica. A escola italiana, representada por Birello e Lo Rito em *Iridologia del Profondo*, expande o setor 7 incorporando dimensão psicoemocional ligada ao arquétipo do fígado.

A combinação de constituição biliar com sinais marcados no setor 7 fornece eixo de avaliação holística ? sempre apresentada como hipótese investigativa, não como afirmação categórica.

1.2 Lacunas e Criptas

Lacunas são depressões na trama fibrilar da íris, classificadas em abertas (com bordas menos definidas) e fechadas (bordas marcadas). Criptas são depressões mais profundas, frequentemente em forma de losango ou diamante. Ambos os sinais, na linguagem iridológica clássica, indicam pontos de menor densidade fibrilar ? interpretáveis como