こどものおくすりガイド

飲ませ方・使い方・困ったときのヒント

保護者向け



はじめに



子どもに合った、薬の使い方を見つけましょう

子どもに薬を飲ませるとき、「うまく飲めない」「これでいいのかな」と迷うことがあります。
子どもの成長や発達、薬の種類によって、飲みやすい方法はさまざまです。
この冊子では、家庭で役立つ薬の使い方と、困ったときの対応を紹介します。

1 成長に合わせた工夫

赤ちゃんから学童期以降まで、子どもの発達や気持ちに合わせた関わり方を紹介します。



2 薬の正しい使い方

粉薬・シロップ・錠剤・塗り薬など、薬の種類に応じた使い方を紹介します。



3 困ったとき・安全のために

薬を嫌がる、吐いてしまった、飲み忘れたときの対応や、副作用・誤飲の注意点を紹介します。



大切にしたいこと

- 年齢はあくまで目安です。子どもの発達や経験、体調に合わせて、無理のない方法を考えましょう。
- 薬ごとの指示を優先し、迷ったときは医師・薬剤師に相談しましょう。

こどもの おくすりガイド

もくじ

知りたいことから、読んでみましょう



はじめに　はじめに・薬を使う前の確認 …… P02〜04

第1章　成長に合わせた薬の飲ませ方
乳児期・幼児期・学童期以降 …… P05〜07
こんなときは、このページ …… P08



第2章　薬の形に合わせた工夫
粉薬・シロップ・錠剤など …… P09〜14



第3章　飲めなかったとき・薬の基本
吐いたとき・飲み忘れ・量と時間 … P15〜20



第4章　飲み薬以外の使い方
塗り薬・目薬・吸入薬・坐薬など　P21〜25



第5章　副作用と安全
アレルギー・誤飲・薬の保管 … P26〜29



第6章　よくある質問・相談と記録
Q&A・お薬手帳・相談先・参考資料　P30〜35



こどもの おくすりガイド

薬を使う前の5つの確認



「いつもの薬」でも、使う前にチェックしましょう！

1 だれの、何の薬ですか？

子どもの名前と、薬の名前を確認しましょう。



2 どのくらい使いますか？

1回の量と、1日に使う回数を確認しましょう。



3 いつ使いますか？

使う時間や、次に使うまでの間隔を確認しましょう。




4 どこに、どうやって使いますか？

飲む・塗る・目にさすなど、
使う場所と方法を確認しましょう。



5 まだ使える薬ですか？

使用期限や保管方法を確認しましょう。
以前もらった薬を自己判断で使わないようにしましょう。



ポイント

いつもと違うことや、わからないことがあれば、使う前に医師・薬剤師へ確認しましょう。



薬剤師からのひとこと

薬を受け取ったら、薬袋・
薬剤情報提供書と実際の薬を
照らし合わせておきましょう。



乳児期の薬の飲ませ方
（おおむね0〜1歳）

赤ちゃんのペースに合わせて、あせらず少しずつ



1 飲ませやすい姿勢にしましょう



- 赤ちゃんの頭と上体を支え、安定した姿勢で飲ませましょう。
- あお向けに寝かせたまま、薬を流し込まないようにしましょう。

2 少量ずつ、飲み込みを確認しましょう



- 液体の薬をスポイトや経口シリンジで飲ませる場合は、頬の内側に向けて少しずつ。
- 喉の奥へ勢いよく流し込まないようにしましょう。

3 授乳とのタイミングも確認しましょう



- 授乳後はおなかがいっぱいで、薬を飲みにくいこともあります。
- 授乳前に飲ませる方法が適する場合もありますが、薬ごとの指示を優先しましょう。

保護者へのメッセージ



- 赤ちゃんが薬を嫌がることもある。むせたり、うまく飲み込めなかったりするときは無理に続けず、相談しましょう。

詳しい飲ませ方は：
粉薬 P09〜11、シロップ薬 P12

幼児期の薬の飲ませ方

子どもの気持ちを大切に、一緒に工夫しましょう



1 わかりやすい言葉で伝えましょう

「元気になるためのお薬だよ」など、
子どもにわかる短い言葉で説明しましょう。
薬をお菓子だと伝えるなど、だまして
飲ませることは避けましょう。



2 自分で選べることをつくりましょう

コップを選ぶ、座る場所を決めるなど、
安全な範囲で子どもが選べる工夫を
取り入れましょう。



3 飲めたことを認めましょう

少しでもできたことを認め、次につながる
経験にしましょう。
うまく飲めなかったときも、叱ったり、
無理強いしたりしないようにしましょう。



薬剤師からのひとこと

苦味、におい、量、飲み込みにくさなど、
嫌がる理由はさまざま。困ったら相談しましょう。



詳しい工夫は：薬を嫌がるとき P13、どうしても飲めないとき P17

学童期以降の薬の飲み方（おおむね6歳以上）



薬のことを知って、自分でできることを少しずつ増やしましょう。

1 薬を飲む理由を知りましょう



- 薬は何のために使うのか、いつ使うのかを、子ども自身にもわかる言葉で説明しましょう。
- わからないことは、医師・薬剤師に質問してかまいません。

2 飲む習慣を一緒につくりましょう



- カレンダーやチェック表などを使い、飲んだことを確認する工夫をしましょう。
- 学校生活や習い事などに合わせた服薬方法も、必要に応じて相談しましょう。

3 自分でできることを増やしましょう



- 水を準備する、薬袋を確認するなど、できることから少しずつ練習しましょう。
- 錠剤を飲めるようになる時期には個人差があります。無理に練習させず、薬の形や飲み方について相談しましょう。

保護者へのメッセージ



- 自分でできることが増えても、薬の種類・量・服用したかどうかは、大人も一緒に確認しましょう。

詳しい飲み方は、P14「錠剤・カプセル」、P18「薬の量と回数」をご覧ください。

こんなときは、このページ



知りたいこと・困っていることから探してみよう



粉薬を
うまく飲ませたい
P09〜11



薬の量・飲む時間
がわからない
P18〜19



シロップの
量り方・飲ませ方
P12



塗り薬・目薬・
吸入薬などの
使い方
P21〜25



薬を嫌がる・
どうしても飲めない
P13・17



副作用や
アレルギーが心配
P26〜27



薬を吐いてしまった
P15



薬を間違って
飲んでしまった
P28



薬を飲み忘れた
P16



相談できるところ
を知りたい
P33〜34

緊急のときは



呼吸がおかしい、意識がない、反応が悪いなど、
命にかかわる症状があるときは、
冊子で調べるより**119番**への通報を優先しよう。

粉薬の基本の飲ませ方

1 まずは水か白湯で

少量の水か白湯（湯冷まし）で
飲ませてみましょう。
薬の指示があるときはそちらを
優先してください。



2 薬は少量ずつ

一度にたくさん口へ入れず、
子どもの様子を見て少しずつ
飲ませましょう。



3 飲めたらほめる

飲めたことを認め、
安心できる雰囲気を
つくりましょう。



ポイント

無理に押さえつけず、
落ち着いた環境で
飲ませましょう。



薬剤師からのひとこと

粉薬を小皿に出し、清潔な指先につけて、子どもに舐めてもらう工夫もあります。



粉薬を少量の水でまとめる方法

ペースト状にして飲ませる工夫



1 少量の水か白湯を用意します



少量の水または白湯（湯冷まし）を用意します。

2 粉薬に水を加えてまとめます



粉薬に水を数滴ずつ加え、団子状にまとめます。水の量は薬の量や性質に合わせて調整します。

3 飲ませます



ペーストを頬の内側に塗りつける、または少しずつ飲ませます。
必要に応じて、その後、少量の水を飲ませます。

4 うまく飲めないときは



別の方法を薬剤師に相談しましょう。

注意



加工したものを作り置きしないでください。
薬によっては適さない方法もあります。

薬剤師からのひとこと



水を加えすぎた場合は、液状で飲んだら大丈夫です（作り直す必要はありません）。

食品に混ぜるときの工夫と注意

飲みにくい粉薬を、少量の食品で



1 混ぜる前に確認しましょう



薬によって、混ぜると苦くなったり、薬の吸収に影響したりする食品があります。混ぜてもよいか、事前に薬剤師に確認しましょう。

2 少量に混ぜて、すぐに飲ませましょう



1回で食べきれる少量の食品に混ぜます。たくさん混ぜると食べ残しにつながるため、混ぜたら作り置きせず、できるだけすぐに飲ませましょう。

3 混ぜる食品の例



食品はあくまで一例です。薬との相性を確認し、年齢に適した食品を少量使ってください。コーンクリームは冷ましてから使用しましょう。

4 避けたいこと



ミルクや毎日の主食には、原則として混ぜないでください。飲み残しや、食品そのものを嫌いになる原因になることがあります。

注意

1歳未満には、はちみつ・はちみつ入り食品を与えないでください。
薬に混ぜる場合も同じです。



薬剤師からのひとこと

食事を嫌いにならないよう、食事用と服薬用のコップ・スプーンを分ける工夫もあります。食品に混ぜても飲めないときは、別の方法を相談しましょう。



第1章

シロップ薬の飲ませ方



量を正しくはかって、あわてず飲ませましょう

1 使う前に確認しましょう



薬袋や説明書で、1回量・1日の回数・保管方法を確認しましょう。

混ぜる必要がある薬は、泡立てないように、飲ませる前によく混ぜましょう。

2 決められた量をはかりましょう



計量カップ　スポイト　経口シリンジ



計量カップ・スポイト・経口シリンジなど、薬に適した器具を使いましょう。

カップの目盛りは、平らな場所に置いて目の高さで確認しましょう。

3 あわてず、少しずつ飲ませましょう



子どもの様子を見ながら、ゆっくり飲ませましょう。スポイトや経口シリンジを使う場合は、頬の内側に向けて少しずつ飲ませましょう。勢いよく流し込まないようにしてください。

4 使い終わったら



計量器具は、それぞれの指示に従ってお手入れしましょう。

薬のふたをしっかり閉め、指定された方法で保管しましょう。

薬剤師からのひとこと

薬によって、混ぜる必要があるもの・ないもの、保管方法が異なります。わからないときは薬剤師に相談しましょう。



薬を嫌がるときの工夫



嫌がる理由は子どもによって違います。
安心して飲める方法を探しましょう。

1 嫌がる理由を知りましょう


味・におい


口に残る感覚


のどへの刺激


以前の嫌な経験


初めてで怖い

2 飲みやすくする工夫


冷やす
（可能な薬のみ）


少量の食品と混ぜる
（食品の例と注意は P06～07参照）


上体を少し起こす

- 舌の奥のほうに置くと、味を感じにくくなることがあります。
- むせや誤嚥に注意し、無理に口の奥へ押し込まないでください。

3 声かけの工夫



安心できる声をかけましょう。

4 どうしても飲めないとき


無理をせず、薬剤師・医師に相談しましょう。

注意



薬を砕く・割る・カプセルを開けるなどの加工は、事前に医師・薬剤師に相談してください。

錠剤・カプセルの飲ませ方



1 年齢や飲み込む力に合わせましょう



小さい子どもは飲み込みがむずかしいことがあります。



飲み込める時期には個人差があります。




無理に錠剤・カプセルを飲ませないでください。

飲み込みが心配なときは、薬の形を変える方法や、飲みやすくする工夫を相談できます。



2 水または白湯で



基本は水または白湯で服用しましょう。



上体を少し起こした姿勢で飲ませましょう。

飲ませるときのポイント




上体を少し起こす



少量ずつ飲む 一気に流し込まない

3 大きくて飲めない場合



錠剤を砕く・割る・カプセルを開ける前に、必ず医師・薬剤師に確認してください。

加工すると、薬の特色が失われる場合があります。

相談できること（例）

- 飲み込みやすい大きさや剤形への変更
- 口の中で崩れる錠剤や粉末など、代替の剤形があるかの確認
- 服薬補助ゼリーの使用について
- そのほか、飲みやすくする方法の相談



薬を吐いてしまったとき



**全部吐いたように見えても、
自己判断で飲み直さず、
まずは医師・薬剤師に相談してください。**

1 すぐに吐いたとき

飲んですぐに（目安：30分以内）
吐いてしまった場合でも、
全部吐いたように見えても、
自己判断で飲み直さないでください。
医師・薬剤師に相談しましょう。



2 時間がたって吐いたとき

飲んでから時間がたって（目安：30分以上）
吐いた場合は、薬がすでに吸収されている
可能性があります。
対応は薬の種類によって異なりますので、
医師・薬剤師に相談しましょう。



時間の目安

- **すぐに吐いた**
  目安：30分以内
- **時間がたって吐いた**
  目安：30分以上

3 相談時に伝えること

医師・薬剤師に相談する際は、次のことを伝えると、
適切な対応がしやすくなります。



薬の名前
（できれば薬の袋や
お薬手帳を）



飲んだ時間



吐いた時間



吐いた量・様子
（薬が残っていたかなど）



本人の状態
（元気、ぐったり、
発熱など）

注意

- 薬の種類によって対応は異なります。
  自己判断で飲み直さないでください。
- ぐったりしている、繰り返し吐く、
  水分がとれない、意識がはっきりしないなど、
  体調が悪いときは、速やかに医療機関を受診してください。



薬を飲み忘れたとき



薬によって、飲み忘れへの対応が違います。
慌てずに、指示を確認しましょう。

1 気づいたら指示を確認しましょう

薬によって飲み忘れへの対応が違います。
薬袋・説明書・事前に受けた指示を
確認しましょう。



2 2回分をまとめて飲ませないでください

飲み忘れた分を取り戻すために、
一度に2回分を飲ませないでください。
副作用の原因になることがあります。



3 分からないときは相談しましょう

次の服用までの時間や薬の種類を伝えて、
医師・薬剤師に相談しましょう。



- 薬の名前
- 飲み忘れた時間
- 次の服用までの時間
- お子さんの状態



飲んだ時間をメモしましょう



飲んだ時間をメモすると、
次回の確認に役立ちます。
スマートフォンのメモや、
カレンダーに記録する方法も
あります。

薬剤師からのひとこと



飲み忘れないようにする
工夫もあります。
生活のリズムに合わせた
飲み方や、飲み忘れ防止の
方法についても、
薬剤師に相談しましょう。

どうしても薬を飲めないとき



無理に飲ませるのではなく、
原因を探し、継続できる方法を一緒に考えましょう。

1 まず理由を探しましょう

飲めない理由は、子どもによってさまざまです。



苦い
においが気になる



むせる
のどに残る感じ



量が多い



体調が悪い
（吐き気・発熱など）



以前の嫌な経験
初めてで怖い

2 次の服用の前に相談しましょう

薬の種類や必要性、別の剤形（シロップ・粉薬・貼り薬・坐薬など）への変更、飲ませ方の工夫について、医師・薬剤師に相談しましょう。



3 相談のときに伝えること

次のような情報を伝えると、
適切なアドバイスが受けやすくなります。



薬の名前
（できれば薬の袋やお薬手帳を）



年齢
（体重）



何が難しいか
（味・量・むせるなど）



試した方法
（冷やす・混ぜるなど）



飲めた量
（まったく・少し・半分など）

ポイント



無理に押さえつけることよりも、
子どもに合った方法を一緒に探し、
継続できることをめざしましょう。

薬の量と回数を守りましょう



**薬は、決められた量と回数で使うことで、
効果が十分に発揮され、
安全に使うことができます。**

1 1回量

薬袋にある1回の量を
確認しましょう。



2 1日の回数

決められた回数と
服用間隔を守りましょう。



3 ほかの人の薬を使わないでください

兄弟姉妹であっても、
薬を共有しないでください。
同じ症状でも、年齢や体重、
病状によって、薬の種類や量が
異なることがあります。



ポイント



薬の量や回数は、自己判断で
増やしたり減らしたりしないでください。

わからないことや、飲み方で困ったことが
あれば、医師・薬剤師に相談しましょう。

薬剤師からのひとこと



薬は薬袋に入れ、
薬袋や説明書に書かれた
保管方法を確認しましょう。

他の薬や食品との
飲み合わせも大切です。
気になることは、
薬剤師にご相談ください。

薬を飲むタイミング



**薬は、決められたタイミングで飲むことで、
効果を発揮し、安全に使うことができます。
薬によって、食事との関係や飲む時刻が異なります。**

1 食事との関係

食事との関係は、薬の吸収や効果に影響することがあります。
薬袋や説明書の指示を確認しましょう。

食前

食事の約30分～
1時間前



食後

食事のあと
約30分以内



食間

食後約2時間です。
食事中ではありません。



空腹時

食べ物が胃の中に
少ないときです。
薬ごとの指示を
確認しましょう。



2 就寝前

原則は、寝る前30分ですが、
就寝直前に使う薬もあります。
薬ごとの指示を確認しましょう。



3 頓服（とんぷく）

症状があるときなど、
指示に応じて飲みます。
使用間隔と1日の
上限回数を確認しましょう。



4 時間指定

食事とは別に、飲む時刻や
間隔が決められている薬も
あります。



薬によって、服用時間を厳密に守る必要があるものと、継続して飲むことが大切なものがあります。
違いが分からないときは、薬剤師に確認しましょう。

ポイント




食事の時間がずれたときや、
薬を飲めなかったときは、
自己判断でまとめて飲まず、
薬剤師に相談しましょう。

薬剤師からのひとこと



薬は薬袋に入れ、薬袋や
説明書の保管方法を
確認しましょう。
飲み忘れを防ぐ工夫や、
飲みやすい方法についても
相談できます。

薬を途中でやめてもいい？



薬は、決められた期間や使い方で続けることで、効果を発揮し、病気がよくなったり、再発を防いだりするものがあります。

1 よくなっても自己判断しないでください

症状がよくなっても、決められた期間続ける必要がある薬があります。
自己判断で中止すると、病気がぶり返したり、治りにくくなったりすることがあります。



2 必要なときだけ使う薬もあります

痛みや発熱など、症状があるときに使う薬（頓服薬）は、毎日飲む必要はありません。
使うタイミングや、使用間隔・1日の上限回数を、薬袋や説明書で確認しましょう。



3 気になる症状が出たら

飲んでいる薬で気になる症状が出たときや、続けてよいか迷うときは、次の服用をどうするか医師・薬剤師に相談しましょう。
重い症状があるときは、救急対応を優先してください。



ポイント



中止・減量・再開の判断は、薬の種類や病気によって異なります。
自己判断せず、必ず医師・薬剤師に相談しましょう。

薬剤師からのひとこと



薬の中には、途中でやめると効果が弱くなったり、病気が再発したりするものがあります。
疑問や不安があれば、いつでも薬剤師に相談してください。

塗り薬の使い方



指示された場所に、やさしく広げて塗りましょう。
少しベタベタするくらいが目安です!

1 やさしく広げましょう

指示された場所に、強くすりこまず、
やさしく広げましょう。




2 塗る量も大切です

ステロイド外用薬や保湿剤などでは、
塗ったところが少しベタベタする程度
が目安になります。
すりこみすぎると十分な効果が
得られないことがあります。



3 1FTUって、どのくらい?

一般的なチューブでは、大人の人差し指の
先から第一関節まで薬を出した量が
1FTUの目安です。
チューブの口径によって量は異なります。



注意 ⚠



すべての塗り薬に共通する目安
ではありません。
薬ごとの指示を優先しましょう。
塗る範囲・回数・期間は、薬の種類や
症状によって異なります。

薬剤師からのひとこと



塗る場所・量・回数・期間は、
薬によって異なります。
わからないことや不安なことが
あれば、薬剤師に相談しましょう。

点眼薬の使い方

目薬の先が、目やまつ毛に触れないようにしましょう

① 使う前に手を洗いましょう

手をきれいに洗い、薬の名前・
点眼する目・回数を確認しましょう。



② 下まぶたを軽く下げて点眼しましょう

子どもを安定した姿勢であお向けにします。

下まぶたを軽く下げ、指示された滴数を
点眼しましょう。容器の先を目やまつ毛に
触れさせないように注意してください。



③ 点眼後は静かに目を閉じましょう

強くまばたきせず、しばらく目を閉じましょう。
できる場合は、目頭を軽く押さえましょう。
目の周りにあふれた薬液は清潔なティッシュ
などで拭き取りましょう。



子どもが嫌がるときは？

目を閉じてしまう場合は、目の周りを清潔にして、
目頭付近に1滴落とし、目を開けてもらう方法も
あります。
難しいときは無理に続けず、薬剤師に相談しましょう。



ポイント

複数の目薬を使う場合は、一般的に5分以上間隔をあけます。
薬ごとの指示を優先しましょう。



点鼻薬の使い方

鼻をきれいにして、決められた方法で使いましょう

① 使う前の準備

手を洗い、鼻をやさしくかみましょう。
鼻をかめない子どもは、鼻の入り口の汚れをやさしく拭き取りましょう。
薬によっては、使う前に容器を振る必要があります。



② 正しい姿勢で噴霧しましょう

噴霧式では、顔を少し下に向け、容器の先を鼻の穴に軽く入れます。
指示された回数だけ噴霧しましょう。



③ 使用後は清潔に

容器の先を清潔なティッシュなどで拭き、キャップを閉めましょう。
水洗いできるかどうかは、製品によって異なります。



! 注意

点鼻薬には噴霧式と滴下式があります。
滴下式では顔を上に向けるなど、使い方が異なります。
薬ごとの説明書と指示を確認しましょう。

噴霧式（スプレータイプ）



顔を少し下に向けて使います。

滴下式（点鼻タイプ）



顔を上に向けて使います。



薬剤師からのひとこと

噴霧式では、ノズルを鼻の中央の壁（鼻中隔）に強く向けないようにしましょう。向きや使い方がわからないときは薬剤師に確認してください。

吸入薬の使い方

吸入器の種類によって、使い方が異なります

① スプレー式吸入薬（pMDI）＋スペーサー

薬をスペーサーに噴霧し、口から吸い込む方法です。
マスクを使う場合は、鼻と口をすき間なく覆いましょう。マウスピースの場合は、しっかりくわえて口から呼吸しましょう。
1回の噴霧ごとに、指示された方法で吸入してください。



② 粉末吸入薬（DPI）

自分の吸う力で、粉末の薬を吸い込む方法です。
十分な力で吸い込めるか、正しく操作できるかを確認しましょう。
吸入口に息を吹き込まないよう注意してください。



③ ネブライザー

薬液を細かい霧にして吸い込む方法です。
マスクは顔に密着させ、マウスピースはすき間なくくわえましょう。
使用後は、決められた方法で器具を洗浄・乾燥させてください。



④ 吸入したあとのケア

吸入ステロイド薬を使ったあとは、うがいや飲水などで口の中に残った薬を洗い流しましょう。
マスクを使った場合は、顔についた薬も拭き取りましょう。





薬剤師からのひとこと

吸入器によって操作や呼吸の方法が異なります。
実際の器具を使って、薬剤師などから説明を受けましょう。

第4章｜飲み薬以外の使い方

坐薬の入れ方

あわてず、ゆっくり入れましょう



① 手を洗い、薬を確認しましょう

薬の名前と1回に使う量を確認し、
包装から取り出しましょう。
できれば排便を済ませてから
使いましょう。



② 楽な姿勢にしましょう

赤ちゃんは、あお向けに寝かせて
両足をやさしく持ち上げます。
大きな子どもは、横向きに寝て
膝を軽く曲げてもかまいません。



③ とがった方から、やさしく入れましょう

坐薬のとがった方から、肛門にゆっくり
入れましょう。
入れにくい場合は、先端を少量の水で
ぬらすと入れやすくなることがあります。



とがった方から
入れましょう。

④ 入れたあとは、少し押さえましょう

坐薬が出てこないように、
肛門をしばらく押さえましょう。

しばらく
抱っこして
落ち着かせ
ましょう。



⚠ 坐薬が出てきてしまったら?

入れた直後に、坐薬がほとんど溶けずに出てきた
場合は、入れ直せることがあります。
坐薬が見当たらない、溶けている、時間がたっている
場合は、すでに薬が吸収されている可能性があるため、
自己判断で追加しないでください。
判断に迷ったら医師・薬剤師に相談しましょう。



自己判断で
追加しないように
しましょう。

薬剤師からのひとこと

坐薬の種類によって、使う間隔や順番が
異なります。
2種類以上使う場合や、半分に切って使う
場合も、指示を確認しましょう。



わからないことが
あれば、医師・薬剤師に
相談しましょう。

第5章｜副作用と安全

副作用かな？と思ったら



いつもと違う様子に気づいたら、
確認・記録・相談をしましょう。

1 いつもと違う症状はありませんか？

発疹、かゆみ、吐き気、下痢、強い眠気など、
薬を使ったあとに気になる変化がないか
確認しましょう。薬の副作用だけでなく、
病気そのものが原因の場合もあります。



2 気づいたことを記録しましょう

次のことをメモしておきましょう。

- 使った薬の名前と量
- 薬を使った時刻
- 症状が始まった時刻と、そのときの様子

発疹などは、写真を撮っておくのも役立ちます。



3 医師・薬剤師に相談しましょう

副作用が疑われたら、早めに相談しましょう。
次の薬を使うか、いったん中止するかは、
薬の種類や症状によって異なります。
自己判断で再開・減量などをせず、対応を確認しましょう。



! こんなときは、すぐに119番



息苦しい・呼吸が弱い・意識がおかしい・ぐったりして反応が悪い
などの症状があるときは、薬局への相談を待たずに救急車を呼んでください。

参考：PMDA「薬を使用して異常を感じたら」、
厚生労働省「こんな時は迷わず119へ」

第5章｜副作用と安全

アレルギーのサイン

皮膚だけでなく、呼吸や全身の様子にも注意しましょう



1 こんな症状に気づいたら

皮膚・顔

じんましん、かゆみ、
顔や唇の腫れ



呼吸

息苦しさ、ゼーゼーする、
声がかすれる



おなか・全身

繰り返す嘔吐、強い腹痛、
ぐったりする



2 急に症状が出たり、悪化したら

重いアレルギー反応（アナフィラキシー）の可能性があります。

じんましんがなくても、重いアレルギー反応は起こります。呼吸や意識の異常を見逃さないようにしましょう。



3 こんなときは、すぐに119番

- 息が苦しい、声がかすれる
- ぐったりしている、意識がおかしい
- 繰り返し吐き続ける、強い腹痛が続く

一つでもあれば、救急対応を優先してください。



ポイント

症状が軽くても、薬によるアレルギーが疑われたら次の使用前に医師・薬剤師へ相談しましょう。薬の名前、使用時刻、症状を記録しておくと役立ちます。



緊急性の高い症状の判断は、東京都「食物アレルギー緊急時対応ガイダンス」および埼玉県アレルギー疾患相談室の2026年8月公開資料を参考にしています。

第5章 | 副作用と安全

薬を間違って飲んだとき

あわてず安全を確認し、すぐに相談しましょう



1 まず、子どもの様子を確認しましょう

息苦しい、けいれんしている、意識がおかしい、
呼びかけても反応が悪い場合は、
すぐに119番へ通報してください。

2 無理に吐かせないでください



指を口に入れるなどして、無理に吐かせないでください。
水や牛乳を飲ませるなどの対応も、自己判断で行わず、
専門家の指示を受けてください。

3 何を、いつ、どれだけ飲んだか確認しましょう



薬の名前、飲んだ可能性のある量、時刻、
子どもの様子を確認しましょう。
薬袋や薬の容器、お薬手帳を手元に用意しましょう。

4 症状がなくても、すぐに相談してください



薬によっては、あとから症状が出ることもあります。
医療機関や中毒110番に早めに連絡し、対応を確認しましょう。

中毒110番（一般向け・24時間）

大阪中毒110番	つくば中毒110番
072-727-2499	029-852-9999

365日24時間対応、情報提供料無料（通話料は別）。
公益財団法人 日本中毒情報センター

第5章｜副作用と安全

薬の保管方法



薬は「子どもが取り出せない場所」に保管しましょう

1 子どもの手が届かない場所へ

高い場所に置くだけでは、踏み台などを使って取り出すことがあります。
鍵のかかる戸棚やチャイルドロックなどを活用しましょう。



2 薬に合った場所で保管しましょう

多くの薬は、高温・直射日光・湿気を避けて保管します。
冷蔵が必要な薬もありますので、薬袋や説明書の指示を確認しましょう。



高温・直射日光を避ける



高温を避ける



湿気を避ける



冷蔵が必要な薬もあります。



薬袋や説明書の指示を確認しましょう。

3 使ったら、すぐに片づけましょう

飲ませたあとや、薬を準備したあとは、必ず元の安全な場所へ戻してください。
食卓やバッグの中などに置きっぱなしにしないでください。



4 残った薬にも注意しましょう

以前もらった薬を、自己判断で再使用しないでください。
使用期限や保管状態がわからない薬は、薬剤師に相談しましょう。



薬剤師からのひとこと

子どもの薬だけでなく、大人の薬も安全な場所に保管しましょう。
祖父母の家や帰省先でも注意が必要です。



保管や誤飲防止の内容は、消費者庁、厚生労働省、PMDAの情報とも整合しています。
特に、鍵のかかる場所など複数の安全対策が推奨されています。

よくある質問①

熱が出たとき・抗菌薬を飲むとき

Q1 熱が出たら、必ず解熱薬を使うの？

A. 熱の高さだけで判断する必要はありません。

つらくて眠れない、水分がとりにくいなど、子どもの様子を見ながら、指示に従って使いましょう。

熱があっても、比較的元気で水分がとれている場合は、必ずしも解熱薬が必要とは限りません。



Q2 風邪をひいたら、抗菌薬を飲んだ方がいいの？

A. 風邪の多くはウイルスが原因なので、抗菌薬は効きません。

ただし、細菌による感染症では必要になる場合があります。医師の判断に従って使いましょう。

抗菌薬を使う場合は、指示された量・期間を最後まで飲み切ることが大切です。



よくある質問②

市販薬・残った薬・きょうだいの薬

Q1 病院の薬と市販薬を一緒に使ってもいい？

A. 使う前に、薬剤師に確認しましょう。

市販のかぜ薬や解熱薬には、処方薬と同じ成分が含まれていることがあります。
成分の重複や飲み合わせに注意しましょう。



Q2 前にもらった薬が残っているけど、使ってもいい？

A. 自己判断で使わず、医師・薬剤師に相談しましょう。

同じような症状でも、原因や必要な治療が違うことがあります。
以前の薬をそのまま使うのは避けましょう。



Q3 きょうだいに処方された薬を使ってもいい？

A. きょうだいの薬を使ってはいけません。

薬はその子の年齢・体重・症状などに合わせて処方されています。
同じ病気に見えても、適切な薬や量が異なることがあります。



薬剤師からのひとこと

市販薬を買うときも、お薬手帳を見せましょう。
今使っている薬を確認してもらうと安心です。



お薬手帳を活用しましょう

薬の記録と、気になったことをまとめておきましょう

1 お薬手帳とは？

使っている薬の情報をまとめておく手帳です。
複数の病院や薬局を利用していても、
薬の重複や飲み合わせなどを確認するのに
役立ちます。



2 こんなことも記録しておきましょう

- 薬を飲めなかったこと、飲み忘れたこと
- 発疹・眠気・吐き気など、気になった症状
- 市販薬やサプリメントの使用



3 受診するときは持っていきましょう

病院や薬局でお薬手帳を見せましょう。
医師・薬剤師が薬の情報を確認しやすくなり、
安全な治療に役立ちます。



記録の例

お薬手帳のメモ



10月20日　夕食後
粉薬を嫌がって、半分ほどしか
飲めなかった。
その後、発疹などは見られなかった。

薬剤師からのひとこと

紙のお薬手帳だけでなく、
電子お薬手帳も利用できます。
家族で情報を共有する場合は、
アプリの共有機能なども
活用しましょう。



かかりつけ薬局・薬剤師に相談しましょう



子どもの薬のことを、気軽に相談できる場所を見つけておきましょう

1 薬の情報をまとめて確認できます

複数の病院でもらった薬や、市販薬・サプリメントなどをまとめて確認し、飲み合わせや薬の重複について相談できます。



2 飲ませ方に困ったとき

「苦くて飲めない」「食品に混ぜてもいい？」「錠剤を砕いてもいい？」といった疑問も相談できます。
保育園や学校での服薬が難しい場合も、一緒に対応方法を考えられます。



3 気になる症状が出たとき

薬を飲んだあとに発疹や眠気、吐き気などが出た場合も相談できます。
必要に応じて、医師への相談や受診につなぎます。



相談するときにあると便利なもの



お薬手帳



薬袋


薬の名前


気になる症状や飲んだ時刻のメモ

薬剤師からのひとこと

いつも利用する薬局があると、これまでの薬の使い方や困った経験も踏まえて相談しやすくなります。
特別な契約がなくても、普段利用する薬局で薬の相談ができます。



困ったときの相談先



迷ったときは、状況に合った相談先を選びましょう

1 命にかかわる症状があるとき

呼吸がおかしい、意識がない、反応が悪い、けいれんが続くなど、緊急時はすぐに119番へ通報してください。

相談窓口への**電話を待たずに**、
救急車を呼んでください。



2 夜間・休日、受診に迷ったとき

子ども医療電話相談

子どもの急な病気やけがについて、
受診の必要性や家庭での対応を相談できます。
受付時間は都道府県によって異なります。



3 薬を誤って飲んだ・多く飲んだとき

症状がなくても、医療機関や中毒110番に
速やかに相談してください。



中毒110番（一般専用）

大阪	つくば
072-727-2499	029-852-9999

いずれも365日24時間対応。
情報提供料は無料（通話料は別）。

公益財団法人　日本中毒情報センター

4 薬の使い方・飲み合わせに困ったとき

普段利用する薬局・薬剤師に相談しましょう。
飲ませ方、飲み忘れ、薬の組み合わせ、
気になる症状などを相談できます。



もっと詳しく知りたいとき



子どもの薬や健康について、信頼できる情報を調べましょう

1 子どもの薬の使い方を知りたい



国立成育医療研究センター
National Center for Child Health and Development

国立成育医療研究センター「お薬Q&A」

子どもの薬の飲ませ方、解熱薬、残った薬などについて解説しています。

お薬Q&Aを開く

2 薬の情報や副作用を調べたい



pmda
独立行政法人
医薬品医療機器総合機構

医薬品医療機器総合機構（PMDA）「一般の方におすすめのコンテンツ」

薬の情報、使うときの注意、副作用、くすりQ&Aなどを調べられます。

PMDAの情報を開く

3 子どもの病気や家庭でのケアを知りたい





教えて！ドクター
こどもの病気とおうちケア

教えて！ドクター

発熱、咳、嘔吐など、家庭でのケアや受診の目安をわかりやすく解説しています。

教えて!ドクターを開く

4 緊急時・相談先を調べたい



厚生労働省
Ministry of Health, Labour and Welfare

厚生労働省 | 子ども医療電話相談 #8000

地域別の受付時間を確認できます。

地域別の受付時間を確認

公益財団法人
日本中毒情報センター

日本中毒情報センター | 中毒110番

薬を誤って飲んだ・多く飲んだときの相談先です。



中毒110番の情報を確認

大切なお知らせ

この冊子は、子どもの薬について一般的な情報をまとめたものです。薬の使い方は一人ひとり異なるため、処方された薬については、医師・薬剤師の説明を優先しましょう。



裏表紙

困ったら、ひとりで悩まず相談しましょう



薬の使い方で迷うことがあれば、
医師・薬剤師に相談しましょう。
子どもの様子に合った、無理のない方法を
一緒に探せます。



飲ませ方・使い方・困ったときのヒント

この冊子は、子どもの薬を安全に使うための
一般的な情報をまとめたものです。