

HOOFSTUK 3

Gewasse & Parameters

EC, pH en Nutriënt Vereistes per Gewas



Slaai
EC 1.2–1.8



Mosterd Spinach
EC 1.6–2.0



Aarbeie
EC 1.0–1.4

INHOUD VAN HIERDIE HOOFSTUK

Slaai (Lactuca sativa) — EC, pH & sorgvereistes	Bl. 2
Mosterd Spinach — EC, pH & sorgvereistes	Bl. 3
Aarbeie (Fragaria) — EC, pH & sorgvereistes	Bl. 4
Vinnige vergelykingstabel — alle gewasse	Bl. 5



Slaai

Lactuca sativa

Pyp 1 & 2

Kleurskaal:

Te laag / te hoog

Grensgebied

Optimaal

Optimale venster

⚡ EC — ELEKTRIESE GELEIDINGSVERMOË

1.2 – 1.8 mS/cm

00.51.01.21.82.53.03.5

🧪 PH — SUURGRAAD

5.8 – 6.2 pH

4.04.55.05.86.27.07.58.0

💧 WATERTEMPERATUUR

18–22°C

Ideaal vir wortels

🕒 OESDUUR

28–35 dae

Saailing tot oes

💧 VLOEITYD

15 min/uur

Dag & nag

☀️ LIG (UUR/DAG)

12–16 uur

Vol son of LED

🌱 PLANTGAT

50 mm

Netto pot deursnee

🌿 PLANTSPASIE

20–25 cm

Tussen plante

✅ Wenk: Laag hou EC in somer

Gedurende w arm maande kan EC verhoog na 2.0 mS/cm sonder skade, maar hou pH streng binne 5.8–6.2 — pH buite reeks blokkeer mangaan en yster opname, w at lei tot bleek ou blare.

⚠️ Waarskuwing: EC > 2.2 mS/cm

Hoë EC veroorsaak sout-stres by slaai — blare w ord bitter, groeipunt brand, en opbrengs daal. Verdun dadelik met skoon water tot 1.5 mS/cm.



NUTRIËNT PRIORITEITE VIR SLAAI

Makronutriënte (hoog)

Stikstof (N) · Kalium (K) · Kalsium (Ca) · Fosfaat (P)

Mikronutriënte (laag)

Yster (Fe) · Mangaan (Mn) · Sink (Zn) · Koper (Cu)

NFT A-Frame Handleiding

Hoofstuk 3 — Gewasse & Parameters

Bladsy 2



Mosterd Spinach

Brassica rapa / Spinacia oleracea

Pyp 3 & 4

Kleurskaal:

Te laag / te hoog

Grensgebied

Optimaal

Optimale venster

⚡ EC — ELEKTRIESE GELEIDINGSVERMOË

1.6 – 2.0 mS/cm

0

0.5

1.0

1.6 ▲

2.0 ▲

2.5

3.0

3.5

💧 PH — SUURGRAAD

6.0 – 6.8 pH

4.0

4.5

5.0

6.0 ▲

6.8 ▲

7.0

7.5

8.0

💧 WATERTEMPERATUUR

18–24°C

Tolereer effens warmer

🕒 OESDUUR

30–40 dae

Saailing tot eerste oes

💧 VLOEITYD

15 min/uur

Dag & nag

☀️ LIG (UUR/DAG)

10–14 uur

Halfskadu verdra

🌱 PLANTGAT

50 mm

Netto pot deursnee

🌿 PLANTSPASIE

20–30 cm

Groter blare nodig ruimte

✅ Wenk: Gereelde sny verhoog opbrengs

Sny buitenste blare elke 7–10 dae — die plant bly produktief vir 8–10 weke in NFT. Moenie die groeipunt sny nie.

🚫 Moenie EC onder 1.4 laat sak nie

Mosterd Spinach benodig 'n sterker voedingoplossing as slaai. EC < 1.4 lei tot bleekgroen blare en stadige groei. Voeg A+B voedingstof by.



NUTRIËNT PRIORITEITE VIR MOSTERD SPINACH

Makronutriënte (hoog)

Stikstof (N) · Kalsium (Ca) · Magnesium (Mg) · Kalium (K)

Let op: Yster opname

pH > 6.8 blokkeer Fe-opname — blare w ord geel. Verlaag pH dadelik met fosforsuur.

NFT A-Frame Handleiding

Hoofstuk 3 — Gewasse & Parameters

Bladsy 3



Aarbeie

Fragaria × ananassa

Pyp 5

Kleurskaal:

Te laag / te hoog

Grensgebied

Optimaal

Optimale venster

⚡ EC — ELEKTRIESE GELEIDINGSVERMOË

1.0 – 1.4 mS/cm

00.51.0▲1.4▲1.82.53.03.5

🧪 PH — SUURGRAAD

5.5 – 6.0 pH

4.04.55.5▲6.0▲6.57.07.58.0

💧 WATERTEMPERATUUR

15–20°C

Koel vir bessie-kwaliteit

🕒 EERSTE VRUG

60–90 dae

Van saailing tot vrug

💧 VLOEITYD

10 min/uur

Minder as blaargroente

🌞 LIG (UUR/DAG)

8–12 uur

Kort dag bevorder blom

🌱 PLANTGAT

75 mm

Groter pot vir wortels

🌿 PLANTSPASIE

25–30 cm

Uitlopers benodig ruimte

✓

Wenk: Verhoog EC tydens vrugset

Sodra blomme verskyn (week 6–8), verhoog EC stadig na 1.6–1.8 mS/cm vir soeter, groter bessies. Verlaag terug na 1.0–1.4 na oes.

⚠️

Aarbeie is die sensitiefste gewas

Aarbeie reageer vinnigste op verkeerde pH — pH > 6.2 blokkeer fosfaat opname en veroorsaak donker, geharde wortels. Kontroleer pH twee keer per dag tydens blomtyd.



NUTRIËNT PRIORITEITE VIR AARBEIE

Blom- & Vrugfase (week 6+)

Verhoog Kalium (K) en Kalsium (Ca) · Fosfaat (P) vir blomknop · Verminder N effens

Aparte tenk — baie belangrik

Aarbeie benodig 'n aparte tenk van blaargroente omdat hulle 'n ander EC en pH nodig het.

NFT A-Frame Handleiding

Hoofstuk 3 — Gewasse & Parameters

Bladsy 4




VINNIGE VERGELYKINGSTABEL — ALLE GEWASSE

GEWAS	EC (MS/CM)	PH	WATERTEMP	OESDUUR	PYPE	MOEILIKHEID
Slaai	1.2 – 1.8	5.8 – 6.2	18–22°C	28–35 dae	1 & 2	Maklik
Mosterd Spinach	1.6 – 2.0	6.0 – 6.8	18–24°C	30–40 dae	3 & 4	Maklik
Aarbeie	1.0 – 1.4	5.5 – 6.0	15–20°C	60–90 dae	5	Gemiddeld




VISUELE REEKS — VERGELYKING

⚡ EC REEKS PER GEWAS (0 – 3.5 MS/CM)



🧪 PH REEKS PER GEWAS (4.0 – 8.0)



Onthou: Elke kant het sy EIE tenk

Kant 1 & 2 (Slaai) → EC 1.2–1.8 · pH 5.8–6.2 · Tenk A
Kant 3 (Aarbeie) → EC 1.0–1.4 · pH 5.5–6.0 · Tenk C
Kant 4 (Mosterd) → EC 1.6–2.0 · pH 6.0–6.8 · Tenk B