

# Problema 11: Sales de Joc

Víctor Alcázar      Kosmas Palios      Albert Ribes

7 d'abril de 2017

## 11. Sales de Joc

La societat d'Amics dels Videojocs (SAV) té una col·lecció de  $m$  locals a la ciutat de Barcelona i un total de  $n$  socis. Volen determinar en quins locals els hi convé obrir una sala de joc juntament amb una assignació de socis a les sales de joc.

La SAV per una part ha fet una estimació del cost d'adequar un local com a sala de joc i així, per cada local  $i$  té una estimació del cost  $l_i$ . Per una altra part, la SAV vol tenir en compte el cost que té per als socis desplaçar-se fins el local assignat. Així disposa dels valors  $c(i, j)$  que indiquen la distància que habitualment el soci  $i$  ha de recorre per arribar al local  $j$ .

L'objectiu de la SAV és trobar una solució en la que es minimitzi la suma dels costos d'adequació dels locals seleccionats més al suma de les distàncies dels desplaçaments dels socis a les sales assignades.

**Q1** Doneu una formalització com problema de programació entera d'aquest problema. Feu servir una variable  $x_j$  per la selecció del local  $j$  i una variable  $y_{ij}$  per la possible assignació del soci  $i$  al local  $j$ .

Considereu el problema de programació lineal obtingut després de relaxar les condicions d'integritat. Sigui  $x^*$ ,  $y^*$  una solució òptima del programa relaxat.

Considereu el següent procés:

- (a) Per cada soci  $i$ , sigui  $\tilde{c}_i = \sum_j c(i, j) y_{ij}^*$  la distància mitjana del soci  $i$  a les sales assignades en  $y^*$ .
- (b) Per cada soci  $i$ , sigui  $S_i = \{j | c(i, j) \leq 2\tilde{c}_i\}$ .
- (c) Per  $i, j$ , if  $j \notin S_i$ , sigui  $\tilde{y}_{ij} = 0$ , en cas contrari  $\tilde{y}_{ij} = y_{ij}^* / \sum_{j \in S_i} y_{ij}^*$ .
- (d) Per cada local  $j$ , sigui  $\tilde{x}_j = \min(2x_j^*, 1)$ .

**Q2** Demostreu que, per tot  $i$  i tot  $j$ ,  $\tilde{y}_{ij} \leq 2y_{ij}^*$ .

**Q3** Demostreu que  $\tilde{x}$ ,  $\tilde{y}$  és una solució factible del problema de programació lineal i que  $\sum_{i,j} c(i, j) \tilde{y}_{ij} \leq 2 \sum_{i,j} c(i, j) y_{ij}^*$ .

Ara, donats  $\tilde{x}$ ,  $\tilde{y}$ , considereu el següent procés, mentre quedin socis sense assignar a una sala:

- (a) Seleccioneu el soci  $i$  no assignat amb  $\tilde{c}_i$  mínim

- (b) Obrim una sala de joc al local  $j$  que minimitzi el valor  $\min_{j \in S_i} l_i$
- (c) Assignem el soci  $i$  a la sala  $j$ .
- (d) Tots els socis  $i'$  tals que  $S_i \cap S_{i'} \neq \emptyset$  s'assignen a la sala  $j$ .

**Q4** Demostreu que la solució així obtinguda és una 6 aproximació per al problema plantejat.