

Problema 2. Funcions d'error per classificació [G]

Gerard Barrachina Josep de Cid Albert Ribes
Kerstin Winter

30 de noviembre de 2017

L'objectiu dels models probabilístics discriminatius per classificació és modelar les probabilitats a posteriori $P(C_k|x)$ per a cada classe k . En tasques de classificació binària (dues classes, C_1 i C_2), modelem amb una funció $y(x) = P(C_1|x)$; llavors $1 - y(x) = P(C_2|x)$. Tenim una mostra aleatòria simple D de llargada N del mecanisme $p(t, x)$, que escrivim $D = \{(x_1, t_1), \dots, (x_N, t_N)\}$, on $x_n \in \mathbb{R}^d$ i $t_n \in \{0, 1\}$. Prenem la convenció que $t_n = 1$ indica $x_n \in C_1$ i $t_n = 0$ indica $x_n \in C_2$, i modelem:

$$P(t|x) = \begin{cases} y(x) & \text{si } x_n \in C_1 \\ 1 - y(x) & \text{si } x_n \in C_2 \end{cases}$$

que pot ser més convenientment expressat com $P(t|x) = y(x)^t(1 - y(x))^{1-t}$, $t \in \{0, 1\}$. Aquesta és una distribució de Bernoulli, la qual cosa permet d'obtenir una funció d'error amb criteris ben fonamentats.

1. Construiu la funció log-versemblança de la mostra i proposeu una funció d'error a partir d'ella.

Asumiendo que los datos son independientes e idénticamente distribuidos, la probabilidad de haber observado los datos D es

$$\begin{aligned} P(t_1|x_1)P(t_2|x_2)\dots P(t_n|x_n) &= \prod_{i=1}^N P(t_i|x_i) \\ &= \prod_{i=1}^N y(x_i)^{t_i}(1 - y(x_i))^{1-t_i} \end{aligned}$$

Puesto que se trata de un problema de clasificación, modelaremos $y(x)$ como $g(w^T x + w_0)$, donde g es la función logística, que se define como $g(z) = \frac{1}{1 + \exp(-z)}$. Para simplificar la notación añadiremos a x el elemento 1 al principio y juntaremos el vector w con w_0 para definir nuestra función como $y(x) = g(w^T x)$

La función log-verosimilitud debe maximizar la probabilidad de haber observado los datos D , y debe hacerlo mediante el parámetro w . Para simplificar los cálculos se trabaja con el logaritmo natural de esa probabilidad, que no afecta en los parámetros

que la maximizan. De este modo podemos definir la función log-verosimilitud como:

$$\begin{aligned}
 l(D, w) &= \ln \prod_{i=1}^N g(w^T x_i)^{t_i} (1 - g(w^T x_i))^{(1-t_i)} \\
 &= \sum_{i=1}^N \ln(g(w^T x_i)^{t_i} + \ln(1 - g(w^T x_i))^{(1-t_i)}) \\
 &= \sum_{i=1}^N t_i \ln g(w^T x_i) + (1 - t_i) \ln(1 - g(w^T x_i))
 \end{aligned}$$

Entonces una buena función de error sería menos log-verosimilitud, i.e:

$$\begin{aligned}
 E(D; w) &= -l(D; w) \\
 &= -\sum_{i=1}^N t_i \ln g(w^T x_i) + (1 - t_i) \ln(1 - g(w^T x_i))
 \end{aligned}$$

2. Generalitzeu el resultat a un número arbitrari $K \geq 2$ de classes.

Puesto que ahora tenemos más clases, será necesario un cambio en la notación.

Definimos $y_k(x)$ como la probabilidad de que el dato x pertenezca a la clase k , i.e: $y_k(x) \equiv P(C_k|x)$.

Ahora $t_n \in \{1, 2, \dots, K\}$, y por lo tanto definiremos la matriz

$$T = \begin{matrix} & \begin{matrix} C_1 & C_2 & \dots & C_K \end{matrix} \\ \begin{matrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_N \end{matrix} & \begin{bmatrix} t_{11} & t_{12} & \dots & t_{1K} \\ t_{21} & t_{22} & \dots & t_{2K} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ t_{N1} & t_{N2} & \dots & t_{Nk} \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Donde t_{ij} es 1 si $x_i \in C_k$ y es 0 si $x_i \notin C_k$.

Para no confundir la notación, redefinimos la muestra de datos como $D = \{(x_1, z_1), (x_2, z_2), \dots, (x_N, z_N)\}$, donde $z_n \in \{1, 2, \dots, K\}$

Ahora ya no tenemos un solo vector w , sino que tenemos uno por cada clase. Definimos entonces la matriz

$$W = \begin{matrix} & \begin{matrix} w_0 & w_1 & \dots & w_d \end{matrix} \\ \begin{matrix} C_1 \\ C_2 \\ \vdots \\ C_K \end{matrix} & \begin{bmatrix} w_{10} & w_{11} & \dots & w_{1d} \\ w_{20} & w_{21} & \dots & w_{2d} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ w_{K0} & w_{K1} & \dots & w_{Kd} \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Entonces el modelo que definimos es

$$y_k(x) = g(W_k x)$$

Donde W_k es la fila k de la matriz W

Ahora podemos definir

$$P(z|x) = y_z(x)$$

Que por mantener la notación del apartado anterior también se podría definir como

$$P(z|x) = \prod_{k=1}^K y_k(x)^{t_{kz}}$$

Entonces la probabilidad de haber observado los datos D es

$$\begin{aligned} P(z_1|x_1)P(z_2|x_2)\dots P(z_N|x_N) &= \prod_{i=1}^N P(z_i|x_i) \\ &= \prod_{i=1}^N y_{z_i}(x_i) \\ &= \prod_{i=1}^N \prod_{k=1}^K y_k(x_i)^{t_{kz_i}} \end{aligned}$$

Y la función log-verosimilitud se puede definir como

$$\begin{aligned} l(D;W) &= \sum_{i=1}^N \ln y_{z_i}(x_i) \\ &= \sum_{i=1}^N \ln g(W_{z_i} \cdot x_i) \end{aligned}$$

Entonces la función de error propuesta es

$$\begin{aligned} E(D;W) &= -l(D;W) \\ &= -\sum_{i=1}^N \ln g(W_{z_i} \cdot x_i) \end{aligned}$$