Adrianacica
Adriana Cipagauta Castro
0000397291



Meatos

1. Meato superior
   → Es el mas pequeño y se situa debajo del corneta superior
   → Es el pasillo mas alto y pequeño.
   → ¿Que drena? Moco de las cavidades mas profundas
   → Drenaje: en él desembocan las celdillas etmoidales posteriores
   * Nota: Justo por encima y detras del corneta superior se encuentra el receso esfenoetmoidal donde drena el seno esfenoidal
     ↳ no es tecnicamente un [illegible], sino un pequeño espacio por encima del corneta superior.
2. Meato medio
   → Es de gran importancia clínica debido a la complejidad de las estructuras que alberga. Se encuentra debajo del corneta medio.
   → ¿Que drena? Moco de 3 cavidades distintas
   → Drenaje
     - Seno frontal → a través del infundibulo etmoidal
     - Seno maxilar → a través del hiato semilunar
     - Celdillas etmoidales anteriores y medias → las medias suelen drenar directamente en la bulla etmoidal
3. Meato inferior
   → Es el mas largo de los 3 y se ubica debajo del corneta inferior, extendiendose por el piso de la cavidad nasal
   → Drenaje: aquí desemboca exclusivamente el conducto nasolagrimal, que transporta las lagrimas desde el ojo hacia la nariz → por eso moqueamos al llorar