

Notas de aula: Fundamentos Estatísticos para Ciência dos Dados

Ricardo Pagoto Marinho

5 de abril de 2018

- 13/03

$P(\cup A_i) \leq \sum P(A_i) \rightarrow$ é igual quantos os A_i s forem disjuntos.

- 15/03

$P(A|B) = P(B) \rightarrow$ quando A ocorre e não tem nenhuma influência sobre B_0 .

- 20/03

Variável aleatória: Lista de valores possíveis e lista de probabilidades associadas

ω dentro de um Ω . Exemplo: Ω = todos e-mails enviados.

- ω_0 = é spam?
- ω_1 = número de caracteres.
- ...

Elementos em uma mesma linha (ω_n), são correlacionados.

- Atribuir valores de probabilidades a uma V.A. \rightarrow contar quantos elementos no Ω possuem aquela característica.

$P(X = 3) = P(A)$ onde $A = \{\omega \in \Omega / \omega \text{ tem } 3 \text{ caras}\}$ em Ω = lançamento de 6 moedas.

- Esperança matemática $E(X)$

$$E(X) = \sum_i x_i p(x_i) \approx \sum_i x_i \times \frac{N_i}{N}$$

- Distribuição Binomial

$$P(X = 0) = (1 - \theta)^n$$

$$[X = 0] = \{\omega \in \Omega : X(\omega) = 1\} = \{\omega \in \Omega : \omega \in \{(\neg c, \neg c, \neg c, \dots, \neg c)\}\} = P(\neg c \text{ no } 1^\circ) \times P(\neg c \text{ no } 2^\circ) \times \dots = (1 - \theta) \times (1 - \theta) \dots = (1 - \theta)^n$$

- 27/03

$$P(Y \in (y_0 \pm \frac{\delta}{2})) = \int_{y_0 - \frac{\delta}{2}}^{y_0 + \frac{\delta}{2}} f^*(y) dy \approx f^*(y_0) 2 \times \frac{\delta}{2} = f^*(y_0) \times \delta$$

Teste de Kolmogorov:

$\sqrt{n}(D_n) \rightarrow K$, onde K é uma Variável Aleatória contínua.

Se o modelo é o verdadeiro, quando comparado com os dados, a distância entre eles multiplicado por \sqrt{n} vai cair dentro da densidade de K. Se não cair, provavelmente seu modelo não é adequado. Quanto maior o número de dados, mais confiável o resultado.

- 03/04

Variáveis aleatórias: Lista de valores possíveis + probabilidades associadas

	Discretas	Contínuas
Valores	0,1,2,...	[0,1] ou [0,∞)
Probabilidades	p_0, p_1, p_2, \dots	Densidade sob a curva

	$E(X)$
Discreta	$\sum_i x_i \times P(X = x_i)$
Contínua	$\int x \times f(x) dx$

Teste qui-quadrado: Compara o modelo com os dados. Serve para dados contínuos e discretos.

`pchisq(15,4)`-`pchisq(10,4)` → comando em R para saber o valor do teste qui-quadrado no intervalo [10,15] com 4 graus de liberdade.

`pchisq(1.13,4)` → probabilidade de uma distribuição qui-quadrado com 4 graus de liberdade ser menor do que 1.13.

`1-pchisq(1.13,4)=pvalors`

- 05/04

As variáveis são i.i.d. (independentes e identicamente distribuídas) se:

- elas forem todas independentes
- possuírem todas a mesma distribuição

– Transformação de V.A.s

X é V.A.

$Y=g(X)$ é V.a.

$g(X)$ é função matemática.

Distribuição de Y ?

* inverter g : Obter $F_y(y) = P(Y \leq y)$ e deriva para obter a densidade $f_y(Y) = F'(y)$

* $Y=g(X)$ e $X = g^{-1}(Y) = h(Y)$

então $f_y(y) = f_x(h(y)) \cdot |h'(y)|$

Exemplo: $f_x(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x \ni (0, 1) \\ 1, & \text{se } x \in (0, 1) \end{cases}$

$Y = X^2 \rightarrow X = \sqrt{Y} = h(Y)$

Então:

$f_y(y) = f_x(\sqrt{y}) \times \left| \frac{d\sqrt{y}}{dy} \right|$

Se quisermos $E(Y) = E(g(x))$

1. $E(Y) = \int y f_Y(y) dy$ ($f_Y(y)$ é obtida de uma das duas maneiras anteriores)

2. $= \int_{-\infty}^{\infty} g(x) \times f_x(x) dx$