

Resumo: Fundamentos Estatísticos para Ciência dos Dados

Ricardo Pagoto Marinho

5 de abril de 2018

- Regra de Bayes Inverte as probabilidades de interesse.

Exemplo:

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(B|A)\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B)}$$

- Função distribuição acumulada de probabilidade $\mathbb{F}(x)$ definida $\forall x \in \mathbb{R}$ é dada por:

$$\begin{aligned} \mathbb{F} : \mathbb{R} &\rightarrow [0, 1] \\ x &\rightarrow \mathbb{F}(x) = \mathbb{P}(X \leq x) \end{aligned}$$

Caso geral de $\mathbb{F}(x)$

$$\mathbb{F}(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \sum_{x_i \leq x} p(x_i)$$

- Esperança matemática ($\mathbb{E}(X)$)

O valor esperado de uma V.A. discreta é a soma de seus valores possíveis ponderados pelas suas probabilidades respectivas.

$$\mathbb{E}(X) = \sum_i x_i p(x_i)$$

Suponha que numa amostra grande de instâncias, x_i apareceu N_i vezes. A probabilidade de x_i ocorrer na amostra é sua frequência relativa, *i.e.*:

$$p(x_i) = \mathbb{P}(X = x_i) \approx \frac{N_i}{N}$$

Logo:

$$\mathbb{E}(X) = \sum_i x_i p(x_i) \approx \sum_i x_i \frac{N_i}{N}$$

Se a amostra for grande, o número teórico $\mathbb{E}(X)$ é aproximadamente igual à média aritmética dos N elementos da amostra.

- Distribuição de Bernoulli É a distribuição mais simples: dois resultados possíveis $X(\omega) \in \{0, 1\} \forall \omega \in \Omega$

Duas probabilidades são definidas:

- $p(0) = \mathbb{P}(X = 0) = \mathbb{P}(\omega \in \Omega : X(\omega) = 0)$
- $p(1) = \mathbb{P}(X = 1) = \mathbb{P}(\omega \in \Omega : X(\omega) = 1)$

$$p(0) + p(1) = 1 \rightarrow p(1) = 1 - p(0)$$

É comum escrever $p(1) = p$ e $p(0) = q$. Daí, $\mathbb{E}(X) = 1 \times p + 0 \times (1-p) = p$

Como a média aritmética dessa distribuição é a proporção de 1's na amostra:

$$\mathbb{E}(X) \approx \hat{p} = \frac{1}{N} \sum_i x_i$$

- Distribuição Binomial

Frequentemente utilizada quando um número máximo possível grande de n de repetições e θ muito pequeno.

n repetições independentes de um experimento de Bernoulli: sucesso ou fracasso. Probabilidade de sucesso é igual a $\theta \in [0, 1]$

A V.A. X conta o número total de sucessos: $X \sim \text{Bin}(n, \theta)$. Os valores possíveis são: $0, 1, 2, \dots, n$ e suas probabilidades, respectivamente são: $(1 - \theta)^n, n\theta(1 - \theta), \dots, \theta^n$

Exemplo: n lançamentos de uma moeda não viciada.

$$\text{Cara} \rightarrow C$$

$$\text{Coroa} \rightarrow \tilde{C}$$

$$P(X = 0) = (1 - \theta)^n$$

$$[X = 0] = \{\omega \in \Omega : X(\omega) = 0\} = \{\omega \in \Omega : \omega \in \{(\tilde{C}, \tilde{C}, \tilde{C}, \dots, \tilde{C})\}\} = P(\tilde{C} \text{ no } 1^\circ) \times P(\tilde{C} \text{ no } 2^\circ) \times \dots = (1 - \theta) \times (1 - \theta) \dots = (1 - \theta)^n$$

– Fórmula geral:

$$\mathbb{P}(Y = k) = \frac{n!}{k!(n-k)!} \theta^k (1 - \theta)^{n-k}$$

$$- \mathbb{E}(Y) = n\theta \text{ e } \text{DP} = \sqrt{\mathbb{V}(Y)} = \sqrt{n\theta(1 - \theta)}$$

- Distribuição Multinomial

Mais de duas categorias de resultados nos experimentos, diferente da Binomial que são só duas (1 ou 0). Ao fim de n lançamentos, teremos um vetor aleatório multinomial que conta quantas vezes cada categoria apareceu no experimento. Temos k categorias:

$$(N_1, N_2, \dots, N_k) \sim \mathbb{M}(n; \theta_1, \dots, \theta_k)$$

Sendo que $\theta_1, \dots, \theta_k$ são as probabilidades de cada categoria.

Exemplo: lançamento de um dado. $k = 6$

$$\begin{aligned} N_1 &= n^\circ \text{ de lanamentos na categoria 1} \\ N_2 &= n^\circ \text{ de lanamentos na categoria 2} \\ N_3 &= n^\circ \text{ de lanamentos na categoria 3} \\ &\vdots \\ N_6 &= n^\circ \text{ de lanamentos na categoria 6} \end{aligned}$$

$$(N_1, N_2, \dots, N_6) \sim \mathbb{M}(n; \theta_1, \dots, \theta_6)$$

Podemos escrever a Binomial como uma Multinomial de duas categorias: sucesso e fracasso. X é o número de sucessos em n repetições.

$$(X, n - X) \sim \mathbb{M}(n; \theta, 1 - \theta)$$

A probabilidade de ocorrer uma configuração do vetor aleatório é:

$$\mathbb{P}(\mathbf{N} = (n_1, n_2, \dots, n_k)) = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!} \theta_1^{n_1} \theta_2^{n_2} \dots \theta_k^{n_k} \quad (1)$$

Exemplo: 8 lançamentos de um dado. A probabilidade de:

$$\mathbb{P}(\mathbf{N} = (2, 0, 2, 1, 0, 3))$$

Existem várias configurações de ω as quais 8 lançamentos levam ao resultado acima. Uma é $\omega = (3, 1, 6, 6, 1, 4, 6, 3)$. Logo:

$$\mathbf{N}(\omega) = (N_1(\omega), N_2(\omega), \dots, N_6(\omega)) = (2, 0, 2, 1, 0, 3)$$

A probabilidade de sair essa configuração, levando em conta que os lançamentos são independentes é:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\omega = (3, 1, 6, 6, 1, 4, 6, 3)) &= \mathbb{P}(\text{sair 3 no } 1^\circ \text{ E sair 1 no } 2^\circ \text{ E } \dots \text{ sair 3 no } 8^\circ) \\ &= \mathbb{P}(\text{sair 3 no } 1^\circ) \mathbb{P}(\text{sair 1 no } 2^\circ) \dots \mathbb{P}(\text{sair 3 no } 8^\circ) \\ &= \theta_3 \theta_1 \theta_6 \theta_6 \theta_1 \theta_4 \theta_6 \theta_3 \\ &= \theta_1^2 \theta_2^0 \theta_3^2 \theta_4^1 \theta_5^0 \theta_6^3 \end{aligned}$$

Se a sequência ω tiver n lançamentos:

$$\begin{aligned} n_1 &\text{ aparies da face1} \\ n_2 &\text{ aparies da face2} \\ &\vdots \\ n_6 &\text{ aparies da face6} \end{aligned}$$

Teremos:

$$\mathbb{P}(\omega) = \theta_1^{n_1} \theta_2^{n_2} \theta_3^{n_3} \theta_4^{n_4} \theta_5^{n_5} \theta_6^{n_6}$$

Dessa forma, seja A o evento formado por todos os ω tais que $\mathbb{P}(\mathbf{N} = (2, 0, 2, 1, 0, 3))$

$$\mathbb{P}(\mathbf{N} = (2, 0, 2, 1, 0, 3)) = \mathbb{P}(A) = \sum_{\omega \in A} \mathbb{P}(\omega) = c \times \theta_1^2 \theta_2^0 \theta_3^2 \theta_4^1 \theta_5^0 \theta_6^3$$

Onde c é o número de sequências de tamanho 8 tais que $\mathbb{P}(\mathbf{N} = (2, 0, 2, 1, 0, 3))$ c é o número de permutações do vetor $\omega = (3, 1, 6, 6, 1, 4, 6, 3)$.

Generalizando para k categorias, temos:

$$\mathbf{N} = (N_1, N_2, \dots, N_k) \sim \mathbb{M}(n; \theta_1, \dots, \theta_n)$$

Então, chegamos na Equação 1.

- Distribuição de Poisson.

Frequentemente utilizada em situações onde o número de ocorrências não tem um limite claro para o limite.

$$\mathbb{P}(Y = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

$$\mathbb{E}(Y) = \lambda$$