


 **Riccardo Bruno (ETÀ: 25)**

Esame del:
19/12/2024 11:29

Sesso:	Maschile	Peso:	82.4 kg	Idratazione tissutale:	73.2% (TBW/FFM)	RZ:	401.8 Ω	BMI:	26.2 kg/m²
Data di nascita:	25/11/1999	Altezza:	177.5 cm	Indice nutrizionale (CHI):	1279.3 (mg 24h/htm)	XC:	57.8 Ω		

Biavector®: analisi qualitativa

Biavector® Bodygram Standard



Stime: analisi quantitativa

Riferimenti su altezza Riferimenti su peso (%)

Parametro	Risultato esame	%	Valori di riferimento	Differenza dal valore medio
Peso obiettivo	63.3 kg			
Angolo di Fase (PhA)	8.2 °		5.1 5.9 6.7 7.5 8.3 9.1 9.9	0.7 °
Acqua Totale (TBW)	51.8 L	62.9 %	49.0 55.0 59 64.0 71.0	3.9 %
Acqua Extra Cellulare (ECW)	19.4 L	37.5 %	20.0 30.0 38.0 42 45.0 55.0 65.0	-4.5 %
Acqua Intra Cellulare (ICW)	32.4 L	62.5 %	35.0 45.0 55.0 58 62.0 70.0 80.0	4.5 %
Massa Magra (FFM)	70.8 kg	85.9 %	73.2 75.0 78.1 81.8 84.8 87.6 89.0	4.1 %
Massa Grassa (FM)	11.6 kg	14.1 %	11.0 12.4 15.2 18.2 21.9 25.0 26.8	-4.1 %
Massa Cellulare (BCM)	44.7 kg	63.1 %	25.0 50.0 60 70.0	3.1 %
Massa Muscolare Totale (MM)	53.7 kg	65.2 %		
Massa Muscolo-Scheletrica (SMM) Janssen	38.6 kg	46.8 %	29.1 33.5 37.9 42.3 46.7 51.1 55.5	4.5 %
Massa Muscolare Appendicolare (ASMM)	29.5 kg		16.9 21.1 25.3 28.3 31.1 35.3 39.5	1.2
Metabolismo Basale (BMR)	2046.3 kcal			
Dispendio Energetico Giornaliero Totale (TDEE)	3478.7 kcal			
Na/K	0.9		0.5 0.9 0.9 1.0 1.5	

Peso obiettivo

Questo valore esprime il peso desiderabile che viene calcolato dall'indice di massa corporea obiettivo, impostato dal professionista nella configurazione del software secondo la formula Peterson CM, et al. Am J Clin Nutr. 2016 May;103(5):1197-203.

Angolo di Fase (PhA)

L'angolo di fase esprime la proporzione tra gli spazi intra ed extracellulari, descrive proprietà sulla qualità della cellula e viene utilizzato in clinica come indice prognostico per le patologie croniche. In un soggetto adulto sano il valore normale di angolo di fase è compreso tra valori di 5 e 7 gradi.

Acqua Totale (TBW)

Rappresenta il principale componente del nostro organismo: è il compartimento che rappresenta i fluidi corporei totali presenti nel corpo. È espressa come percentuale rispetto al peso corporeo; questo compartimento tende a diminuire con l'età, a causa della perdita fisiologica di FFM.

Acqua Extracellulare (ECW)

L'Acqua Extra Cellulare (ECW) è composta dai fluidi all'esterno delle cellule. È localizzata principalmente nello spazio interstiziale fra le cellule, all'interno dei vasi sanguigni, nei tessuti linfatici e nel liquido spinale.

Acqua Intra Cellulare (ICW)

La Massa Intracellulare (ICW) viene calcolata come TBW-ECW. Rappresenta i fluidi ricchi di potassio all'interno delle cellule. Il suo volume è compreso tra il 55-70% della acqua totale in funzione dello stato di nutrizione.

Massa Magra (FFM)

La Massa Magra è il compartimento contenente tutto ciò che non è grasso corporeo: comprende lo scheletro, circa il 73% dei fluidi corporei, muscoli, pelle ed organi. Una buona forma fisica presuppone un valore di FFM compresa tra il 77-85% rispetto al peso corporeo, in funzione dall'età del soggetto.

Massa Grassa (FM)

La Massa Grassa (FM) è un composto costituito dal glicerolo, una sostanza formata dagli acidi grassi, che è utilizzata come concentrato di energia per i muscoli. Una certa quantità di grasso è quindi necessaria sia come riserva energetica sia per il corretto svolgimento dei processi vitali. Un'altra piccola quantità, denominata grasso essenziale, ha una funzione di protezione degli organi interni, ma è importante che questo accumulo non oltrepassi i limiti fisiologici. Una buona forma fisica presuppone un valore di FM del 15-23% rispetto al peso corporeo dipendendo dall'età del soggetto.

Massa Cellulare Corporea (BCM)

È la parte metabolicamente attiva dell'organismo che espleta tutto il lavoro funzionale, e il 'motore' del corpo in cui avvengono tutti i principali processi metabolici: dal consumo di ossigeno, l'ossidazione del glucosio, alla sintesi delle proteine. È la parte viva ed attiva dell'organismo, un compartimento di cui il corpo umano dovrebbe essere dotato in abbondanza.

Massa Muscolare Totale (MM)

La Massa Muscolare totale rappresenta la stima della quantità degli oltre 650 muscoli presenti nel corpo umano. La MM correla con la funzionalità fisica e con lo stato di salute del soggetto ed è coinvolta in molti processi collegati alla fisiologia, nutrizione, trattamenti medici, prevenzione di malattie e riabilitazione a lungo termine. Nel soggetto sano adulto, la MM rappresenta il 25% - 45% del peso in funzione del genere e della età. Nel soggetto sportivo o atleta la quantità può arrivare al 50-70% del peso. I soggetti anziani tendono a perdere fisiologicamente una porzione della massa muscolare, soprattutto negli arti inferiori.

Massa Muscolo-Scheletrica (SMM) Janssen

La Massa Muscolare Scheletrica rappresenta circa il 70% della massa muscolare totale (MM). La SMM correla con la funzionalità fisica e con lo stato di salute del soggetto.

Massa Muscolare Appendicolare (ASMM)

La Massa Muscolare Scheletrica Appendicolare rappresenta il 75% della Massa Muscolare Scheletrica (SMM) ed è definita come la somma dei muscoli degli arti superiori ed inferiori. Una riduzione dell'ASMM porta a conseguenze negative sulla salute come debolezza, disabilità, un peggioramento della qualità della vita.

Metabolismo Basale (BMR)

Il metabolismo basale (BMR), dall'inglese Basal Metabolic Rate, è il dispendio energetico di un organismo a riposo. Il BMR comprende l'energia necessaria per le funzioni metaboliche vitali (respirazione, circolazione sanguigna, digestione, attività del sistema nervoso, ecc.).

Dispendio Energetico Giornaliero Totale (TDEE)

È l'acronimo di Total Daily Energy Expenditure (dispendio energetico giornaliero totale). È quindi la somma del metabolismo basale (BMR) e dell'attività fisica muscolare (PAL), assumendo come marginale il dispendio della termoregolazione e termogenesi.

Rapporto Na/K

Il rapporto Na/K scambiabile, è un parametro calcolato indirettamente dalla BCM e ECM. Tuttavia, variazioni simultanee di questi due parametri non si traducono in variazioni individuabili, oltre che non essere informativo in determinati profili, come i soggetti obesi. La letteratura scientifica a supporto di questo parametro è datata e scarsa. Il Biavector e l'angolo di fase, che derivano da dati bioelettrici puri, hanno sostituito nei decenni questo parametro, offrendo una valutazione più accurata dello stato di idratazione e l'integrità delle membrane cellulari. Per questa ragione, Akern non raccomanda l'uso di questo parametro nella valutazione della composizione corporea.