

鼠疫



鼠疫（plague）是鼠疫杆菌借鼠蚤传播为主的烈性传染病系广泛流行于野生啮齿动物间的一种自然疫源性疾病。临床上表现为发热、严重毒血症症状淋巴结肿大、肺炎、出血倾向等。鼠疫在世界历史上曾有多次大流行，1992 年全世界报告发生人间鼠疫的有巴西、中国马达加斯加、蒙古、缅甸秘鲁、美国、越南及扎伊尔等 9 个国家共 1582 例，病人大多集中在非洲，病死率为 8.7%。

灾区群众预防鼠疫注意事项

时间：2010-04-20 字体：大中小

一、灾区地处喜马拉雅旱獭鼠疫疫源地，接触旱獭、特别是病死旱獭有感染鼠疫的危险。

二、“三不”制度：

1. 不接触、不剥皮、不煮食病（死）旱獭 及其它病死动物；

2. 不在旱獭洞周围坐卧休息，以防跳蚤叮咬；
3. 不到鼠疫病人或疑似鼠疫病人家中探视护理或吊丧。

三、“三报”制度：

1. 发现病（死）旱獭和其它病（死）动物要报告；
2. 发现鼠疫病人或疑似鼠疫病人应立即报告；
3. 发现原因不明的急死病人应立即报告。

四、人感染鼠疫菌的主要途径也有三种：一是接触患有鼠疫病的动物，如剥皮、煮食等；二是被带有鼠疫菌的跳蚤叮咬；三是肺鼠疫病人传播。

五、灾民安置地、救援人员驻扎地选择要远离旱獭栖息地，做好防鼠防蚤。需要在鼠疫活动地区内宿营时，最好能在宿营地周围喷洒一些杀虫药剂，杀灭可能侵袭人类的吸血昆虫。

六、不要剥食不明原因死亡的藏系绵羊；这些动物体表的蚤类不活跃，只要人类不主动接触它们，就会减少和避免感染鼠疫的危险。不要接触牧羊犬叼食的病死旱獭。

七、疫源地内，或在 10 日内进入或到过疫源地的人员，突然发生高热，发生明显的淋巴结肿大，或咳嗽、痰中带血，且病程进展迅速，应考虑感染鼠疫的可能性，及时就诊，立即向防疫机构报告，并采取措施，避免病人与更多的人接触。

八、在尚未发现鼠疫疫情情况下，一般群众和救援人员不需要采取接种疫苗、预防性服药等特异性预防措施，也不需要穿着特殊防护装备。