

## 麻风病



麻风病是由麻风分枝杆菌（*Mycobacterium leprae*）引起的慢性传染病，主要侵犯皮肤、外周神经以及多菌型麻风（MB）的上呼吸道。麻风病主要通过上呼吸道或密切接触传播。发病后如未及时治疗和处理，可致严重的畸残。

## 病原

时间：2005-09-29 字体：大中小

麻风菌革兰氏染色阳性，抗酸染色呈均匀棒状（活菌）和颗粒状（死菌）。数量多时排列成束或集聚成团。麻风菌寄生在皮肤的组织细胞中和围神经轴索的许旺氏细胞内。尚未能在体外培养。经鼠足垫接种，表明麻风菌生长周期慢（13天），最适/温度低（32℃），不产生毒素。

## 临床症状

时间：2005-09-29 字体：大中小

潜伏期长，发病于不知不觉之中。主要症状是由麻风菌侵犯外周神经而引起所辖区的感觉（触、痛、温觉），营养（皮肤干燥、闭汗）和运动（肌无力、麻痹）的功能障碍。

为了便于治疗，WHO（1982）将麻风 5 个逐渐过度的免疫型别（Ridley-Jopling，1966）归纳成 MB（多菌型麻风）和 PB（少菌性麻风），主要区别有：

症 状	PB（I、TT、BT）	MB（LL、BL、BB）
皮肤损害（斑、块、丘疹、结节）	—1-5 块 —不对称分布 —麻木显著	—5 块以上 —对称分布 —麻木
神经损害（支配区有麻木、肌无力、肌萎缩、麻痹等）	1 条	多条
皮肤切割涂片抗酸菌	阴性	阳性
联合化疗（MDT）	二联，6 月	三联，24 月

### 控制措施

时间：2005-09-29 字体：大中小

#### （一）人群预防

—即早发现、早治疗、防止传播、预防残疾。

—广泛卫生宣教，宣传麻风病的症状、早治早好、免费治疗，克服歧视、恐惧心理。在流行区做到家喻户晓。各地、各级医生应能发现疑似病例，作到不误诊、不漏诊。各级皮肤科医生有职责会诊。

#### （二）个体预防：

对新病人的家属每年进行一次体查，看有无可疑症状，至少 5 年。对患者进行确诊后，立即开始规则性服 MDT。利服平有极强的杀麻风菌作用，服用第一剂 MDT 三天内即可失去对他人的传染性。与此同时应对 MB 患者的鼻、口腔分泌物进行消毒处理。

麻风菌的活力低于结核菌，无需特别防护和消毒。检查病人后仅需用肥皂流水洗手，污物焚烧或煮沸 30 分钟，衣物暴晒 2 小时。

### 麻风病防治核心知识及相关问答（2014 年版）

一、麻风病是一种慢性传染病，主要通过飞沫的呼吸道吸入和长期密切的皮肤接触传播。绝大多数人对麻风病具有免疫力，发病率低。

问题 1:麻风病是如何传染的?

答:麻风病是由麻风杆菌引起的一种慢性传染病，主要侵犯皮肤、周围神经、上呼吸道黏膜和眼睛等组织，通过皮肤密切接触或呼吸道飞沫传播。麻风病的传染源主要是未经治疗的多菌型麻风病患者。95%以上的人对麻风杆菌有正常抵抗力，即使感染了麻风杆菌，发病的比例也很低。

二、麻风病可防、可治、不可怕。

问题 2:麻风病的流行情况如何?

答:据世界卫生组织报告，2012 年全球新发现麻风病例 232857 例，主要分布在印度、巴西、印度尼西亚等国。近年我国每年报告新发现麻风病例均在 1000 例以上，2012 年新发病人 1206 例，大部分省份都有新发现麻风病例。

问题 3:怎样预防麻风病?

答:密切接触活动性麻风病患者时戴口罩、接触后洗手、注意个人卫生、加强营养、提高机体抵抗力等可以减少患麻风病的危险。

三、麻风病早期症状是浅色或红色皮肤斑片，常伴感觉丧失。

问题 4:麻风病的主要表现有哪些?

答:麻风病的临床表现多种多样，早期主要是皮肤上出现不痛不痒的浅色或红色斑片，如不能早期发现和治疗，病期长时皮肤多伴有感觉减退或丧失，病情逐渐发展后可以出现兔眼、歪嘴、爪形手、垂足、足底溃疡等畸残。

四、怀疑患麻风病，应当尽早到专业机构就诊。

问题 5 怀疑麻风病，应该去哪里就诊?

答:如果怀疑自己得了麻风病，应该主动去皮肤病防治院(所、站)等麻风病防治机构检查治疗，或与当地疾病预防控制中心联系咨询。

五、国家对麻风病的诊断和治疗实行免费政策。

问题 6:国家对麻风病防治有哪些政策?

答:2004 年，中央财政将麻风病防治纳入了公共卫生专项，各级政府也给予了稳定的资金投入，目前我国对麻风病的诊断和治疗实行免费。为了鼓励发现麻风病患者，各级政府实行报病奖励，中央财政给予适当补助。此外，民政等部门也为麻风病患者提供必要的医疗和生活救助等。

问题 7:我国消除麻风病危害的目标是什么?

答:2011 年,我国 11 个部门联合印发了《全国消除麻风病危害规划(2011-2020 年)》,要求到 2020 年实现消除麻风病危害的目标,提出全国麻风病患者数量较 2010 年减少 50%,98%以上的县(市)麻风病患率控制在 1/10 万以下,新发现麻风病患者中 2 级畸残者控制在 20%以内。

六、早诊早治可避免畸残,规范治疗可完全治愈。

问题 8:麻风病如何治疗?

答:目前,麻风病的治疗主要采用世界卫生组织推荐的利福平(RFP)、氨苯砒(DDS),氯法齐明(B663)等药物进行联合化疗。门诊治疗半年或 1 年即可完成疗程,效果良好。早期及时治疗可以避免各种麻风病残疾的发生。

七、今年我国“世界防治麻风病日”活动主题是“加速行动,消除麻风危害”。

问题 9:世界防治麻风病日是每年的哪一天?

答:1954 年,世界卫生组织确定每年 1 月的最后一个星期日为“世界防治麻风病日”。每年的这一天,许多国家举行各种形式的活动,以动员社会力量来帮助麻风病人克服生活和工作上的困难,营造社会支持环境。

问题 10:麻风病的危害有哪些?

答:麻风病的危害包括:一是麻风病致病、致畸造成患者部分或全部劳动力丧失,对人民群众身体健康造成危害。二是由于社会对麻风病的不了解,对麻风病人产生歧视和偏见,对个人、家庭和社会带来负面影响。三是麻风病流行和造成残疾,增加社会负担及对卫生资源的消耗。

问题 11:消除麻风病危害应采取哪些措施?

答:为了消除以上危害,减少与麻风病相关的负担,需动员政府各部门和社会各界积极参与,加强病例早期发现,早期治疗,预防畸残;加大宣传教育,提高群众麻风病防治知识,促进及时就诊,消除社会对麻风病的歧视和偏见,倡导对麻风病患者关怀和支持,弘扬尊重和关爱麻风病患者的良好社会风尚。

(来源:中华人民共和国卫生和计划生育委员会网站)