

H A P P Y

I S T

B I R T H D A Y





2 0 2 6

보카브리아+레캄비스 주사요법 출시 1주년이 곧 다가오고 있습니다.

출시 전과 어떤 점이 가장 달라졌다고 생각하시나요?

CLICK






치료순응도




안전성 프로파일



치료선호도




치료편의성





효과적인 바이러스 억제

키워드가 적힌 물건을 잡아주세요!



치료순응도



보카브리아+레캄비스 주사요법은 실제 임상 환경에서도 **높은 치료 순응도**를 확인하였습니다.¹⁻⁶



CLINICAL TRIALS

REAL-WORLD EVIDENCE

SOLAR¹
(Month 11-12)

CARES²
(Week 96)

LATTE-2^{3,4}
(Week 256)

CARISEL⁵
(Month 12;
secondary endpoint)

JABS⁶
(Month 12;
secondary endpoint)

93%

(n=2,342/2,527)

96%

(n= 3,142/3,261)

96%

(n= 9,453/9,803)

93%

(n=2,211/2,376)

97%

(n=384/395)

의 주사 방문이 투여 예정일 ±7일 이내에 이루어졌습니다.

Includes studies reporting adherence rates based on the number of injections received in the Flexible Dosing Window, defined as ±7 days from the Target Treatment Date.¹⁻⁶

[SOLAR Study design] A randomised, open-label, multicentre, phase 3b, non-inferiority study to compare LA CAB + RPV Q2M with continued once-daily bictegravir, emtricitabine, and tenofovir alafenamide for the maintenance of HIV-1 virological suppression in adults living with HIV.

[CARES Study design] A multicenter, open-label phase 3b trial to continue oral therapy or switch to CAB (600 mg) and RPV (900 mg) intramuscular injections Q8W (optional 4-week oral lead-in).


[LATTE-2 Study design] A phase 2b study of LA CAB + RPV over approximately 5 years in ART-naïve adults with HIV-1. After 20 weeks of oral CAB + abacavir/lamivudine, participants were randomized to CAB + RPV LA Q8W or Q4W or continue oral ART through the 96-week maintenance period. In the extension period through week 256, participants continued their current LA regimen (randomized Q8W/Q4W groups) or switched from oral ART to Q8W or Q4W LA therapy (extension-switch groups).

[CARISEL Study design] CARISEL is a phase 3b implementation-effectiveness study, designed as a 2-arm, unblinded study with centers randomized to either enhanced or standard implementation arms to evaluate the perceived acceptability, appropriateness, and feasibility of CAB + RPV LA implementation for staff participants and clinical outcomes of patient participants. For patient study participants(PSPs), this study is single arm, unblinded, and interventional; all PSPs switched from daily oral therapy to CAB + RPV LA dosed Q2M.

[JABS Study design] A 12-month, single-centre, single-arm, open-label phase IV study of LA CAB 600 mg + RPV 900 mg administered intramuscularly Q2M to adults with treated HIV-1 infection to evaluate the implementation of LA regimens in a 'real world' Australian setting.

ART, antiretroviral therapy; **CAB**, cabotegravir; **LA**, long-acting; **Q2M**, every 2 months; **Q4W**, every 4 weeks; **Q8W**, every 8 weeks; **RPV**, rilpivirine.

References 1. Ramgopal MN, et al. Lancet HIV. 2023;10(9):1-12. 2. Kityo C, et al. Nat Med. 2026;32(1):168-177. 3. Smith GHR, et al. Open Forum Infect Dis. 2021;8(9):1-9. 4. Smith GHR, et al. Open Forum Infect Dis. 2021;8(9):1-9. Supplementary data. 5. Jonsson-Oldenbützel C, et al. J Acquir Immune Defic Syndr. 2024;96(5):472-480. 6. John M, et al. HIV Med. 2024;25(8):935-945.





치료선호도



보카브리아+레캄비스 주사요법은 99%의 높은 치료 선호도를 보였습니다.¹

- CARES 연구의 보카브리아+레캄비스 투여군에서
96주 차에 치료 선호도를 밝힌
244명 중 243명 (>99%)이 경구용 ART보다
보카브리아+레캄비스를 선호했습니다.¹

99% (n=243/244)




효과적인
바이러스 억제



보카브리아+레캄비스 주사요법은 폭넓은 대상에서 높은 바이러스 억제 효과를 보였습니다.¹

[RELATIVITY study population(N=3,146)¹]



- 바이러스학적 억제율은 23개월 동안 **96% 이상**을 유지했으며, 바이러스학적 실패* 발생율은 0.6%[†]로 낮았습니다.¹

* Virologic failure defined as either two consecutive HIV-1 RNA values ≥ 200 copies/mL or a single value >500 copies/mL resulting in treatment discontinuation.


[†] With NNRTI-associated resistance mutations detected in 7 patients (0.2%) and integrase inhibitor-associated mutations in 8 patients (0.3%).

[RELATIVITY Study design] A 5-year, multicentre, ambispective, non-controlled cohort study to assess the effectiveness and safety of long-acting injectable cabotegravir plus rilpivirine in Spain.


AIDS, Acquired immunodeficiency syndrome; BL, baseline; IQR, interquartile range.

Reference 1. Buzón-Martín L, et al. J Antimicrob Chemother. 2025;80(12):3438-3451.


안전성
프로파일



보카브리아+레캄비스 주사요법으로 인한 주사 부위 반응은 시간이 흐를수록 감소하였습니다.¹



[SOLAR: Incidence of reported ISRs (all grades) by visit¹]




- 참여자의 2%(n=11/454)가 주사 관련 사유로 치료를 중단했습니다.¹



[SOLAR Study design] A randomised, open-label, multicentre, phase 3b, non-inferiority study to compare LA CAB + RPV Q2M with continued once-daily bicitgravir, emtricitabine, and tenofovir alafenamide for the maintenance of HIV-1 virological suppression in adults living with HIV.

CAB, cabotegravir; ISR, injection site reaction; LA, long-acting; Q2M, every 2 months; RPV, rilpivirine.


Reference 1. Ramgopal MN, et al. Lancet HIV. 2023;10(9):1-12.




치료편의성



HIV 감염인들은 다음과 같은 이유로 **보카브리아+레캄비스 주사요법**을 매일 경구요법보다 **선호**하였습니다.¹




매일
HIV 치료제
복용을 기억할
필요가 없음



2개월 주기
주사가
더 편리함



HIV 치료제를
안 가지고
다녀도 됨



매일
HIV 상태를
생각하지
않아도 됨



다른 사람들의
시선을
걱정하지
않아도 됨

H A P P Y B I R T H D A Y



References 1. 보카브리아 제품설명서. 2. 레캄비스주사 제품설명서.

Vocabria injection [Cabotegravir] Safety Information¹ | 전문의약품 | 수입의약품 | [1. 다음 환자에는 투여하지 말 것] 1) 이 약 또는 이 약에 함유된 다른 성분에 과민증이 있는 환자 2) 리팜피신, 리파펜틴, 카비마제핀, 옥스카바제핀, 페니토인 또는 페노바르비탈과 병용투여해서는 안 된다. 이 약은 HIV 감염 치료를 목적으로 릴피비린과 병용하여 사용되기 때문에 릴피비린의 정보에 대해서도 고려되어야 한다. [2. 이상반응] 임상시험에서 보고된 이상반응: 이 약 및 릴피비린 투여에 대한 이상반응은 제3상 임상시험인 FLAIR (임상시험 201584), ATLAS (임상시험 201585) (통합분석, N=591) 및 ATLAS-2M (임상시험 207966, N=1045)에서 48주치에 확인되었다. 이 약과 릴피비린을 병용 요법(1개월 주기 및 2개월 주기)으로 투여했다. 관련 약물 이상반응은 카보테그라비르 및 릴피비린 치료 요법에 기인한 것들을 포함하여 나열되었다. 제3상 연구들 간에 빈도가 다른 경우, 가장 높은 빈도로 작성되었다. 1개월 주기 투여 연구에서 가장 빈번하게 보고된 이상반응은 주사 부위 반응 (최대 84%), 두통 (최대 12%) 및 발열(10%) 이었다. 2개월 주기 투여 연구(ATLAS-2M)에서 가장 빈번하게 보고된 이상반응은 주사 부위 반응(76%), 두통(7%) 및 발열(7%) 이었다. 이상 반응은 빈도에 따라 열거하였다: 매우 흔하게 (≥1/10) - 두통, 주사 부위 반응 (통증* 및 불편감, 결절, 경화), 발열, 흔하게 (≥1/100 to <1/10) - 우울증, 불안, 이상한 꿈, 불면, 어지러움, 오심, 구토, 복통, 고창, 설사, 발진, 근육통, 주사 부위 반응(종창, 홍반, 소양증, 멍, 온기, 혈종), 피로, 무력증, 병감(권태), 체중 증가, 흔하지 않게 (≥1/1,000 to <1/100) - 과민성, 자살 시도; 자살 생각, 졸림, 혈관 미주 신경 반응 (주사에 대한), 간독성, 두드러기, 혈관 부종, 주사 부위 반응(연조직염, 농양, 마취, 출혈, 변색), 아미노전이효소 증가. FLAIR 연구의 96주차 및 124주차의 전반적인 안전성 프로파일은 제48주치에 관찰된 것과 일치했으며 새로운 안전성 결과는 확인되지 않았다. FLAIR 연구의 확장단계에서 경구 도입요법 없이 카보테그라비르와 릴피비린의 주사요법을 시작하는 것은 경구 도입요법 생각과 관련된 새로운 안전성 문제와 연관이 없었다. ATLAS-2M 연구에서 152주차의 전반적인 안전성 프로파일은 48주차 및 96주치에 관찰된 것과 일치했으며 새로운 안전성 결과는 확인되지 않았다. *드물게 일시적인 보행 장애로 이어질 수 있음.

Rekamby injection [Rilpivirine Micronized] Safety Information² | 전문의약품 | 수입의약품 | [1. 다음 환자에는 투여하지 말 것] 1) 이 약 또는 이 약에 함유된 다른 성분에 과민증이 있는 환자 2) CYP3A 효소 유도로 인하여) 릴피비린 혈중 농도가 유의하게 감소하여 이 약의 치료 효과가 감소할 수 있으므로 이 약을 다음과 같은 약물과 함께 투여해서는 안 된다. ●항경련제: 카르바마제핀, 옥스카르바제핀, 페노바르비탈, 페니토인 ●항결핵제: 리파부틴, 리팜피신, 리파펜틴 ●글루코코르티코이드 전신성 억제제: 덱사메타손, 1회 투여는 제외 ●세인트 존스 워트 (Hypericum perforatum) 3) 경구 릴피비린을 사용할 때에는 프로톤 펌프 억제제를 병용 투여하지 않는다. [2. 이상반응] 임상시험에서 보고된 이상반응: 이 약 및 카보테그라비르 투여에 대한 이상반응 (Adverse reactions, ARs)은 임상 3/3b 연구인 FLAIR(201584) 및 ATLAS(201585) (통합분석, N=591), ATLAS-2M(207966, N=1045) 임상시험에서 48주치에 확인되었으며, 추가 이상 반응은 경구 릴피비린의 이전 시험에서 확인되었다. 이 약과 카보테그라비르 주사제는 병용요법 (1개월 주기 또는 2개월 주기)으로 투여했다. 1개월 주기 투여 연구에서 가장 빈번하게 보고된 이상반응은 주사부위 반응 (최대 84%), 두통 (최대 12%), 발열 (10%)이었다. 2개월 주기로 투여한 ATLAS-2M연구에서 가장 많이 보고된 이상반응은 주사부위 반응 (76%), 두통 (7%), 발열 (7%)이었다. 이상반응은 빈도에 따라 열거하였다: 매우 흔하게 (≥ 1/10) - 두통, 주사 부위 반응(통증 및 불편감, 부위 결절, 경화), 발열, 흔하게 (≥ 1/100, <1/10) - 우울증, 불안, 이상한 꿈, 불면, 어지러움, 오심, 구토, 복통, 고창, 설사, 발진, 근육통, 주사 부위 반응 (종창, 홍반, 소양증, 멍, 온기, 혈종), 피로, 무력증, 병감 (권태), 체중 증가, 흔하지 않게 (≥ 1/1000, <1/100) - 졸림, 혈관 미주 신경 반응 (주사에 반응하여), 간독성, 주사 부위 반응 (연조직염, 농양, 마취, 출혈, 변색), 아미노전이효소 증가. FLAIR 연구의 96주차 및 124주차와 ATLAS-2M 연구의 152주차 전체 안전성 프로파일은 각각 FLAIR 연구의 48주차와 ATLAS-2M 연구의 48주차와 96주치에 관찰된 것과 일치했으며, 두 연구 모두에서 새로운 안전성 결과가 확인되지 않았다. FLAIR 연구의 연장단계 에서 경구 도입요법 없이 릴피비린과 카보테그라비르 요법을 시작하는 것은 경구 도입요법 생각과 관련된 새로운 안전성 문제와 연관이 없었다. ATLAS-2M 연구에서, Q8W 또는 Q4W 그룹의 치료에 대한 장기간 노출과 관련된 새로운 안전성 발견은 없었다.

보카브리아주

[수입판매원] **(주)글락소스미스클라인** | 서울특별시 용산구 한강대로 92, LS 용산 타워 9층, Tel. 080-901-4100

레캄비스주사

[수입원] **(주)한국안센** | 서울특별시 용산구 한강대로 92, LS 용산 타워 25층, Tel. 02-2094-4500

[판매원] **(주)글락소스미스클라인** | 서울특별시 용산구 한강대로 92, LS 용산 타워 9층, Tel. 080-901-4100

GSK

GSK 판매 제품 사용 중 발생한 이상사례(부작용)는 080-901-4100 또는 koreasafetyreporting.co.kr으로 보고해 주시기 바랍니다.
Trademarks are owned by or licensed to the GSK group of companies. ©2026 GSK group of companies or its licensor.

PM-KR-CBR-EDTL-260003 Apr 2026

의약품상세정보

보카브리아주 카보테그라비르



레캄비스주사 릴피비린



처방하시기 전 QR 코드 또는 식품의약품안전처
의약품통합정보시스템 (<https://nedrug.mfds.go.kr>)을 통해
의약품상세정보를 참조하시기 바랍니다.

HOME