

2023 年 08 月 31 日函数的零点与方程的根¹

一. 函数的零点与方程根的关系 (共 17 小题)²

1. 若方程 $\sqrt{3-\frac{3x^2}{4}}=x+b$ 有解, 则 b 的取值范围为 ()³

- A. $[-\sqrt{7}, \sqrt{7}]$ B. $[-2, \sqrt{7}]$ C. $[2, \sqrt{7}]$ D. $[-2, 2]$ ⁴

2. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 2^{-x}, & x \leq 0 \\ \ln \frac{1}{x}, & x > 0 \end{cases}$, $g(x) = f(x) - x - a$. 若 $g(x)$ 有 2 个零点, 则实数 a

的最小值是 ()

- A. 2 B. 0 C. -1 D. 1⁶

3. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} \ln x, & x > 0, \\ -x^2 - x, & x \leq 0, \end{cases}$ 若直线 $y=kx$ 与 $y=f(x)$ 有三个不同的交点, 则实数 k

的取值范围是 ()

- A. $(-\infty, \frac{1}{e})$ B. $(-1, \frac{2}{e})$ C. $(-1, 0] \cup \{\frac{1}{e}\}$ D. $(-2, 0] \cup \{\frac{2}{e}\}$ ⁸

4. 设函数 $f(x) = \begin{cases} x + \ln x, & x > 0 \\ \sin(\omega x + \frac{\pi}{4}), & -\pi \leq x \leq 0 \end{cases}$ 有 5 个不同的零点, 则正实数 ω 的取值范围

为 ()

- A. $[\frac{13}{4}, \frac{17}{4})$ B. $(\frac{13}{4}, \frac{17}{4})$ C. $(\frac{13}{4}, \frac{17}{4}]$ D. $[\frac{13}{4}, \frac{17}{4}]$ ¹⁰

5. 已知不等式 $ae^x(x+2) < x+1$ 恰有 1 个整数解, 则实数 a 的取值范围为 ()¹¹

- A. $(\frac{1}{3e}, \frac{2}{e})$ B. $[\frac{1}{3e}, \frac{2}{e})$ C. $(\frac{2}{3e}, \frac{1}{2})$ D. $[\frac{2}{3e}, \frac{1}{2})$ ¹²

6. 函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & x \leq 1 \\ \ln x, & x > 1 \end{cases}$, 则函数 $y = f(f(x)) - 1$ 的零点个数为 ()¹³

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5¹⁴

7. 已知定义在 \mathbf{R} 上的函数 $y=f(x)$ 对于任意的 x 都满足 $f(x+2)=f(x)$, 当 $-1 \leq x < 1$ 时, f

$(x) = x^3$, 若函数 $g(x) = f(x) - \log_a|x|$ 至少有 6 个零点, 则 a 的取值范围是 ()¹⁵

- A. $(0, \frac{1}{5}] \cup (5, +\infty)$ ¹⁶

- B. $(0, \frac{1}{5}) \cup [5, +\infty)$ ¹⁷

- C. $(\frac{1}{7}, \frac{1}{5}) \cup (5, 7)$ ¹⁸

- D. $(\frac{1}{7}, \frac{1}{5}) \cup [5, 7)$ ¹⁹

8. 设函数 $f(x) = \begin{cases} -x^2 + 4x, & x \leq 4, \\ |\log_2(x-4)|, & x > 4, \end{cases}$ 若关于 x 的方程 $f(x) = t$ 有四个实根 $x_1, x_2,$

x_3, x_4 ($x_1 < x_2 < x_3 < x_4$), 则 $x_1 + x_2 + 4x_3 + \frac{1}{4}x_4$ 的最小值为 ()²⁰

- A. $\frac{45}{5}$ B. 23 C. $\frac{47}{2}$ D. 24²¹

9. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 2^{|x-1|}, & x \leq 2 \\ -x^2 + 6x - 6, & x > 2 \end{cases}$, 且 $g(x) = f(x) - a$, 若函数 $g(x)$ 有 3 个不同

的零点, 则实数 a 的取值范围为 ()

- A. (1, 2) B. (1, 3) C. [1, 2] D. [1, 3]²³

10. 已知 $f(x)$ 是定义在 \mathbf{R} 上的函数, $f(x+4)$ 为奇函数, $f(x+5)$ 为偶函数, 当 $0 < x \leq 1$ 时, f

$(x) = x^3$, 若函数 $g(x) = f(x) - m(x-2)$ ($m > 0$) 有 5 个不同的零点, 则 m 的取值范围

- 为 ()²⁴
- A. $(\frac{1}{9}, \frac{1}{5})$ B. $(\frac{1}{8}, \frac{1}{4})$ C. $(\frac{1}{7}, \frac{1}{3})$ D. $(\frac{1}{6}, \frac{1}{2})$ ²⁵

11. 已知函数 $f(x) = \frac{x}{e \ln x}$, 关于 x 的方程 $[f(x)]^2 - 2(a+1)f(x) + a^2 + 2a = 0$ 至少有三个互

不相等的实数解, 则 a 的取值范围是 ()²⁶

- A. $[1, +\infty)$ ²⁷

- B. $(-1, 0) \cup (1, +\infty)$ ²⁸

- C. $(-1, 0) \cup [1, +\infty)$

- D. $(-\infty, 0) \cup (1, +\infty)$ ²⁹

12. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 0, \\ \ln(-x), & x < 0, \end{cases}$ 若函数 $g(x) = f(f(x)) - af(x) + 1$ 恰有两个零

点, 则 a 的取值范围是 ()³⁰

- A. $[0, 2) \cup \{1\}$ B. $(2, +\infty)$ C. $(-1, 0)$ D. $(-\infty, -1)$ ³¹

13. 已知 $f(x) = \begin{cases} \frac{4x}{1+x^2}, & x \geq 0 \\ -\frac{4}{x}, & x < 0 \end{cases}$, 若 $f(x) = t$ 有三个不同的解 x_1, x_2, x_3 , 且 $x_1 < x_2 < x_3$, 则

$-\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_3}$ 的取值范围是 () ¹

- A. $(1, +\infty)$ B. $(\frac{3}{2}, +\infty)$ C. $(2, +\infty)$ D. $(\frac{5}{2}, +\infty)$ ²

14. 已知函数 $f(x) = (x+1)e^x$, 若函数 $F(x) = f^2(x) - mf(x) + m - 1$ 有三个不同的零点, 则实数 m 的取值范围为 ()

- A. $(-\frac{1}{e^2}, 0)$ ⁴ B. $(-\frac{1}{e^2}, 1)$ ⁵
C. $(1 - \frac{1}{e^2}, 1)$ ⁶ D. $(1 - \frac{1}{e^2}, 1) \cup (1, +\infty)$ ⁷

15. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} |\log_2(x-3)| + 1, & x > 3 \\ |2^x - 3|, & x \leq 3 \end{cases}$, 若关于 x 的方程 $m[f(x)]^2 - 3f(x) + 4m = 0$ 有 8 个不相等的实根, 则实数 m 的取值范围为 () ⁸

0 有 8 个不相等的实根, 则实数 m 的取值范围为 () ⁹

- A. $(\frac{9}{13}, \frac{5}{4})$ B. $(\frac{3}{5}, \frac{9}{13})$ C. $(\frac{3}{5}, \frac{3}{4})$ D. $(\frac{9}{13}, \frac{3}{4})$ ¹⁰

16. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} \ln x + x, & x > 1 \\ 2x^2 - mx + \frac{m}{2}, & x \leq 1 \end{cases}$, 若 $g(x) = f(x) - m$ 有三个零点, 则实数 m 的取值范围是 () ¹¹

- A. $(1, \frac{7}{4}]$ B. $(1, 2]$ C. $(1, \frac{4}{3}]$ D. $[1, 3]$ ¹²

17. 函数 $f(x) = (\frac{1}{e})^{|x|} + 1$, 若 $g(x) = 2f^2(x) - (2a+3)f(x) + 3a$ 有 4 个零点, 则 a 的取值范围是 () ¹³

- A. $(1, 2)$ ¹⁴ B. $[\frac{3}{2}, 2)$ ¹⁵
C. $(0, \frac{3}{2}) \cup (\frac{3}{2}, 2)$ ¹⁶ D. $(1, \frac{3}{2}) \cup (\frac{3}{2}, 2)$ ¹⁷

二. 函数与方程的综合运用 (共 3 小题) ¹⁸

18. 已知函数 $f(x) = \ln|x-1| - \ln|x+1|$, 若存在两个不同的实数 x_1, x_2 , 使 $f(x_1) = f(x_2)$, 则 () ¹⁹

- A. $x_1x_2 = -1$ B. $x_1x_2 = 1$ C. $x_1+x_2 < -2$ D. $x_1+x_2 > 2$ ²⁰

19. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} -\ln x, & 0 < x \leq 1 \\ \frac{1}{x}, & x > 1 \end{cases}$, 若 $0 < a < b$ 且满足 $f(a) = f(b)$, 则 $af(b) + bf(a)$ ²¹

(a) 的取值范围是 () ²²

- A. $(1, \frac{1}{e} + 1)$ B. $(-\infty, \frac{1}{e} + 1]$ C. $(1, \frac{1}{e} + 1]$ D. $(0, \frac{1}{e} + 1)$ ²³

20. 已知函数 $f(x) = e^x - ax^2$ 的定义域为 $(\frac{1}{2}, 2)$, 且对 ²⁴

$\forall x_1, x_2 \in (\frac{1}{2}, 2), x_1 \neq x_2, \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} < x_1 + x_2$ 恒成立, 则实数 a 的取值范围为 ()

- A. $[\frac{e^2}{4} - 1, +\infty)$ B. $[\sqrt{e} - 1, +\infty)$ C. $(-\infty, \frac{e}{2} - 1]$ D. $(-\infty, \frac{e}{2} - 1)$ ²⁵

2023 年 08 月 31 日函数的零点与方程的根²

参考答案与试题解析³

一. 函数的零点与方程根的关系 (共 17 小题)⁴

1. 若方程 $\sqrt{3-\frac{3x^2}{4}}=x+b$ 有解, 则 b 的取值范围为 ()⁵


A. $[-\sqrt{7}, \sqrt{7}]$ B. $[-2, \sqrt{7}]$ C. $[2, \sqrt{7}]$ D. $[-2, 2]$ ⁶

【解答】解: 设 $y=\sqrt{3-\frac{3x^2}{4}}$, $y \geq 0$, 两边同平方得 $y^2=3-\frac{3x^2}{4}$, 化简得 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ ($y \geq 0$),⁷

则其所表示的图形为椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 在 x 轴及上方部分,⁸

则题目转化为直线 $y=x+b$ 与上述图形有交点,⁹

设椭圆的右端点为 A , 易得其坐标为 $(2, 0)$,¹⁰



当直线 $y=x+b$ 与半椭圆相切时, 显然由图得 $b > 0$,¹²

联立 $\begin{cases} y=x+b \\ 3x^2+4y^2=12 \end{cases}$, 得 $7x^2+8bx+4b^2-12=0$,¹³

则 $\Delta = (8b)^2 - 4 \times 7 \times (4b^2 - 12) = 0$,¹⁴

化简得 $b^2=7$, 解得 $b=\sqrt{7}$ 或 $-\sqrt{7}$ (舍),¹⁵

当直线 $y=x+b$ 经过点 $A(2, 0)$ 时, 得 $0=2+b$, 解得 $b=-2$,¹⁶

则 $b \in [-2, \sqrt{7}]$.¹⁷

故选: B.¹⁸

2. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 2^{-x}, & x \leq 0 \\ \ln \frac{1}{x}, & x > 0 \end{cases}$, $g(x) = f(x) - x - a$. 若 $g(x)$ 有 2 个零点, 则实数 a ¹⁹

的最小值是 ()²⁰


A. 2 B. 0 C. -1 D. 1²¹

【解答】解: 令 $g(x)=0$ 可得 $f(x)=x+a$,²²

当 $x \leq 0$ 时, $f(x)=2^{-x} = (\frac{1}{2})^x$,²³

当 $x > 0$ 时, $f(x) = \ln \frac{1}{x} = -\ln x$ 的图象与 $y = \ln x$ 关于 x 轴对称,²⁴

所以作出函数 $y=f(x)$ 与函数 $y=x+a$ 的图象如下图所示:²⁵



由上图可知, 当 $a \geq 1$ 时, 函数 $y=f(x)$ 与函数 $y=x+a$ 的图象有 2 个交点,²⁷

此时, 函数 $y=g(x)$ 有 2 个零点,²⁸

因此, 实数 a 的取值范围是 $[1, +\infty)$,²⁹

即实数 a 的最小值为 1.³⁰

故选: D.³¹

3. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} \ln x, & x > 0, \\ -x^2 - x, & x \leq 0, \end{cases}$ 若直线 $y=kx$ 与 $y=f(x)$ 有三个不同的交点, 则实数 k ³²

的取值范围是 ()

- A. $(-\infty, \frac{1}{e})$ B. $(-1, \frac{2}{e})$ C. $(-1, 0] \cup \{\frac{1}{e}\}$ D. $(-2, 0] \cup \{\frac{2}{e}\}$

【解答】解：设 $y=\ln x$ 与 $y=kx$ 相切于点 $(x_0, \ln x_0)$,

$$\text{则 } k=y'|_{x=x_0}=\frac{1}{x_0}=\frac{\ln x_0}{x_0},$$

$$\text{解得 } x_0=e, \text{ 此时 } k=\frac{1}{e},$$

$$\text{由 } \begin{cases} y=kx \\ y=-x^2-x, \quad x \leq 0 \end{cases}, \text{ 得 } x^2+(k+1)x=0,$$


由 $\Delta=0$ 可得 $k=-1$, 此时切点为 $(0, 0)$,

作出函数 $y=kx$ 与 $y=f(x)$ 的图象如图,

由图象可知, 当 $-1 < k \leq 0$ 或 $k=\frac{1}{e}$ 时,

直线 $y=kx$ 与 $y=f(x)$ 有三个不同的交点,

故选: C.



4. 设函数 $f(x) = \begin{cases} x+\ln x, & x > 0 \\ \sin(\omega x + \frac{\pi}{4}), & -\pi \leq x \leq 0 \end{cases}$ 有 5 个不同的零点, 则正实数 ω 的取值范围为 ()

- A. $[\frac{13}{4}, \frac{17}{4})$ B. $(\frac{13}{4}, \frac{17}{4})$ C. $(\frac{13}{4}, \frac{17}{4}]$ D. $[\frac{13}{4}, \frac{17}{4}]$

【解答】解：由题可得, 当 $x > 0$ 时, $f(x) = x + \ln x$, 显然单调递增, 且 $f(\frac{1}{10}) = \frac{1}{10} - \ln 10 < 0$, $f(2) = 2 + \ln 2 > 0$,

所有此时 $f(x)$ 有且只有一个零点, 所有当 $-\pi \leq x \leq 0$ 时, $f(x) = \sin(\omega x + \frac{\pi}{4})$ 有 4 个零点,

$$\text{令 } f(x) = 0, \text{ 即 } \omega x + \frac{\pi}{4} = k\pi, k \in \mathbb{Z}, \text{ 解得 } x = \frac{-\frac{\pi}{4} + k\pi}{\omega}, k \in \mathbb{Z},$$

由题可得 $-\pi \leq x \leq 0$ 区间内的 4 个零点分别是 $k=0, -1, -2, -3$,

所以 $-\pi$ 即在 $k=-3$ 与 $k=-4$ 之间,

$$\text{即 } \begin{cases} \frac{-\frac{\pi}{4} - 3\pi}{\omega} \geq -\pi \\ \frac{-\frac{\pi}{4} - 4\pi}{\omega} < -\pi \end{cases}, \text{ 解得 } \frac{13}{4} \leq \omega < \frac{17}{4}.$$

故选: A.

5. 已知不等式 $ae^x(x+2) < x+1$ 恰有 1 个整数解, 则实数 a 的取值范围为 ()

- A. $(\frac{1}{3e}, \frac{2}{e})$ B. $[\frac{1}{3e}, \frac{2}{e})$ C. $(\frac{2}{3e}, \frac{1}{2})$ D. $[\frac{2}{3e}, \frac{1}{2})$

【解答】解：由不等式 $ae^x(x+2) < x+1$, 可得 $a(x+2) < \frac{x+1}{e^x}$,

$$\text{设 } g(x) = a(x+2), f(x) = \frac{x+1}{e^x},$$

$$\text{则 } f'(x) = \frac{-x}{e^x},$$

当 $x < 0$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递增,


当 $x > 0$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减,

当 $x=0$ 时, $f(x)$ 取极大值 1,

又 $f(-1)=0$, 且 $x > 0$ 时, $f(x) > 0$,

直线 $g(x) = a(x+2)$ 恒过点 $(-2, 0)$,

当 $a > 0$ 时, 作出 $g(x) = a(x+2)$ 与 $f(x) = \frac{x+1}{e^x}$ 的图像如下所示,



$g(x) < f(x)$ 恰有 1 个整数解，只需要满足 $\begin{cases} f(0) > g(0) \\ f(1) \leq g(1) \end{cases}$,²³

解得 $\frac{2}{3e} \leq a < \frac{1}{2}$,⁴

当 $a \leq 0$ 时，显然 $g(x) < f(x)$ 有无穷多个整数解，不满足条件，⁵

所以 a 的取值范围为 $[\frac{2}{3e}, \frac{1}{2})$.⁶

故选：D.⁷

6. 函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & x \leq 1 \\ \ln x, & x > 1 \end{cases}$ ，则函数 $y = f(f(x)) - 1$ 的零点个数为 ()⁸


A. 2 B. 3 C. 4 D. 5⁹

【解答】解：令 $t = f(x)$ ，则 $f(t) = 1$ ，当 $t \leq 1$ 时，¹⁰

由 $t^2 - 1 = 1$ ，可得 $t = -\sqrt{2}$ 或 $t = \sqrt{2}$ (舍去)；¹¹

当 $t > 1$ 时，由 $\ln t = 1$ 可得 $t = e$ ，所以 $f(t) = 1$ 的两根为 $t_1 = -\sqrt{2}$ ， $t_2 = e$ ，¹²

则 $f(x) = -\sqrt{2}$ 或 $f(x) = e$ ，



因为 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递减，在 $(0, +\infty)$ 上单调递增，¹³¹⁴

所以 $f(x) \geq f(0) = -1$ ，若 $f(x) = -\sqrt{2}$ ，易知方程无解，¹⁵

若 $f(x) = e$ ，当 $x \leq 1$ 时，¹⁶

由 $x^2 - 1 = e$ ，得 $x = -\sqrt{e+1}$ 或 $x = \sqrt{e+1}$ (舍去)，¹⁷

此时方程有唯一的解；¹⁸

当 $x > 1$ 时，由 $\ln x = e$ ，得 $x = e^e$ ，此时方程有唯一的解，¹⁹

综上所述可知函数 $y = f(f(x)) - 1$ 的零点个数为 2 个。²⁰

故选：A.²¹

7. 已知定义在 \mathbf{R} 上的函数 $y = f(x)$ 对于任意的 x 都满足 $f(x+2) = f(x)$ ，当 $-1 \leq x < 1$ 时， $f(x) = x^3$ ，若函数 $g(x) = f(x) - \log_a |x|$ 至少有 6 个零点，则 a 的取值范围是 ()²²

A. $(0, \frac{1}{5}] \cup (5, +\infty)$ ²³

B. $(0, \frac{1}{5}) \cup [5, +\infty)$ ²⁴

C. $(\frac{1}{7}, \frac{1}{5}) \cup (5, 7)$ ²⁵


D. $(\frac{1}{7}, \frac{1}{5}) \cup [5, 7)$ ²⁶

【解答】解：由 $f(x+2) = f(x)$ 知 $f(x)$ 是周期为 2 的周期函数，²⁷


函数 $g(x) = f(x) - \log_a |x|$ 至少有 6 个零点等价于函数 $y = f(x)$ 与 $g(x) = \log_a |x|$ 的图象至少有 6 个交点，²⁸

①当 $a > 1$ 时，画出函数 $y = f(x)$ 与 $g(x) = \log_a |x|$ 的图象如图所示，²⁹

根据图象可得 $g(5) = \log_a 5 < 1$ ，即 $a > 5$.³⁰



②当 $0 < a < 1$ 时，画出函数 $y=f(x)$ 与 $g(x)=\log_a|x|$ 的图象如图所示，3



根据图象可得 $g(-5)=\log_a 5 \geq -1$ ，即 $0 < a \leq \frac{1}{5}$ 。5

综上所述， a 的取值范围是 $(0, \frac{1}{5}] \cup (5, +\infty)$ 。6


故选：A。7

8. 设函数 $f(x) = \begin{cases} -x^2+4x, & x \leq 4, \\ |\log_2(x-4)|, & x > 4, \end{cases}$ 若关于 x 的方程 $f(x)=t$ 有四个实根 x_1, x_2, x_3, x_4 (1<x₁<x₂<x₃<x₄)，则 $x_1+x_2+4x_3+\frac{1}{4}x_4$ 的最小值为 () 8

x_3, x_4 ($1 < x_1 < x_2 < x_3 < x_4$)，则 $x_1+x_2+4x_3+\frac{1}{4}x_4$ 的最小值为 () 9

A. $\frac{45}{5}$ B. 23 C. $\frac{47}{2}$ D. 24 10

【解答】解：作出函数 $f(x) = \begin{cases} -x^2+4x, & x \leq 4, \\ |\log_2(x-4)|, & x > 4, \end{cases}$ 的图象如图所示： 11



由图可知， $x_1+x_2=4$ ，由 $|\log_2(x-4)|=f(2)=4$ ，可得 $x=\frac{65}{16}$ 或 $x=20$ ，13

所以 $5 < x_4 < 20$ ，14

又因为 $\log_2(x_3-4)+\log_2(x_4-4)=0$ ，15

所以 $(x_3-4)(x_4-4)=1$ ，16

故 $x_3=\frac{1}{x_4-4}+4$ ，17

所 18

以

$4x_3+\frac{1}{4}x_4=4(\frac{1}{x_4-4}+4)+\frac{1}{4}x_4=\frac{4}{x_4-4}+\frac{1}{4}(x_4-4)+17 \geq 2\sqrt{\frac{1}{4}(x_4-4) \cdot \frac{4}{x_4-4}}+17=19$ ，19

当且仅当 $\frac{1}{4}(x_4-4)=\frac{4}{x_4-4}$ ，即 $x_4=8$ 时取等号，20

所以 $x_1+x_2+4x_3+\frac{1}{4}x_4$ 的最小值为 $4+19=23$ 。21

故选：B。22

9. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 2^{|x-1|}, & x \leq 2, \\ -x^2+6x-6, & x > 2 \end{cases}$ ，且 $g(x)=f(x)-a$ ，若函数 $g(x)$ 有 3 个不同的零点，则实数 a 的取值范围为 () 23

的零点，则实数 a 的取值范围为 ()

A. (1, 2) B. (1, 3) C. [1, 2] D. [1, 3] 24

【解答】解：函数 $f(x) = \begin{cases} 2^{|x-1|}, & x \leq 2, \\ -x^2+6x-6, & x > 2 \end{cases}$ ，25

当 $x \leq 2$ 时， $f(x)=2^{|x-1|}$ ，它的图象可以看成是由 $y=2^{|x|}$ 的图象向右平移 1 个单位得到的，26

当 $x > 2$ 时， $f(x)=-x^2+6x-6$ ，它的图象是一个对称轴为 $x=3$ ，开口向下的抛物线，

作出函数 $f(x)$ 的图象如图所示，


函数 $g(x)=f(x)-a$ 有 3 个不同的零点，即函数 $f(x)$ 的图象与直线 $y=a$ 有 3 个不同的交点，27

当 $x=1$ 时，函数 $f(x)$ 有极小值 $f(1)=1$ ，28

当 $x=3$ 时，函数 $f(x)$ 有极大值 $f(3)=3$ ，29

所以实数 a 的取值范围为 $(1, 3)$ 。30

故选：B。31



10. 已知 $f(x)$ 是定义在 \mathbf{R} 上的函数， $f(x+4)$ 为奇函数， $f(x+5)$ 为偶函数，当 $0 < x \leq 1$ 时， $f(x) = x^3$ ，若函数 $g(x) = f(x) - m(x-2)$ ($m > 0$) 有 5 个不同的零点，则 m 的取值范围为 ()

- A. $(\frac{1}{9}, \frac{1}{5})$ B. $(\frac{1}{8}, \frac{1}{4})$ C. $(\frac{1}{7}, \frac{1}{3})$ D. $(\frac{1}{6}, \frac{1}{2})$ 2

【解答】解：因为 $f(x+5)$ 为偶函数，所以曲线 $y=f(x)$ 关于直线 $x=5$ 对称， $f(10-x) = f(x)$ ，

因为 $f(x+4)$ 为奇函数，所以曲线 $y=f(x)$ 关于点 $(4, 0)$ 对称， $f(8-x) = -f(x)$ 。5

所以 $f(8-(x-2)) = -f(x-2) = f(x)$ ，则 $f(x-2) = -f(x)$ ，

所以 $f(x-4) = f(x)$ ，即 $f(x+4) = f(x)$ 。6

则 $f(x)$ 是以 4 为一个周期的周期函数，7

所以曲线 $y=f(x)$ 关于点 $(0, 0)$ 对称 ($f(x)$ 为奇函数)，且关于直线 $x=1$ 对称，8

因为 $f(x)$ 为奇函数，所以 $f(0) = 0$ ，当 $0 < x \leq 1$ 时， $f(x) = x^3$ ，9

所以当 $-1 \leq x < 0$ 时， $f(x) = x^3$ ，所以当 $-1 \leq x \leq 1$ 时， $f(x) = x^3$ 。10


根据周期性可知，曲线 $y=f(x)$ 与直线 $y=m(x-10)$ 有 5 个交点，11

则曲线 $y=f(x)$ 与直线 $y=m(x-2)$ 有 5 个交点，根据对称性，12

在同一坐标系中，作出函数 $y=f(x)$ 的图像与直线 $y=m(x-2)$ ，如图所示。13

由图像可知， $\frac{1}{9-2} < m < \frac{1}{5-2}$ ，即 $\frac{1}{7} < m < \frac{1}{3}$ 。14

故选：C。15



11. 已知函数 $f(x) = \frac{x}{e \ln x}$ ，关于 x 的方程 $[f(x)]^2 - 2(a+1)f(x) + a^2 + 2a = 0$ 至少有三个互不相等的实数解，则 a 的取值范围是 () 18

- A. $[1, +\infty)$ 19 B. $(-1, 0) \cup (1, +\infty)$ 20
C. $(-1, 0) \cup [1, +\infty)$ D. $(-\infty, 0) \cup (1, +\infty)$ 21

【解答】解：已知函数 $f(x) = \frac{x}{e \ln x}$ ， $x > 0$ 且 $x \neq 1$ ，22

$$f'(x) = \frac{1}{e} \times \frac{\ln x - 1}{(\ln x)^2}, 23$$

令 $f'(x) = 0$ ，则 $x = e$ ，24

当 $x \in (0, 1)$ 和 $(1, e)$ 时， $f'(x) < 0$ ， $f(x)$ 单调递减；25


当 $x \in (e, +\infty)$ 时， $f'(x) > 0$ ， $f(x)$ 单调递增；26

$$f(e) = \frac{e}{e \ln e} = 1, 27$$

当 $x \in (0, 1)$ 时， $f(x) < 0$ ， $x \in (1, e)$ 时， $f(x) \geq 1$ ，28

$$[f(x)]^2 - 2(a+1)f(x) + a^2 + 2a = 0 \Rightarrow [f(x) - a][f(x) - a - 2] = 0, 29$$

$$\therefore f(x) = a, 30 \text{ 或 } f(x) = a+2, 31$$



要使 $[f(x)]^2 - 2(a+1)f(x) + a^2 + 2a = 0$ 至少有三个互不相等的实数解，33

$$\text{则 } \begin{cases} a+2 > 1 \\ a > 1 \end{cases}, \text{ 解得 } a > 1, \text{ 有 4 个根,}$$

$$\begin{cases} a+2 > 1 \\ a=1 \end{cases}, \text{解得 } a=1, \text{有 } 3 \text{ 个根,}^2$$

$$\begin{cases} a+2 > 1 \\ a < 0 \end{cases}, \text{解得 } -1 < a < 0, \text{有 } 3 \text{ 个根,}^3$$

综上所述, $a \in (-1, 0) \cup [1, +\infty)$.⁴


故选: C.⁵

12. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 0, \\ \ln(-x), & x < 0, \end{cases}$ 若函数 $g(x) = f(f(x)) - af(x) + 1$ 恰有两个零点, 则 a 的取值范围是 ()⁶

A. $[0, 2) \cup \{1\}$ B. $(2, +\infty)$ C. $(-1, 0)$ D. $(-\infty, -1)$ ⁷

【解答】解: 作出 $f(x)$ 的图象如图所示, 当 $y < 0$ 时, $y = f(x)$ 有一解,⁸

当 $y \geq 0$ 时, $y = f(x)$ 有二个解,⁹




$$g(x) = f(f(x)) - af(x) + 1,^11$$

$$\text{令 } t = f(x), \quad g(t) = f(t) - at + 1,^12$$

$$\text{即 } f(t) = at - 1,^13$$

作函数 $y = f(t)$ 与 $y = at - 1$,¹⁴



直线 $y = at - 1$ 恒过定点 $(0, -1)$,¹⁶

当 $a \geq 0$ 时, 直线 $f(t) = at - 1$ 有一个大于等于 0, 一个小于 0 的根或只有一个小于 0 的根,¹⁷

由 $y = f(x)$ 可知 $g(x) = f(f(x)) - af(x) + 1$ 恰有三个零点或只有一个零点, 不符合题意,

当 $a < 0$ 时, 直线 $y = at - 1$ 与 $y = f(t)$ 相切时, 若 $a = -1$, 此时 $f(t) = at - 1$ 只有一个 -1 的根,

由 $y = f(x)$ 可知 $g(x) = f(f(x)) - af(x) + 1$ 恰有一个零点, 不符合题意,¹⁸

当 $a < -1$ 时, $f(t) = at - 1$ 没有根,¹⁹

由 $y = f(x)$ 可知 $g(x) = f(f(x)) - af(x) + 1$ 没有零点, 不符合题意,²⁰

当 $-1 < a < 0$ 时, $f(t) = at - 1$ 有两个小于 0 的根,²¹

由 $y = f(x)$ 可知 $g(x) = f(f(x)) - af(x) + 1$ 恰有两个零点, 符合题意,²²

$\therefore a$ 的取值范围是 $(-1, 0)$.²³

故选: C.²⁴

13. 已知 $f(x) = \begin{cases} \frac{4x}{1+x^2}, & x \geq 0 \\ -\frac{4}{x}, & x < 0 \end{cases}$, 若 $f(x) = t$ 有三个不同的解 x_1, x_2, x_3 , 且 $x_1 < x_2 < x_3$, 则 $-\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_3}$ 的取值范围是 ()²⁵

A. $(1, +\infty)$ B. $(\frac{3}{2}, +\infty)$ C. $(2, +\infty)$ D. $(\frac{5}{2}, +\infty)$ ²⁶

【解答】解：当 $x < 0$ 时， $f(x) = -\frac{4}{x}$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递增，函数 $f(x)$ 的取值集合为 $(0, +\infty)$ ，

当 $x \geq 0$ 时， $f(x) = \frac{4x}{1+x^2}$ ， $f(0) = 0$ ，当 $x > 0$ 时， $f(x) = \frac{4}{\frac{1}{x} + x}$ ，令 $y = \frac{1}{x} + x$ ， $x > 0$ ，

显然函数 $y = \frac{1}{x} + x$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减，在 $(1, +\infty)$ 上单调递增，

因此函数 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增，在 $(1, +\infty)$ 上单调递减， $f(1) = 2$ ，

于是当 $x \geq 0$ 时，函数 $f(x)$ 的取值集合为 $[0, 2]$ ，且当 $x > 1$ 时，恒有 $f(x) > 0$ ，

由 $f(x) = t$ 有三个不同的解 x_1, x_2, x_3 ，且 $x_1 < x_2 < x_3$ ，得 $0 < t < 2$ ，且 $-\frac{4}{x_1} = t$ ， x_2, x_3 是方程 $\frac{4x}{1+x^2} = t$ 的不等实根，

由 $\frac{4x}{1+x^2} = t$ 得： $tx^2 - 4x + t = 0$ ，则有 $x_2 + x_3 = \frac{4}{t}$ ， $x_2 x_3 = 1$ ，而 $-\frac{1}{x_1} = \frac{t}{4}$ ，

因此 $-\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_3} = -\frac{1}{x_1} + \frac{x_2 + x_3}{x_2 x_3} = \frac{t}{4} + \frac{4}{t} = \frac{1}{4}(t + \frac{16}{t})$ ，由对勾函数知函数 $g(t) = \frac{1}{4}(t + \frac{16}{t})$ 在 $(0, 2)$ 上单调递减，

即有 $g(t) > g(2) = \frac{5}{2}$ ，所以 $-\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_3}$ 的取值范围是 $(\frac{5}{2}, +\infty)$ 。

故选：D. 11

14. 已知函数 $f(x) = (x+1)e^x$ ，若函数 $F(x) = f^2(x) - mf(x) + m - 1$ 有三个不同的零点，则实数 m 的取值范围为 ()

- A. $(-\frac{1}{e^2}, 0)$ B. $(-\frac{1}{e^2}, 1)$ C. $(1 - \frac{1}{e^2}, 1)$ D. $(1 - \frac{1}{e^2}, 1) \cup (1, +\infty)$

【解答】解：函数 $f(x) = (x+1)e^x$ 的定义域为 \mathbf{R} ，求导得 $f'(x) = (x+2)e^x$ ，当 $x < -2$ 时， $f'(x) < 0$ ，当 $x > -2$ 时， $f'(x) > 0$ ，

因此函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, -2)$ 上单调递减，在 $(-2, +\infty)$ 上单调递增，

$f(x)_{\min} = f(-2) = -\frac{1}{e^2}$ ，且 $x < -1$ ，恒有 $f(x) < 0$ ，

由 $F(x) = 0$ ，得 $[f(x) - 1][f(x) - m + 1] = 0$ ，即 $f(x) = 1$ 或 $f(x) = m - 1$ ，由 $f(x) = 1$ ，得 $x = 0$ ，


于是函数 $F(x)$ 有 3 个不同零点，当且仅当方程 $f(x) = m - 1$ 有 2 个不同的解，即直线 $y = m - 1$ 与 $y = f(x)$ 图象有 2 个公共点，

在同一坐标系内作出直线 $y = m - 1$ 与 $y = f(x)$ 的图象，如图，

观察图象知，当 $-\frac{1}{e^2} < m - 1 < 0$ ，即 $1 - \frac{1}{e^2} < m < 1$ 时，直线 $y = m - 1$ 与 $y = f(x)$ 的图象有 2 个公共点，

所以实数 m 的取值范围为 $(1 - \frac{1}{e^2}, 1)$ 。

故选：C. 21




15. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} |\log_2(x-3)| + 1, & x > 3 \\ |2^x - 3|, & x \leq 3 \end{cases}$ ，若关于 x 的方程 $m[f(x)]^2 - 3f(x) + 4m = 0$ 有 8 个不相等的实根，则实数 m 的取值范围为 ()

0 有 8 个不相等的实根，则实数 m 的取值范围为 ()

- A. $(\frac{9}{13}, \frac{5}{4})$ B. $(\frac{3}{5}, \frac{9}{13})$ C. $(\frac{3}{5}, \frac{3}{4})$ D. $(\frac{9}{13}, \frac{3}{4})$

【解答】解：根据 $f(x) = \begin{cases} |\log_2(x-3)| + 1, & x > 3 \\ |2^x - 3|, & x \leq 3 \end{cases}$ ，可画出其图象为下图所示，



若关于 x 的方程 $m[f(x)]^2 - 3f(x) + 4m = 0$ 有 8 个不相等的实根，³

令 $t = f(x)$ ，则 $mt^2 - 3t + 4m = 0$ 有两个不相等的实数根 t_1, t_2 ，且 $t_1 \in (1, 3)$ ， $t_2 \in (1, 3)$ ，⁴

若 $m < 0$ ，则 $t_1 t_2 = 4 > 0$ ， $t_1 + t_2 = \frac{3}{m} < 0$ 不符合，所以 $m > 0$ ，

$$\text{令 } g(t) = mt^2 - 3t + 4m, \text{ 则需要满足 } \begin{cases} \Delta = 9 - 16m^2 > 0 \\ g(1) = 5m - 3 > 0 \\ g(3) = 13m - 9 > 0 \\ 1 < \frac{3}{2m} < 3 \end{cases} \text{ 解得 } \frac{9}{13} < x < \frac{3}{4}.$$

故选：D.⁶

16. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} \ln x + x, & x > 1 \\ 2x^2 - mx + \frac{m}{2}, & x \leq 1 \end{cases}$ ，若 $g(x) = f(x) - m$ 有三个零点，则实数 m 的取值范围是 ()

- A. $(1, \frac{7}{4}]$ B. $(1, 2]$ C. $(1, \frac{4}{3}]$ D. $[1, 3]$ ⁸

【解答】解：当 $x > 1$ 时， $f(x) = \ln x + x$ 单调递增，⁹

且 $f(x) = \ln x + x > 1$ ，此时 $g(x) = f(x) - m$ 至多有一个零点，¹⁰

若 $g(x) = f(x) - m$ 有三个零点，则 $x \leq 1$ 时，函数有两个零点；¹¹

当 $x > 1$ 时， $f(x) = \ln x + x > 1$ ，故 $m > 1$ ；¹²

当 $x \leq 1$ 时，要使 $g(x) = f(x) - m = 2x^2 - mx + \frac{m}{2}$ 有两个零点，¹³

$$\text{则 } \begin{cases} \Delta = m^2 - 8(-\frac{m}{2}) > 0 \\ \frac{m}{4} < 1 \\ 2 - m - \frac{m}{2} \geq 0 \end{cases},$$

所以 $0 < m \leq \frac{4}{3}$ ，又 $m > 1$ ，¹⁵

所以实数 m 的取值范围是 $(1, \frac{4}{3}]$.¹⁶

故选：C.¹⁷

17. 函数 $f(x) = (\frac{1}{e})^{|x|} + 1$ ，若 $g(x) = 2f^2(x) - (2a+3)f(x) + 3a$ 有 4 个零点，则 a 的取值范围是 () ¹⁸

A. $(1, 2)$ ¹⁹


B. $[\frac{3}{2}, 2)$ ²⁰

C. $(0, \frac{3}{2}) \cup (\frac{3}{2}, 2)$ ²¹

D. $(1, \frac{3}{2}) \cup (\frac{3}{2}, 2)$ ²²

【解答】解：由 $g(x) = 2f^2(x) - (2a+3)f(x) + 3a = 0$ ，可得 $[2f(x) - 3][f(x) - a] = 0$ ，²³

解得 $f(x) = \frac{3}{2}$ 或 $f(x) = a$ ，如下图所示：²⁴



由图可知，直线 $y = \frac{3}{2}$ 与函数 $f(x)$ 的图象有两个交点，²⁶

又因为函数 $g(x)$ 有四个零点，故直线 $y = a$ 与函数 $f(x)$ 有两个零点，且 $a \neq \frac{3}{2}$ ，²⁷

所以 $1 < a < 2$ 且 $a \neq \frac{3}{2}$ ，

因此，实数 a 的取值范围是 $(1, \frac{3}{2}) \cup (\frac{3}{2}, 2)$.²⁸

故选：D.²⁹

二. 函数与方程的综合运用 (共 3 小题) 2

18. 已知函数 $f(x) = \ln|x-1| - \ln|x+1|$ ，若存在两个不同的实数 x_1, x_2 ，使 $f(x_1) = f(x_2)$ ，则 () 3

- A. $x_1x_2 = -1$ B. $x_1x_2 = 1$ C. $x_1+x_2 < -2$ D. $x_1+x_2 > 2$ 4

【解答】解：函数 $f(x) = \ln|x-1| - \ln|x+1|$ ，定义域为 $(-\infty, -1) \cup (-1, 1) \cup (1, +\infty)$ ，

原函数可化为 $f(x) = \ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right| = \ln\left|1 - \frac{2}{x+1}\right|$ ， 6


又 $f(-x) = \ln\left|\frac{-x-1}{-x+1}\right| = \ln\left|\frac{x+1}{x-1}\right| = -f(x)$ ，函数 $f(x) = \ln|x-1| - \ln|x+1|$ 为奇函数。 7

因为 $y = 1 - \frac{2}{x+1}$ 在 $(-\infty, -1)$ 上单调递增，且 $y > 1$ ， $y = 1 - \frac{2}{x+1}$ 在 $(-1, 0)$ 上单调递增且 $y < -1$ ，

所以 $y = \left|1 - \frac{2}{x+1}\right|$ 在 $(-\infty, -1)$ 上单调递增，且 $y > 1$ ， $y = \left|1 - \frac{2}{x+1}\right|$ 在 $(-1, 0)$ 上单调递减且 $y > 1$ ，

所以当 $x \in (-\infty, -1)$ 时，函数 $f(x)$ 单调递增，且 $f(x) > 0$ ； 10

当 $x \in (-1, 0)$ 时，函数 $f(x)$ 单调递减，且 $f(x) > 0$ ，由奇函数的图象关于原点对称， 11
可作函数 $f(x)$ 的图象如下：



由 $f(x_1) = f(x_2)$ ，则 $\ln\left|\frac{x_1-1}{x_1+1}\right| = \ln\left|\frac{x_2-1}{x_2+1}\right|$ ，则 $\left|\frac{x_1-1}{x_1+1}\right| = \left|\frac{x_2-1}{x_2+1}\right|$ ， 13

得 $\frac{x_1-1}{x_1+1} = \frac{x_2-1}{x_2+1}$ 或 $\frac{x_1-1}{x_1+1} = -\frac{x_2-1}{x_2+1}$ ，化简得 $x_1 = x_2$ (舍去) 或 $x_1x_2 = 1$ 。 14

故选：B. 15

19. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} -\ln x, & 0 < x \leq 1 \\ \frac{1}{x}, & x > 1 \end{cases}$ ，若 $0 < a < b$ 且满足 $f(a) = f(b)$ ，则 $af(b) + bf(a)$ 16

(a) 的取值范围是 () 17

- A. $(1, \frac{1}{e}+1)$ B. $(-\infty, \frac{1}{e}+1]$ C. $(1, \frac{1}{e}+1]$ D. $(0, \frac{1}{e}+1)$ 18

【解答】解： \because 函数 $f(x) = \begin{cases} -\ln x, & 0 < x \leq 1 \\ \frac{1}{x}, & x > 1 \end{cases}$ ， 19

若 $0 < a < b$ 且满足 $f(a) = f(b)$ ， 20

则 $-\ln a = \frac{1}{b}$ 且由 $0 < -\ln a < 1$ 得 $\frac{1}{e} < a < 1$ 21

又 $af(b) + bf(a) = a \cdot \frac{1}{b} + b(-\ln a) = -a \ln a + 1$ ($\frac{1}{e} < a < 1$) 22

令 $g(x) = -x \ln x + 1$ ，($\frac{1}{e} < x < 1$) 23


则 $g'(x) = -\ln x - 1$ 24

令 $g'(x) = 0$ ，则 $x = \frac{1}{e}$ 25

当 $\frac{1}{e} < x < 1$ 时， $g'(x) < 0$ ， $g(x)$ 为减函数， 26

$\therefore g(x) \in (1, \frac{1}{e}+1)$ 27

故选：A. 28



20 . 已知函数 $f(x) = e^x - ax^2$ 的定义域为 $(\frac{1}{2}, 2)$ ，且对¹

$\forall x_1, x_2 \in (\frac{1}{2}, 2), x_1 \neq x_2, \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} < x_1 + x_2$ 恒成立，则实数 a 的取值²

范围为 ()

A. $[\frac{e^2}{4} - 1, +\infty)$ B. $[\sqrt{e} - 1, +\infty)$ C. $(-\infty, \frac{e}{2} - 1]$ D. $(-\infty, \frac{e}{2} - 1)$ ³

【解 答】解：设 $x_1 > x_2$ ，因为⁴

$\forall x_1, x_2 \in (\frac{1}{2}, 2), x_1 \neq x_2, \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} < x_1 + x_2$ 恒成立，⁵

等价于 $f(x_1) - f(x_2) < x_1^2 - x_2^2$ ，即 $f(x_1) - x_1^2 < f(x_2) - x_2^2$ ，⁶

令 $F(x) = f(x) - x^2 = e^x - ax^2 - x^2$ ，则 $F(x_1) < F(x_2)$ ，所以 $F(x)$ 在 $(\frac{1}{2}, 2)$ 上为减⁷
函数，

所以 $F'(x) = e^x - 2(a+1)x \leq 0$ 在 $(\frac{1}{2}, 2)$ 上恒成立，即 $\frac{e^x}{x} \leq 2(a+1)$ 在 $(\frac{1}{2}, 2)$ 上⁸
恒成立，

令 $h(x) = \frac{e^x}{x}$ ， $x \in (\frac{1}{2}, 2)$ ，则 $h'(x) = \frac{e^x(x-1)}{x^2} > 0$ ，⁹

所以函数 $h(x)$ 在 $(\frac{1}{2}, 2)$ 上单调递减，在 $(1, 2)$ 单调递增，¹⁰

又 $h(\frac{1}{2}) = 2\sqrt{e}$ ， $h(2) = \frac{e^2}{2}$ ，且 $2\sqrt{e} < \frac{e^2}{2}$ ，¹¹

所以 $h(x)_{\max} < h(2) = \frac{e^2}{2}$ ，¹²

所以 $\frac{e^2}{2} \leq 2(a+1)$ ，解得 $a \geq \frac{e^2}{4} - 1$ ，¹³

故选：A.¹⁴