

Linear Systems

HW9

班級：航太四 A

姓名：吳柏勳

學號：407430635

座號：4

1

$$(a) \det(sI - \begin{bmatrix} 1 & 0 & -4 \\ 0 & 3 & 0 \\ -2 & 0 & -1 \end{bmatrix}) = \det \begin{bmatrix} s-1 & 0 & 4 \\ 0 & s-3 & 0 \\ 2 & 0 & s+1 \end{bmatrix} = s^3 - 3s^2 - 9s + 2$$

$$\Rightarrow s = -3, 3, 3. \quad \#$$

For $s = -3$,

$$-3I - \begin{bmatrix} 1 & 0 & -4 \\ 0 & 3 & 0 \\ -2 & 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 & 0 & 4 \\ 0 & -6 & 0 \\ 2 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -4 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & -6 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & -2 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \begin{cases} x_1 = x_3 \\ x_2 = 0 \\ x_3 = x_3 \end{cases}$$

$$\text{eigenvector of } s = -3 \text{ is } \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \#$$

For $s = 3$

$$3I - \begin{bmatrix} 1 & 0 & -4 \\ 0 & 3 & 0 \\ -2 & 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 4 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -2x_3 \\ x_2 = x_2 \\ x_3 = x_3 \end{cases}$$

$$\text{eigenvector of } s = 3 \text{ are } \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} \quad \#$$

$$J = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -4 \\ 0 & 3 & 0 \\ -2 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \quad \#$$

$$(b) \det(sI - \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}) = s^3 - 6s^2 + 12s - 8$$

$$\Rightarrow s = 2, 2, 2. \quad \#$$

For $s=2$,

$$2I - \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \begin{cases} x_1 = x_1 \\ x_2 = -x_3 \\ x_3 = x_3 \end{cases}$$

Select $v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \begin{cases} x_1 = x_1 \\ x_2 = -1 - x_3 \\ x_3 = x_3 \end{cases}$$

eigenvector of $s=2$ are $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ #

$$J = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$
 #

$$(c) \det \left(sI - \begin{bmatrix} 7 & -11 & -30 \\ -14 & 13 & -43 \\ -8 & 10 & 29 \end{bmatrix} \right) = s^3 - 49s^2 + 707s + 1521$$

$$\Rightarrow s = -1.8933, 25.4467 \pm 12.4830i$$
 #

eigenvector of $s = -1.8933$ is $\begin{bmatrix} 0.7534 \\ 0.6573 \\ -0.0177 \end{bmatrix}$ #

eigenvector of $s = 25.4467 \pm 12.4830i$ is $\begin{bmatrix} 0.2928 \pm 0.3453i \\ 0.7637 \\ -0.3164 \mp 0.3344i \end{bmatrix}$ #

$$J = \begin{bmatrix} -1.8933 & 0 & 0 \\ 0 & 25.4467 + 12.483i & 0 \\ 0 & 0 & 25.4467 - 12.483i \end{bmatrix}$$
 #

$$(d) \det(sI - \begin{bmatrix} \alpha & \omega \\ -\omega & \alpha \end{bmatrix}) = \begin{bmatrix} s-\alpha & -\omega \\ \omega & s-\alpha \end{bmatrix} = (s-\alpha)^2 + \omega^2 = 0$$

$$\Rightarrow s = \alpha \pm \omega i \quad \#$$

$$\text{For } s = \alpha + \omega i$$

$$\begin{bmatrix} \alpha + \omega i & 0 \\ 0 & \alpha + \omega i \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \alpha & \omega \\ -\omega & \alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \omega i & -\omega \\ \omega & \omega i \end{bmatrix}$$

$$\left[\begin{array}{cc|c} \omega i & -\omega & 0 \\ \omega & \omega i & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{cc|c} -1 & -i & 0 \\ 1 & i & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & i & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -i x_2 \\ x_2 = x_2 \end{cases}$$

$$\text{eigenvector of } s = \alpha + \omega i \text{ is } \begin{bmatrix} -i \\ 1 \end{bmatrix} \quad \#$$

$$\text{For } s = \alpha - \omega i$$

$$\begin{bmatrix} \alpha - \omega i & 0 \\ 0 & \alpha - \omega i \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \alpha & \omega \\ -\omega & \alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\omega i & -\omega \\ \omega & -\omega i \end{bmatrix}$$

$$\left[\begin{array}{cc|c} -\omega i & -\omega & 0 \\ \omega & -\omega i & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -i & 0 \\ 1 & -i & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -i & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \begin{cases} x_1 = i x_2 \\ x_2 = x_2 \end{cases}$$

$$\text{eigenvector of } s = \alpha - \omega i \text{ is } \begin{bmatrix} i \\ 1 \end{bmatrix} \quad \#$$

$$J = \begin{bmatrix} -i & i \\ 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \alpha & \omega \\ -\omega & \alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -i & i \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a + bi & 0 \\ 0 & a - bi \end{bmatrix} \quad \#$$

#2.

$$(a) \int_0^{2\pi} \sin(t-x) f(x) dx = \int_0^{2\pi} [\sin(t) \cos(-x) + \cos(t) \sin(-x)] f(x) dx \\ = \sin t \int_0^{2\pi} \cos x f(x) dx - \cos t \int_0^{2\pi} \sin x f(x) dx$$

$$T = \begin{bmatrix} -\int_0^{2\pi} \sin x f(x) dx & 0 \\ 0 & \int_0^{2\pi} \cos x f(x) dx \end{bmatrix} \quad \#$$

$$(b) \det(sI - T) = \det \begin{pmatrix} s + \int_0^{2\pi} \sin x f(x) dx & 0 \\ 0 & s - \int_0^{2\pi} \cos x f(x) dx \end{pmatrix} \\ = \left(s + \int_0^{2\pi} \sin x f(x) dx \right) \left(s - \int_0^{2\pi} \cos x f(x) dx \right)$$

$$\Rightarrow s = - \int_0^{2\pi} \sin x f(x) dx, \int_0^{2\pi} \cos x f(x) dx \quad \#$$

$$\text{For } s = - \int_0^{2\pi} \sin x f(x) dx$$

$$(sI - T)v = 0$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & - \int_0^{2\pi} \sin x f(x) dx - \int_0^{2\pi} \cos x f(x) dx \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = x_1 \\ x_2 = 0 \end{cases}$$

$$\text{eigenvector of } s = - \int_0^{2\pi} \sin x f(x) dx \text{ is } \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \#$$

$$\text{For } s = \int_0^{2\pi} \cos x f(x) dx$$

$$\begin{bmatrix} \int_0^{2\pi} \sin x f(x) dx + \int_0^{2\pi} \cos x f(x) dx & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = x_2 \end{cases}$$

$$\text{eigenvector of } s = \int_0^{2\pi} \cos x f(x) dx \text{ is } \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \#$$