


Främre korsbandet Anatomi Främre och bakre korsbandet Frühre och bakre korsbandet Frühre och bakre korsbandet Frühre korsbandet Skandens rörelser Stabilitet. Translation-rotation Symtom vid skada - kortsiktigt Nedsatt stabilitet Giving-way episoder, funktionell instabilitet Nedsatt proprioception Nedsatt funktion och aktivitet Atergång till idrott Behandling Fysioterapi i kombination med operation Enbart fysioterapi Eva Tengman 2







Behandling

- Fysioterapi i kombination med Operation
- Enbart fysioterapi
 - Rörlighet
 - neuromuskulär träning
 - Styrka
 - Rörelsemönster

Konsekvenser på långsikt?

Eva Tengman

ngman






Övergripande syfte

- Att undersöka långtidskonsekvenser vad gäller knäfunktion, fysisk aktivitetsnivå, rörelserädsla, fysisk kapacitet och rörelsemönster hos personer med en främre korsbandsskada mer än 20 år efter skadetillfället.
- Detta hos personer med en främre korsbandsskada som antingen har behandlats med fysioterapi i kombination med operation eller enbart med fysioterapi. I jämförelse med ålders- och könsmatchade kontrollgrupp.

Eva Tengman





Deltagare


	Group				
	ACLR	ACLPT	Controls		
N	33	37	33		
Male / female	21 / 12	23 / 14	21 / 12		
Age at test	45.6 [4.5]	48.1 [5.9]	46.7 [5.0]		
Injury side:					
Dominant / non-	21 / 12	20 / 17			
dominant					
Cause of injury (n):				
Soccer	24	25			
Alpine	2	5			
Other sports	6	2			
Non-sporting	1	5			
1 0					
	Con Tonomo	_	q		
Eva Tengman					

Annan information



- Hög incidens av knäledsartros.
- Mer än 90 % visade någon form av röntgenologisk artros.

Olofsson Brax et al.







Fysiska tester Hopp

- One-leg hop Längd i m
- Vertical jump Höjd i m
- Sidehop antal hopp/30s

Rörlighet/laxitet

KT1000 Antal mm

Eva Tengman

Tengman



Styrka

- Quadriceps (Q)
 Hamstrings (H)
- Koncentriskt (con)
 Excentriskt (ecc)
- Bäst av 6 repetitioner
- H:Q ration = kvoten mellan styrkan
- LS



Chair – Max antal uppresning på ett ben

14



5

