

11.2.5.Fomepizole (如 Fomeject):(107/11/1)

1. 限下列病例使用：

(1) 甲醇中毒：

- I. 確認甲醇服用病史。
- II. 血中甲醇濃度 $>20\text{mg/dL}$ 。
- III. 食入已達中毒劑量的甲醇且 osmolal gap (OG) $>10\text{mOsm/L}$ 。
- IV. 臨床高度懷疑為甲醇中毒且下面三項指標中至少符合兩項：
 - i. 血液 pH <7.3 ；
 - ii. 血中 bicarbonate $<20\text{meq/L}$ ；
 - iii. Osmolal gap (OG) $>10\text{mOsm/L}$ 。

(2) 乙二醇中毒：

- I. 確認乙二醇服用病史。
- II. 血中乙二醇濃度 $>20\text{mg/dL}$ 。
- III. 食入已達中毒劑量的乙二醇且 osmolal gap (OG) $>10\text{mOsm/L}$ 。
- IV. 臨床高度懷疑食入乙二醇且造成下列四項表徵中之三項：
 - i. 血液 pH <7.3 ；
 - ii. 血中 bicarbonate $<20\text{meq/L}$ ；
 - iii. Osmolal gap (OG) $>10\text{mOsm/L}$ ；
 - iv. 尿液檢查結果有草酸結晶。

(3) 上述檢驗資料應於病歷詳細記載。

2. 需排除或停止使用之情形如下：

- (1) 血中甲醇或乙二醇濃度低於 20mg/dL ；
- (2) 已知對 fomepizole 或其他 pyrazoles 過敏。