

13.19. Centella asiatica extract, plectranthus amboinicus extract 外用製劑(如 Fespixon cream)：(112/8/1)

1. 限整形外科或皮膚科專科醫師使用。
2. 限用於糖尿病足部傷口潰瘍(Wagner grade 2 級)，接受積極血糖控制及清創手術後，其治療最大傷口面積不超過 5cm²，且應符合下列所有條件：
 - (1)糖尿病足部傷口潰瘍，傷口深及肌肉層且經抗生素藥膏或燙傷藥膏治療及使用傷口敷料 12 週後，該傷口癒合面積小於 50%。
 - (2)HbA1c<8.5%、albumin $\geq$ 3.0 g/dL。
 - (3)治療前 ABI (Ankle Brachial Index) $\geq$ 0.9。
3. 每年限申請 1 次，每次申請為 2 支，每次處方限 1 支。
4. 排除條件：
 - (1)急性發炎感染不穩定之傷口。
 - (2)周邊動脈阻塞(peripheral artery disease, PAD)病人未施行經皮血管擴張術 (percutaneous transluminal angioplasty, PTA)治療者。
5. 需經事前審查核准後使用；應附有 HbA1c、albumin、ABI 資料及相隔 12 週以上清創前後照片。
6. 再次申請時除前條所需資料外，需加附前次治療後該傷口完全癒合之照片。

備註:積極血糖控制，係指糖化血色素不高於個別目標值 1.5%以

上，惟一般病人的糖化血色素目標值為 7.0%以下，因此 8.5%

為指標。