

14.9.9. Cysteamine (如 Cystadrops): (114/7/1)

1. 限用於經衛生福利部國民健康署認定之 2 歲以上兒童及成人胱胺酸血症 (cystinosis) 之病人，且符合下列所有條件：
 - (1) 經基因檢測確診為胱胺酸血症 CTNS 基因發生致病變異 (Pathogenic Variants)。
 - (2) 裂隙燈生體顯微鏡檢查 (slit lamp biomicroscope) 有角膜胱胺酸 (cystine) 結晶堆積且角膜胱胺酸晶體裂隙燈檢查分級 (CCCS) 2.0 (含) 以上。
 - (3) 病人自我評估畏光度及醫師檢測畏光度 2.0 (含) 以上。
2. 限由眼科專科醫師處方和評估療效及副作用。
3. 需經事前審查核准後使用，期滿需提出療效評估項目資料再次申請並經核准後使用：
 - (1) 第一次申請，核給 3 個月 (12 瓶) 的藥量，期滿需經裂隙燈生體顯微鏡證實 CCCS 降低 0.5 (含) 以上，得第二次申請，並核給 6 個月 (24 瓶) 的藥量。
 - (2) 第三次 (含) 後申請，需與前次申請間隔至少半年始得提出，每次申請核給 24 瓶的藥量並符合下列所有條件，始得續用：
 - I. 經裂隙燈生體顯微鏡證實 CCCS 仍在 2.0 (含) 以上且較第一次申請時降低 1.0 (含) 以上。
 - II. 病人自我評估畏光度及醫師檢測畏光度仍在 2.0 (含) 以上且較第一次申請時降低 1.0 (含) 以上。
4. 經裂隙燈生體顯微鏡證實 CCCS 在 1.0 (含) 以下且病人自我評估畏光度及醫師檢測畏光度 1.0 (含) 以下應先暫停用藥，得視病情需要重新申請使用。
5. 每年最多給付 52 瓶。
6. 療效評估項目：
 - (1) 角膜胱胺酸晶體裂隙燈檢查分級 (Gahl' s Corneal Cystine Crystal Score, CCCS)。
 - (2) 病人自我評估畏光度 (Self-Assessed Photophobia)。
 - (3) 醫師檢測畏光度 (Clinician-Assessed Photophobia)。
7. 停藥條件：
 - (1) 產生不良反應。
 - (2) 無法忍受局部藥物不良反應 (如：眼睛刺激、灼熱、刺痛等)。

備註：

1. 病人自我評估畏光度分級：等級 0，無畏光，無不適；等級 1，輕微對光

線敏感導致偶爾眨眼；等級 2，輕微對光線敏感導致經常眨眼；等級 3，中度對光線敏感需戴太陽眼鏡；等級 4，嚴重對光線敏感需長期戴太陽眼鏡；等級 5，極端對光線敏感需待在室內，即便戴太陽眼鏡也無法忍受自然光。

2. 醫師檢測畏光度分級：等級 0，即使在裂隙燈生體顯微鏡檢查使用最大狹縫光束下也無畏光；等級 1，對裂隙燈生體顯微鏡檢查使用中等狹縫燈光有畏光反應；等級 2，對裂隙燈生體顯微鏡檢查使用最輕微狹縫燈光有畏光反應；等級 3，無法忍受裂隙燈生體顯微鏡檢查使用藍色狹縫燈光的畏光；等級 4，需要戴深色眼鏡且在照明的診療室內無法睜開眼睛的畏光；等級 5，即使在黑暗的房間內也無法睜開眼睛。