

- 8.2.3. 多發性硬化症治療藥品 (91/4/1、92/3/1、92/12/1、93/3/1、94/10/1、96/7/1、97/8/1、99/10/1、100/5/1、100/10/1、101/9/1、102/10/1、107/7/1、107/10/1、108/7/1、109/1/1、109/11/1、112/3/1、115/3/1)
- 8.2.3.1. Interferon beta-1a (如Rebif)、teriflunomide 14mg (如Aubagio)、dimethyl fumarate (如Tecfidera)、peginterferon beta-1a (如Plegridy)、ozanimod (如Zeposia)、cladribine(如Mavenclad)：(91/4/1、97/8/1、100/10/1、106/10/1、107/7/1、107/10/1、109/11/1、112/3/1、115/3/1)
1. 限用於復發型多發性硬化症。
 2. 初次使用 teriflunomide、dimethyl fumarate、peginterferon beta-1a、ozanimod 及 cladribine 時需經事前審查核准後使用 (109/11/1、112/3/1、115/3/1)。
 3. 不適用於視神經脊髓炎 (neuromyelitis optica, NMO)，包括：
(100/10/1)
 - (1)有視神經及脊髓發作。
 - (2)出現下列 2 種以上症狀：
 - i. 脊髓侵犯大於 3 節。
 - ii. NMO-IgG or Aquaporin-4 抗體陽性。
 - iii. 腦部磁共振造影不符合多發性硬化症診斷標準。
 4. Ozanimod 每日限用 1 粒，若治療無效，第二線治療藥物不得使用 fingolimod。(112/3/1)
 5. Cladribine 不適用 EDSS(Expanded Disability Status Scale)大於 5.5 之病人。首次申請限給付兩年，且須符合下列任一條件：
(115/3/1)
 - (1)未使用 DMT (disease-modifying therapies)藥物，但前一年有兩次發作，且 MRI 檢查至少有 T1-gadolinium enhancing 病灶或 T2 病灶惡化。
 - (2)使用其他 DMT 藥物後，一年仍有一次復發且經 MRI 檢查確認疾病活躍。
 - (3)滿四年後若有復發或核磁共振上出現疾病活性可再次申請。
 6. Interferon beta-1a、teriflunomide 14mg、dimethyl fumarate、peginterferon beta-1a、ozanimod 及 cladribine

不得合并使用。(112/3/1、115/3/1)