

- 9.18. Trastuzumab (如 Herceptin): (91/4/1、93/8/1、95/2/1、99/1/1、99/8/1、99/10/1、101/1/1、105/11/1、108/5/1、109/2/1、111/12/1、112/10/1、113/8/1、113/12/1、114/1/1、114/5/1、114/12/1、115/7/1、115/8/1)
1. 早期乳癌(99/1/1、99/8/1、99/10/1、101/1/1、111/12/1、112/10/1、113/8/1、113/12/1、114/1/1、114/12/1、115/7/1)
- (1)具 HER2過度表現(IHC3+或 FISH+)，且具腋下淋巴結轉移但無遠處臟器轉移之早期乳癌患者，作為輔助性治療用藥(事審代碼：C50P2)：
(99/8/1、99/10/1、101/1/1、111/12/1、112/10/1、113/8/1、113/12/1、114/1/1、114/12/1、115/7/1)。
- I. 若本藥品使用於手術前之輔助治療，依下列術後情形使用：
(113/8/1、113/12/1、114/1/1、114/12/1、115/7/1)
- i. 外科手術後達病理上緩解(pCR)：本藥品、pertuzumab 併用本藥品或 pertuzumab 與 trastuzumab 皮下注射複方製劑(如 Phesgo)，三者使用於外科手術前後的總療程合併計算，依藥品仿單記載以全部18個療程為上限。(113/8/1、113/12/1、114/1/1、114/12/1、115/7/1)
- ii. 若外科手術後無法達病理上緩解(non-pCR)，本藥品與 trastuzumab emtansine 使用於外科手術前後的總療程合併計算，以全部18個療程為上限，其中 trastuzumab emtansine 以14個療程為上限。(113/8/1、113/12/1)
- II. 若未接受術前輔助治療先行手術者，給予本藥品作為術後輔助治療，須接受至少4個療程的化學治療(本藥品合併化療或接續化療之後使用本藥品)，本藥品以全部18個療程為上限。(115/7/1)
- (2)具 HER2過度表現(IHC3+或 FISH+)，且無腋下淋巴結轉移之早期乳癌患者，作為輔助性治療用藥：(111/12/1、112/10/1、113/8/1、113/12/1、114/1/1、114/12/1、115/7/1、115/8/1)
- I. 若本藥品使用於手術前之輔助治療，須經影像檢查(乳房超音波或乳房 X 光攝影或核磁共振)顯示腫瘤大於2公分，並依下列術後情形使用：
- i. 病理檢驗雌激素受體為陰性 ER(-)(事審代碼：C50P1)且外科手術後達病理上緩解(pCR)者：使用於外科手術前後的總療程合併計算，以全部9個療程為上限；使用 Eirgasun vial 420 mg、Herzuma 及 Ogivri 以全部18個療程為上限。(113/8/1、115/7/1、115/8/1)
- ii. 病理檢驗 ER(-)(事審代碼：C50P1)且外科手術後無法達病理上緩解(non-pCR)者：本藥品與 trastuzumab emtansine 使用於外科手術前後的總療程合併計算，以全部18個療程為上限，其中 trastuzumab emtansine 以14個療程為上限。(113/8/1、115/7/1)
- iii. 病理檢驗陽性 ER(+)(事審代碼：C50P3)：限使用 Eirgasun vial 420 mg、Herzuma 及 Ogivri 於外科手術前後的總療程合併計算，以全部18個療程為上限。(115/7/1、115/8/1)
- iv. 115年6月30日以前已核定使用 trastuzumab 之病人，得經事前審核核准後，使用 Eirgasun vial 420 mg、Herzuma 及 Ogivri 至總療程上限(即18個療程)或使用期間發生疾病惡化為止(115/7/1、115/8/1)。
- II. 若未接受術前輔助治療先行手術者，給予本藥品(限使用 Eirgasun vial 420 mg、Herzuma 及 Ogivri)作為術後輔助治療，以全部18個

療程為上限，須接受至少4個療程的化學治療(合併化療或接續化療之後使用本藥品)，並須符合下列條件之一：(115/7/1、115/8/1)

i. ER(-)且腫瘤大於0.5公分(事審代碼：C50P4)。

ii. ER(+)且腫瘤大於1公分(事審代碼：C50P5)。

2. 轉移性乳癌(事審代碼：C50R1)

(1)單獨使用於治療腫瘤細胞上有 HER2過度表現(IHC3+或 FISH+)，曾接受過一次以上化學治療之轉移性乳癌病人。(91/4/1、99/1/1)

(2)與 paclitaxel 或 docetaxel 併用，使用於未曾接受過化學治療之轉移性乳癌病患，且為 HER2過度表現(IHC3+或 FISH+)者。(93/8/1、95/2/1、99/1/1)

(3)轉移性乳癌且 HER2過度表現之病人，僅限先前未使用過本藥品者方可使用。(99/1/1、108/5/1、113/12/1)

(4)若先前使用過 docetaxel 及 pertuzumab 與 trastuzumab 併用或 docetaxel 及 pertuzumab 與 trastuzumab 皮下注射複方製劑(如 Phesgo)併用達18個月上限仍未惡化者，得再次申請本藥品。(108/5/1、113/12/1)

3. 轉移性胃癌(限 IV 劑型)(事審代碼：C16R1)

Trastuzumab 合併 capecitabine (或5-fluorouracil)及 cisplatin 適用於未曾接受過化學治療之 HER2過度表現(IHC3+或 FISH+)轉移性胃腺癌(或胃食道接合處腺癌)的治療。(109/2/1)

4. 經事前審查核准後使用，核准後早期乳癌及轉移性胃癌每24週、晚期乳癌每18週須檢附療效評估資料再次申請，若疾病有惡化情形即不應再行申請。(105/11/1、114/5/1)