

9.44.2. Azacitidine 口服製劑（如 Onureg）：（114/5/1、114/10/1）

1. 用於不適合接受造血幹細胞移植(HSCT)之急性骨髓性白血病（AML）成人病人，作為維持治療，且須同時符合下列條件：
 - (1) 55 歲以上具中度或高度不良風險染色體核型變化(intermediate-risk or poor-risk cytogenetics)之急性骨髓性白血病（AML）病人。
 - (2) 在誘導治療後(不論是否接受鞏固治療)，首次達到完全緩解(CR)或完全緩解但血球計數未完全恢復正常 (CRi)。
 - (3) 之前未曾接受 azacitidine 或 decitabine 藥物治療。
 2. 需經事前審查核准後使用，初次申請為 3 個療程，需檢附染色體檢測結果報告；每 3 個療程需再次申請，可治療至疾病復發（定義為周邊血或骨髓觀察到的芽細胞超過 5% 或新出現髓外侵犯）或無法耐受藥物毒性為止。
 3. 每人以 24 個療程為上限。
 4. 不得與 midostaurin、venetoclax 及 gilteritinib 等標靶藥品併用。
 5. 病人接受本藥物治療後，不再給付造血幹細胞移植。
 6. 本藥品與 quizartinib 僅得擇一使用，除因耐受性不良，不得互換。
- (114/10/1)