

9.53. Panitumumab (如 Vectibix): (105/4/1、107/6/1、110/6/1、113/6/1、115/2/1)

1. 與 FOLFOX (folinic acid/ 5-fluorouracil/oxaliplatin) 或 FOLFIRI (folinic acid/ 5-fluorouracil/irinotecan) 合併使用於治療 RAS 原生型(wild-type)之轉移性直腸結腸癌病人之第一線治療。需檢附 A11-RAS 基因突變分析檢測報告，且需符合全民健康保險藥品給付規定之通則十二。(98/8/1、110/6/1、113/6/1、115/2/1)

(1)本藥品須經事前審查核准後使用，每次申請之療程以18週為限，再次申請必須提出客觀證據(如：影像學)證實無惡化，才可繼續使用。

(2)Panitumumab 與 cetuximab 二者僅能擇一使用。(107/6/1、115/2/1)

(3)本藥品不得與 bevacizumab 併用。(107/6/1)

(4)經手術完全切除(R0切除)且查無轉移病灶者不得申請給付。(115/2/1)

2. 治療已接受過含 5 fluorouracil 、 irinotecan 及 oxaliplatin 二線以上之細胞毒性治療失敗、RAS 原生型(wild-type)的轉移性直腸結腸癌的病人。需檢附 A11-RAS 基因突變分析檢測報告，且需符合全民健康保險藥品給付規定之通則十二。(115/2/1)

(1)病人先前未曾接受過抗表皮生長因子受體(anti-EGFR)藥品治療。

(2)本藥品須經事前審查核准後使用，每次申請之療程以9週為限，再次申請必須提出客觀證據(如：影像學)證實無惡化，才可繼續使用。

(3)使用總療程以 18 週為上限。