

9. 70. Pertuzumab(如 Perjeta)：(108/5/1、108/12/1、112/8/1、113/12/1、114/1/1、114/5/1、114/12/1)

1. 本藥品與 trastuzumab 及化學療法併用於具 HER2過度表現 (IHC3+或 FISH+)，且具腋下淋巴結轉移但無遠處臟器轉移之早期乳癌病人 (113/12/1、114/5/1、114/12/1)

(1)使用於術前輔助治療，經外科手術後達病理上完全緩解者 (pCR)，得繼續使用至18個療程為上限。

(2)若未接受術前輔助治療，即先行手術者，可給予術後輔助治療，以18個療程為使用上限。

(3)下列 I ~III 使用於外科手術前後之總療程合併計算，依藥品仿單記載以18個療程為上限：

I：pertuzumab 與 trastuzumab 併用

II：trastuzumab

III：pertuzumab 與 trastuzumab 皮下注射複方製劑(如 Phesgo)

(4)須經事前審查核准後使用，核准後每24週須檢附療效評估資料再次申請，若疾病有惡化情形即不應再行申請。(113/12/1、114/5/1)

2. 轉移性乳癌(108/5/1、108/12/1、112/8/1、113/12/1)

(1)Pertuzumab 與 trastuzumab 及 docetaxel 併用於治療轉移後未曾以抗 HER2或化學療法治療之 HER2過度表現(IHC3+或 FISH+)轉移性乳癌病人。(108/12/1、112/8/1)

(2)須經事前審查核准後使用，核准後每18週須檢附療效評估資料再次申請，若疾病有惡化情形即不應再行申請，每位病人至多給付18個月為限。(108/5/1)

(3)下列 I ~II 使用於轉移性乳癌總療程合併計算，以全部18個月為上限 (113/12/1)：

I：pertuzumab 與 trastuzumab 併用

II：pertuzumab 與 trastuzumab 皮下注射複方製劑(如 Phesgo)

(4)先前於早期乳癌已使用 pertuzumab 與 trastuzumab 併用或使用 pertuzumab 與 trastuzumab 皮下注射複方製劑(如 Phesgo)者，不得再次申請 pertuzumab 與 trastuzumab 併用，惟於早期乳癌治療結束至首次疾病復發轉移時間超過12個月以上者得再次申請。(113/12/1)