

1.6.6.Patisiran (如 Onpattro)、vutrisiran (如 Amvuttra):
(112/5/1、114/5/1)

1. 限用於確診為衛生福利部國民健康署認定之 TTR

(transthyretin) 家族性澱粉樣多發性神經病變 (Familial Amyloidotic Polyneuropathy) 之成人患者，並需同時符合下列條件者使用：

(1) 含 vutrisiran 成分藥品用於神經病變的疾病嚴重度限於第一、二期的病人 (114/5/1)：

I.polyneuropathy disability [PND] stage II、IIIa~IIIb，
或

II.familial amyloidotic polyneuropathy [FAP] stage I、II。

(2) 含 patisiran 成分藥品用於神經病變的疾病嚴重度限於第二期的病人：

I.polyneuropathy disability [PND] stage IIIa~IIIb，或

II.familial amyloidotic polyneuropathy [FAP] stage II。

(3) 神經傳導檢查符合多發性神經病變 (114/5/1)。

(4) 臨床症狀符合肢體末端麻木、無力、感覺異常、姿勢性低血壓或其它自律神經異常的症狀 (114/5/1)。

(5) 神經理學檢查符合週邊神經病變的徵候：四肢肢體末端運動及感覺異常、深部肌腱反射低下 (114/5/1)。

(6) 無嚴重心衰竭症狀 (定義依紐約心臟協會衰竭功能分級為第 3 級或第 4 級)。

(7) 未曾接受過肝移植。

(8) 不得與其他 RNAi 及 TTR 穩定劑合併使用於治療 hATTR。

(9) 開始治療年齡未滿 76 歲者。

2. 排除條件：以腕隧道症候群為病徵表現之 TTR 基因突變攜帶者。

3. 需檢附下列資料，經專家小組特殊專案審查核准後使用：

(1) 符合衛生福利部國民健康署 FAP 罕見疾病個案通報審查標準

之神經傳導/肌電圖/自律神經功能檢查報告。

(2) 臨床症狀及徵兆的病歷紀錄。

(3) 運動功能評估：10 公尺行走測試 (10MWT) 錄影之影片。

4. 首次申請得核准使用 9 個月，後續每 6 個月申請核准後得使用。

療效評估方式及時機：

(1) 神經病變疾病嚴重度評估時機：

I. Patisiran 或 vutrisiran 治療前。

II. 治療反應的初步評估應在治療開始後 9 個月進行。

III. 隨後每 6 個月下一劑治療前。

(2) 神經病變疾病嚴重度評估 (需由提供 patisiran 或 vutrisiran 治療之醫師判定評估結果)：

I. polyneuropathy disability [PND] stage，或

II. familial amyloidotic polyneuropathy [FAP] stage。

(3) 後續每 6 個月申請使用需檢附：

I. 臨床症狀及徵兆的病歷紀錄。

II. 運動功能評估：10 公尺行走測試 (10MWT) 錄影之影片。

5. 停藥時機：

若有下列任一情況，則不再給予 patisiran 或 vutrisiran 治療：

(1) 若病人在使用雙側輔具下，於 5 分鐘內不休息，無法獨力完成 10 公尺以上步行者。

(2) 需接受臨終照護 (end-of-life care) 者。

6. Patisiran 與 vutrisiran 兩者限擇一給付，且不得互換。惟於

114/5/1 前已使用 patisiran 治療之病人符合續用申請者，得轉

換使用 vutrisiran，以一次為限 (114/5/1)。