

2.17. Tafamidis (如 Vyndamax) : (113/2/1)

1. 限用於成人轉甲狀腺素蛋白類澱粉沉著症造成之心肌病變 (transthyretin-mediated amyloid cardiomyopathy, ATTR-CM)，且符合下列各項條件：
 - (1) 須排除腎功能不全患者 ($\text{eGFR} < 25 \text{ mL/min/1.73m}^2$)。
 - (2) 須排除為 Amyloid light chain (AL amyloidosis；輕鏈蛋白相關之類澱粉沉積症)。
 - (3) 經心臟核醫掃描 (例如：診療項目代碼 26023B) 等於第三級以上 (PYP scintigraphy scan visual score = Grade 3)，並經心臟組織切片 (cardiac biopsy) 檢查確認。
 - (4) 依紐約心臟協會 (NYHA) 心衰竭功能分級第二至第三級 (class 2 & 3)。
 - (5) $\text{NT-proBNP} \geq 600 \text{ pg/ml}$ 或 $\text{BNP} \geq 100 \text{ pg/ml}$ (符合其中一項即可)。
 - (6) 心室中膈厚度 (interventricular septal wall thickness) $> 12 \text{ mm}$ 且左心室後壁舒張末期厚度 (LVPWd : Left Ventricular Posterior Wall Dimensions) $> 12 \text{ mm}$ 。
 - (7) 左心室射出率 (LVEF, left ventricular ejection fraction) $\geq 40\%$ 。
2. 限具有心臟專科醫師處方。
3. 須經事前審查核准後使用。
4. 繼續使用條件：

使用藥物治療達1年以上，且確定紐約心臟協會 (NYHA) 心衰竭功能分級未達第四級，方可繼續使用。
5. 出現下列任一情況時需停用：接受心室輔助系統、心臟移植或肝臟移植治療。
6. 每日限使用1粒，限給付45個月。