

8.2.12.Canakinumab (如 Ilaris): (104/8/1)

1. 限具有風濕或免疫專長之醫師處方。
2. 臨床診斷為 Cryopyrin 相關週期性症候群(CAPS)，包括：嚴重型的家族性冷因性自體發炎症候群(FCAS)/家族性寒冷蕁麻疹(FCU)、Muckle-Wells 症候群(MWS)、新生兒多重系統發炎疾病(NOMID)/慢性嬰兒神經學、皮膚、關節症候群(CINCA)，並符合下列所有條件：
  - (1)具有 NLRP3基因突變。
  - (2)有下列兩個以上之併發症：
    - I. 中樞神經系統併發症。
    - II. 葡萄膜炎。
    - III. 感覺神經性聽損。
    - IV. 腎臟類澱粉沉積症。
  - (3)hsCRP (high sensitivity CRP) > 1mg/dL 及 ESR > 25mm/h。
  - (4)經一般藥物及類固醇治療3個月以上無效。
3. 需經事前審查核准後使用：
  - (1)初次申請需於給藥兩週後進行療效評估，達療效者方可繼續使用，自初次起計使用期間為1年，療效之定義為符合下列條件之一：
    - I. 治療後 hsCRP ≤ 1mg/dL 及 ESR ≤ 25mm/h。
    - II. 治療後 hsCRP 及 ESR 改善程度 ≥ 50%。
  - (2)使用1年期間後須暫緩續用，倘 hsCRP 及 ESR 較暫緩續用前上升程度 ≥ 50%，則可申請續用，續用期間為1年。hsCRP 檢驗結果上升應排除其他非 CAPS 之情況所引起。